

作业2.1-2.2 习题答案

1. 已知空间直角坐标系中的四点 $A(1, 1, 1)$, $B(1, 2, 3)$, $C(1, 4, 9)$, $D(1, 8, 27)$, 判断这四个点是否在同一平面上.

解: $\vec{AB} = (0, 1, 2)$, $\vec{AC} = (0, 3, 8)$, $\vec{AD} = (0, 7, 26)$

线性方程组 $x\vec{AB} + y\vec{AC} + z\vec{AD} = 0$ 即为
$$\begin{cases} x + 3y + 7z = 0 \\ 2x + 8y + 26z = 0 \end{cases}$$
 未知量个数大于方程个数, 固有非零解, 所以四点在同一平面上.

2. 设 $\alpha = (3, -2, -1, 1)$, $\beta = (-3, 1, -2, 1)$. 求向量 $\gamma = (c_1, c_2, c_3, c_4)$, 使 $2\alpha + 3\gamma = \beta$.

解: 将 α, β, γ 代入 $2\alpha + 3\gamma = \beta$, 即

$$2(3, -2, -1, 1) + 3(c_1, c_2, c_3, c_4) = (-3, 1, -2, 1).$$

由此得

$$6 + 3c_1 = -3, \quad -4 + 3c_2 = 1,$$

$$-2 + 3c_3 = -2, \quad 2 + 3c_4 = 1.$$

于是 $c_1 = -3$, $c_2 = \frac{5}{3}$, $c_3 = 0$, $c_4 = -\frac{1}{3}$. 即所求的向量 $\gamma = (-3, \frac{5}{3}, 0, -\frac{1}{3})$.

3. 设 $\alpha = (2, 1, -2)$, $\beta = (-4, 2, 3)$, $\gamma = (-8, 8, 5)$. 证明: 存在数 k 使 $2\alpha + k\beta = \gamma$.

证: 将 α, β, γ 代入 $2\alpha + k\beta = \gamma$, 得

$$2(2, 1, -2) + k(-4, 2, 3) = (-8, 8, 5).$$

由此得

$$4 - 4k = -8, \quad 2 + 2k = 8, \quad -4 + 3k = 5.$$

他们有惟一解 $k = 3$.

4. 设 $\alpha_1 = (2, 2, 2)$, $\alpha_2 = (-1, 3, 0)$, $\alpha_3 = (2, 0, 3)$, $\beta = (1, 3, 0)$. 问: 向量 β 是否为向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合? 如果是, 求一组组合系数.

解: 设 $\beta = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3$ 这就是要问如下线性方程组:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 1 \\ 2x_1 + 3x_2 = 3 \\ 2x_1 + 3x_3 = 0 \end{cases} \quad \text{是否有解,若有解其解就是组合系数.}$$

$$\text{因为} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 3 \\ 2 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

所以方程组有惟一解 $x_1 = \frac{3}{2}, x_2 = 0, x_3 = -1$. 即 $\beta = \frac{3}{2}\alpha_1 - \alpha_3$.

5. 已知空间直角坐标系中的三点 $A(1, 1, 1), B(1, 2, 4), C(1, 3, 9)$, 是否能将空间任意一个向量 \vec{OD} 写成 $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ 的线性组合? 以 OA, OB, OC 为棱的平行六面体的体积是否等于0?

解: $\vec{OA} = (1, 1, 1), \vec{OB} = (1, 2, 4), \vec{OC} = (1, 3, 9)$

因为 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 看出 $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ 线性无关, 空间中任意

向量 \vec{OD} 可以表示成 $\vec{OA}, \vec{OB}, \vec{OC}$ 的线性组合. 又

$$(\vec{OA} \times \vec{OB}) \cdot \vec{OC} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 \\ 1 & 3 & 9 \end{vmatrix} = 2$$

进而以 OA, OB, OC 为棱的平行六面体的体积不为零.

6. 判断以下各向量组是否线性相关:

(1) $\alpha_1 = (2, 1), \alpha_2 = (-1, 4), \alpha_3 = (2, -3)$;

(2) $\alpha_1 = (2, 1, 1), \alpha_2 = (1, 2, -1), \alpha_3 = (-2, 3, 0)$

解: (1) 设有数 x_1, x_2, x_3 , 使 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = 0$, 即

$$x_1(2, 1) + x_2(-1, 4) + x_3(2, -3) = 0$$

由此得方程组

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 + 4x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases}$$

此方程组有无穷多解,故有非零解,所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关.

(2) 设 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = 0$,得方程组

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 - 2x_3 = 0 \\ x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 0 \\ x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$$

由于
$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 3 & 0 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & -2 & 0 \end{pmatrix}$$

故方程组只有零解: $x_1 = x_2 = x_3 = 0$.所以 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关.

7. 证明:如果向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关,而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \beta$ 线性相关,则向量 β 可以表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的线性组合.

证: 由题设有不全为零的数 l, l_1, \dots, l_r 使 $l\beta + l_1\alpha_1 + \dots + l_r\alpha_r = 0$.将 $l\beta$ 移项,得 $(-l)\beta = l_1\alpha_1 + \dots + l_r\alpha_r$.现来证 $l \neq 0$.用反证法,若 $l = 0$,由 l, l_1, \dots, l_r 不全为零,故 l_1, \dots, l_r 不全为零,且有 $0 = l_1\alpha_1 + \dots + l_r\alpha_r$.与题设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关矛盾.故 $l \neq 0$.将 $(-l)\beta = l_1\alpha_1 + \dots + l_r\alpha_r$ 两端同乘以 $\frac{1}{(-l)}$,则得

$$\beta = \frac{l_1}{(-l)}\alpha_1 + \frac{l_2}{(-l)}\alpha_2 + \dots + \frac{l_r}{(-l)}\alpha_r$$

即向量 β 可以表示成 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的线性组合.

8. 设有三维向量 $\alpha_1 = (1 + \lambda, 1, 1), \alpha_2 = (1, 1 + \lambda, 1), \alpha_3 = (1, 1, 1 + \lambda), \beta = (0, \lambda, \lambda^2)$.问 λ 为何值时 β 可写成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合,且表达式唯一.

解: 设 $\beta = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3$, β 可否写成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合即问如下方程组是否有解问题

$$\begin{cases} (1 + \lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1 + \lambda)x_2 + x_3 = \lambda \\ x_1 + x_2 + (1 + \lambda)x_3 = \lambda^2 \end{cases}$$

因为
$$\begin{pmatrix} 1 + \lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 + \lambda & 1 & \lambda \\ 1 & 1 & 1 + \lambda & \lambda^2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 + \lambda & \lambda^2 \\ 0 & -\lambda & -\lambda(\lambda + 2) & -\lambda^2(1 + \lambda) \\ 0 & 0 & -\lambda(\lambda + 3) & -\lambda(\lambda^2 + 2\lambda - 1) \end{pmatrix}$$

所以当 $\lambda \neq 0$ 且 $\lambda \neq -3$ 时, β 可写成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合,且表达式唯一;

当 $\lambda = 0$ 时, β 可写成 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的线性组合,但表达式不唯一;
当 $\lambda = -3$ 时, β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表出.

9. 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示,但不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r-1}$ 线性表示.证明:

- (1) α_r 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r-1}$ 线性表示;
- (2) α_r 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r-1}, \beta$ 线性表示.

证: (1)若不然,设 α_r 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r-1}$ 线性表示,且设

$$\alpha_r = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_{r-1}\alpha_{r-1}. \quad (1)$$

由假设 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表示,可设

$$\beta = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 + \dots + l_{r-1}\alpha_{r-1} + l_r\alpha_r. \quad (2)$$

将(1)式代入(2)式,并整理得

$$\beta = (l_1 + l_r k_1)\alpha_1 + \dots + (l_{r-1} + l_r k_{r-1})\alpha_{r-1}$$

即 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r-1}$ 线性表示,与题设不符.

故 α_r 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r-1}$ 线性表示.

(2)由上面(2)式知,由于 β 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r-1}$ 线性表示,故必 $l_r \neq 0$.于是由(2)式可得

$$\alpha_r = \frac{1}{l_r}\beta - \frac{l_1}{l_r}\alpha_1 - \dots - \frac{l_{r-1}}{l_r}\alpha_{r-1}$$

即 α_r 能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{r-1}, \beta$ 线性表示.

10. 设复数域上的向量 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关. 对复数 λ 的不同值, 判断向量组 $S = \{\alpha_1 + \lambda\alpha_2, \dots, \alpha_{n-1} + \lambda\alpha_n, \alpha_n + \lambda\alpha_1\}$ 是否线性无关, 并求出 S 的秩.

解: 令 $k_1(\alpha_1 + \lambda\alpha_2) + k_2(\alpha_2 + \lambda\alpha_3) + \dots + k_n(\alpha_n + \lambda\alpha_1) = 0$

即 $(k_1 + k_n\lambda)\alpha_1 + (k_2 + k_1\lambda)\alpha_2 + \dots + (k_n + k_{n-1}\lambda)\alpha_n = 0$ 因为 $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ 线性无关,所以有

$$\left\{ \begin{array}{l} k_1 + k_n\lambda = 0 \\ k_2 + k_1\lambda = 0 \\ \dots\dots\dots \\ k_n + k_{n-1}\lambda = 0 \end{array} \right. \quad \text{即} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots & \lambda \\ \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \\ \vdots \\ k_n \end{pmatrix} = 0$$

系数行列式为: $\lambda^n + 1 = 0$

若 $n = 4m + 2$ 时, $\lambda = i, -i$ 时上述系数行列式为零, 从而线性方程组有非零解, 此时向量组 S 线性相关, 且秩为 $n - 1$, λ 为其他值时都线性无关;

若 $n = 2m + 1$, $\lambda = -1$ 时上述系数行列式为零, 有非零解, 此时向量组 S 线性相关, 且秩为 $n - 1$, λ 为其他值时都线性无关;

若 n 为其他情形, 对 λ 的任何取值向量组 S 都线性无关.

11. 设 $\alpha_1 = (0, 1, 2, 3), \alpha_2 = (1, 2, 3, 4), \alpha_3 = (3, 4, 5, 6), \alpha_4 = (4, 3, 2, 1), \alpha_5 = (6, 5, 4, 3)$; 将 α_1, α_2 扩充成 $\{\alpha_1, \dots, \alpha_5\}$ 的一个极大线性无关组.

$$\text{解: } (\alpha_1^T, \dots, \alpha_5^T) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 3 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 4 & 3 & 5 \\ 2 & 3 & 5 & 2 & 4 \\ 3 & 4 & 6 & 1 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -5 & -7 \\ 0 & 1 & 3 & 4 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

α_1, α_2 本身就是一组极大线性无关组.

12. 设 $\beta_1 = \alpha_2 + \alpha_3 + \dots + \alpha_r, \beta_2 = \alpha_1 + \alpha_3 + \dots + \alpha_r, \dots, \beta_r = \alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_{r-1}$. 证明: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 与 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 有相同的秩.

证: 由题设 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 可经 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性表出, 所以 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 的秩 $\leq \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的秩. 又易计算得 $\alpha_i = \frac{1}{r-1}(\beta_1 + \beta_2 + \dots + \beta_r) - \beta_i, i = 1, 2, \dots, r$. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 可经 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性表出, 所以 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 的秩 $\leq \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 的秩. 故它们的秩相同.