A

北京航空航天大学 2013-2014 学年第一学期期末

		7	试	统一	一用:	答題	短册			
考试课	程	一元	微积分	<u> </u>						•
班级			学号	Z		姓	名			
题目	~	=	=	Ш	五	☆	t	Л	定分	

淂

分

阅

卷

2014年01月13日

1



一. 填空题(本题 20 分)

1.
$$\exists \exists \lim_{x \to 0} \frac{(1 - ax)e^x - 1}{x} = 0$$
, $\exists a = 1$. 1

- 3. 螺线 $r = \theta$ (0 $\leq \theta \leq 2\pi$) 与极轴围成的面积 $S = ______. \frac{4}{2}\pi^3$
- 4. 设可导函数 y=y(x)在任意点 x 处的增量 $\Delta y=\arcsin x\cdot \Delta x+o(\Delta x)$, 且 y(0)=1,

5. 函数 $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$ 在点 $x_0 = 0$ 处带佩亚诺余项的三阶泰勒公式为_

$$f(x) = 2(x + \frac{x^3}{3}) + o(x^3)$$

二. 单项选择题(本题 20 分)

- 1. 设函数 $y(x) = e^x(e^x 1)(e^x 2)\cdots(e^x 10)$, 则 y'(0) = 0

- A.10!. B. -10!. C. 9!. D. -9!. 2. 设函数 f(x) 具有二阶导数,则 $f(\sin x)$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处取得极大值的一个充分条件是(B). B. f'(1) > 0. C. f''(1) < 0. D. f''(1) > 0.
- A. f'(1) < 0.

3. 设
$$I_k = \int_0^{k\pi} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$$
,则有(A).

- A. $I_1 > I_2 > 0$. B. $I_1 > 0 > I_2$. C. $I_2 > I_1 > 0$. D. $I_2 > 0 > I_1$.
- 4. 设 $\{u_n\}$ 是数列,则下列命题正确的是(B)

A.若
$$\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$$
 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛. B.若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛.

B.若
$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$$
 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛.

C.若
$$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$$
 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 收敛. D.若 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

D.若
$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n u_n$$
 收敛,则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

5. 物体的运动规律为s = s(t), 介质的阻力与速度的平方成正比(比例系数为k), 则物体从时刻t = a运动 至t = b时,阻力所做的功为(D).



A.
$$\int_{a}^{b} k[s(t)]^{2} dt$$
. B. $\int_{a}^{b} k[s'(t)]^{2} dt$. C. $\int_{a}^{b} k[s(t)]^{3} dt$. D. $\int_{a}^{b} k[s'(t)]^{3} dt$.

三. 求极阻 (每小题 5分, 共 10分)

1.
$$\lim_{x\to 0} \left(\frac{1}{x^2} - \frac{\cos 2x}{e^{x^2} - 1}\right)$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{e^{x^2} - 1 - x^2 \cos 2x}{x^4} - 2$$

$$= \lim_{x \to 0} \frac{x^2 + \frac{1}{2}x^4 - x^2[1 - \frac{1}{2}(2x)^2] + o(x^4)}{x^4} - ---- 4 \mathcal{D} = \frac{5}{2} - ---- 5 \mathcal{D}$$

2.
$$\lim_{n \to \infty} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{4n^2 - i^2}} = \lim_{n \to \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{\sqrt{4 - (\frac{i}{n})^2}} = \int_{0}^{1} \frac{1}{\sqrt{4 - x^2}} dx$$

$$= \arcsin \frac{x}{2} \Big|_{0}^{1} = \frac{\pi}{6}$$
 -----5 $$$$

四. 求导数 (每小题 5分, 共 10分)

解
$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = -\sin t + \sin t + t\cos t = t\cos t$$
, $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \cos t - \cos t + t\sin t = t\sin t$ ------2 分

$$\therefore \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x} = \tan t, \quad \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2} = \frac{\sec^2 t}{t \cos t}, -----4 \, \mathcal{D}$$

$$\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\Big|_{t=\frac{\pi}{4}} = 1, \quad \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}x^2}\Big|_{t=\frac{\pi}{4}} = \frac{8\sqrt{2}}{\pi}$$

2. 已知函数
$$y = y(x)$$
由方程 $\int_{1}^{x+2y} e^{t^2} dt = \int_{1}^{\sqrt{x}} x \cos(t^2) dt$ 所确定,求 $y'(1)$.

当
$$x=1$$
时, $y=0$. -----4 分

∴
$$y'(1) = \frac{1}{2}(\frac{\cos 1}{2e} - 1)$$
. ----5 $\frac{1}{2}$



五. 求积分 (每小题 6分, 共 12分)

1.
$$\int \frac{xe^x}{(1+x)^2} dx = -\int xe^x dx = -\int xe^x dx = -\frac{xe^x}{1+x} + \int \frac{d(xe^x)}{1+x} - ---3$$
 $\Rightarrow = -\frac{xe^x}{1+x} + \int e^x dx = -----5$

$$=-\frac{xe^x}{1+x}+e^x+C.$$
 ------6 $\%$

$$2. \int_{\frac{1}{2}}^{1} \frac{\mathrm{d}x}{x^4 \sqrt{1-x^2}}.$$

$$\underline{x = \sin t} = \int \frac{\frac{\pi}{2} \csc^4 t dt}{\frac{\pi}{6} \csc^4 t dt} = -\int \frac{\frac{\pi}{2} \left(\cot^2 t + 1\right) d\cot t}{\frac{\pi}{6} \cot^2 t} = -\left(\frac{\cot^3 t}{3} + \cot t\right) \frac{\frac{\pi}{3}}{\frac{\pi}{6}} = 2\sqrt{3}.$$

六.
$$(14 分)$$
 设函数 $y = f(x) = \frac{x^2 - 3x}{x + 1}$.

1. 填表并作图

-			
单增区间	$(-\infty, -3), (1, +\infty)$	y	•
单减区间	(-3,-1), (-1,1)		
凹区间	$(-1,+\infty)$		
凸区间	$(-\infty, -1)$		
极大值点	x = -3	0	<i>x</i>
极小值点	x = 1		
渐近线	x = -1, y = x - 4		

2. 求曲线 y = f(x)对应 $x \in [0,3]$ 的弧段绕x轴旋转所成旋转体的体积 V.

解
$$v = \int_0^3 \pi f^2(x) dx = \int_0^3 \pi (\frac{x^2 - 3x}{x + 1})^2 dx - 2 \%$$

$$= \int_0^3 \pi ((x - 4)^2 + 8 - \frac{40}{x + 1} + \frac{16}{(x + 1)^2}) dx - 2 \%$$



$$=\pi \left[\frac{(x-4)^3}{3}\right) + 8x - 40\ln(1+x) - \frac{16}{1+x}\right]_0^3 = (57 - 80\ln 2)\pi.$$

七. $(8 \ \beta)$ 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin(\frac{\ln n}{n^p})$ (p > 0) 的收敛性, 若收敛, 请判断是条件收敛还是绝对收敛, 并说明理由.

$$\mathbf{\hat{R}}$$
: $\frac{\ln n}{n^p} \to 0$, $\therefore \sin(\frac{\ln n}{n^p}) \sim \frac{\ln n}{n^p} \to 0$, ------1 分

读
$$f(x) = \sin(\frac{\ln x}{x^p})$$
, $f'(x) = \cos(\frac{\ln x}{x^p}) \cdot \frac{x^{p-1}(1-p\ln x)}{x^{2p}} < 0$ $(x > e^{\frac{1}{p}})$ -------6 分

所以
$$\sin(\frac{\ln n}{n^p})$$
 当 $n > [e^{\frac{1}{p}}]$ 单调减少,由莱布尼茨定理知交错级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \sin(\frac{\ln n}{n^p})$ 收敛.

于是原级数当p>1时绝对收敛,p≤1时条件收敛

小. (6分)设f(x)在[0,1]上可导, $f(0) \cdot f(1) > 0$,且 $\int_{0}^{1} f(x) dx = 0$.证明

- 1. f(x)在(0,1)内至少存在两个零点;
- 2. 在(0,1)内至少存在一点 ξ , 使 $f'(\xi)+3f^3(\xi)=0$.

证 1. $f(0) \cdot f(1) > 0 \Rightarrow f(0) = f(1)$ 同号,不妨设f(0) > 0, f(1) > 0.

若
$$f(x)$$
在[0,1]上 $f(x) \ge 0$, 则 $\int_0^1 f(x) dx > 0$. 故一定存在 $x_0 \in (0,1)$,满足 $f(x_0) < 0$.

于是 f(x)在[0, x_0]与[x_0 ,1]都满足零点存在定理的条件, 所以存在 $x_1 \in (0,x_0), x_2 \in (x_0,1)$, 满足 $f(x_1) = f(x_2) = 0$.

-----3 分

2. 令 $F(x) = f(x)e^{3\int_0^x f^2(t)dt}$, F(x)在区间 [x_1, x_2]上可导,且 $F(x_1) = F(x_2) = 0$,



由罗尔定理知存在 $\xi \in (x_1, x_2) \subset (0,1)$, 有 $F'(\xi) = 0$. 而 $F'(x) = f'(x)e^{3\int_0^x f^2(t)dt} + 3f^3(x)e^{3\int_0^x f^2(t)dt}$, 故存在 $\xi \in (0,1)$, 有 $f'(\xi) + 3f^3(\xi) = 0$. ------6 分

