

北京航空航天大学

2013—2014 学年 第一学期期末考试

《 工科数学分析 (I) 》

(A 卷)

班号_____ 学号_____ 姓名_____ 成绩_____

题 号	一	二	三	四	五	六	总分
成 绩							
阅卷人							
校对入							

2014 年 01 月 13 日

一、 计算题（每题 5 分，满分 50 分）

1、 $\int \frac{2}{3+\sqrt{x}} dx$

解：令 $\sqrt{x} = t$, 则 $x = t^2, dx = 2tdt$,

$$\begin{aligned}\int \frac{2}{3+\sqrt{x}} dx &= \int \frac{2}{3+t} \cdot 2tdt = 4 \int \left(1 - \frac{3}{3+t}\right) dt \\ &= 4t - 12 \ln|3+t| + C \\ &= 4\sqrt{x} - 12 \ln|3+\sqrt{x}| + C\end{aligned}$$

建议：根式带换 2 分，剩下计算每行各 1 分。

2、 $\int \frac{2x^2+1}{x^2(x^2+1)} dx$

解： $\int \frac{2x^2+1}{x^2(x^2+1)} dx = \int \frac{x^2+(x^2+1)}{x^2(x^2+1)} dx = \int \left(\frac{1}{x^2+1} + \frac{1}{x^2}\right) dx = \arctan x - \frac{1}{x} + C$

建议：被积函数拆成两项 3 分，结果 2 分。

3、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}}, (p > 0).$

解：

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^p + 2^p + \cdots + n^p}{n^{p+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left\{ \left(\frac{1}{n}\right)^p + \left(\frac{2}{n}\right)^p + \cdots + \left(\frac{n}{n}\right)^p \right\} \cdot \frac{1}{n} = \int_0^1 x^p dx = \frac{1}{p+1}$$

建议：转化成定积分 4 分，结果 1 分。

4、 $\int_{-2}^2 \left(x^{2014} \sin x + \frac{1}{2}\right) \sqrt{4-x^2} dx$

解：由对称性： $\int_{-2}^2 x^{2014} \sin x \sqrt{4-x^2} dx = 0,$

原式 $= \frac{1}{2} \int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx = \frac{1}{2} \times 2\pi = \pi$

（其中 $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx = 2\pi$ 可以看做圆心在原点，半径为 2 的上半圆的面积，

也可以利用公式 $\int \sqrt{a^2-x^2} dx = \frac{x}{2} \sqrt{a^2-x^2} + \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + C$ 来计算。）

建议：对称性 2 分，剩下计算 3 分。

5、 $\int_0^{\sqrt{3}} \frac{x \ln(1+x^2)}{\sqrt{1+x^2}} dx$

解：

$$\begin{aligned} \int_0^{\sqrt{3}} \frac{x \ln(1+x^2)}{\sqrt{1+x^2}} dx &= \int_0^{\sqrt{3}} \ln(1+x^2) d\sqrt{1+x^2} \\ &= \ln(1+x^2) \sqrt{1+x^2} \Big|_0^{\sqrt{3}} - \int_0^{\sqrt{3}} \sqrt{1+x^2} \cdot \frac{2x}{1+x^2} dx \\ &= 4 \ln 2 - \int_0^{\sqrt{3}} \frac{2x}{\sqrt{1+x^2}} dx = 4 \ln 2 - 2 \sqrt{1+x^2} \Big|_0^{\sqrt{3}} \\ &= 4 \ln 2 - 2 \end{aligned}$$

建议：分部积分 3 分，计算及结果 2 分。

6、 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx$

解法一：

$$\begin{aligned} \because \frac{1}{2} x^n &\leq \frac{x^n}{1+x} \leq x^n, \quad \forall x \in [0,1] \\ \therefore \frac{1}{2(n+1)} &= \frac{1}{2} \int_0^1 x^n dx \leq \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}, \\ \therefore \text{由夹逼定理, } \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx &= 0. \end{aligned}$$

注：利用 $0 \leq \frac{x^n}{1+x} \leq x^n, \quad \forall x \in [0,1]$ 夹逼也可以。

建议：被积函数不等式放缩 2 分，夹逼定理及结果 3 分。

解法二：由第一积分中值定理， $\exists \xi_n \in (0,1)$,

$$\int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = \frac{1}{1+\xi_n} \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{1+\xi_n} \cdot \frac{1}{n+1}$$

所以 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{1+x} dx = 0$. 建议：第一中值定理写对 3 分，其余 2 分。

7、 设 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + x^3 \int_0^1 f(t) dt$, 求 $f(x)$.

解：假设 $\int_0^1 f(t) dt = A$ ，等式两边在 $[0,1]$ 上积分，得

$$A = \int_0^1 \frac{1}{1+x^2} dt + A \int_0^1 x^3 dt, \quad \text{即 } A = \frac{\pi}{4} + \frac{A}{4}, \text{ 从而 } A = \frac{\pi}{3}.$$

代入已知等式得 $f(x) = \frac{1}{1+x^2} + \frac{\pi}{3}x^3$.

建议：令 $\int_0^1 f(t) dt = A$ 1 分，等式两边积分 2 分，其余计算及结果 2 分。

8、 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} t \cos 2t dt}{\ln(1+x^4)}$

解：由等价代换及洛必达法则，

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} t \cos 2t dt}{\ln(1+x^4)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} t \cos 2t dt}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos(2x^2) \cdot 2x}{4x^3} = \frac{1}{2}.$$

建议：变上限函数求导 2 分，其余计算及结果 3 分。

9、计算曲线的 $y = \int_{-\frac{\pi}{2}}^x \sqrt{\cos t} dt$ 弧长 $(-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2})$.

解：记 $f(x) = \int_{-\frac{\pi}{2}}^x \sqrt{\cos t} dt$ ，则 $f'(x) = \sqrt{\cos x}$ ，曲线方程 $y = f(x)$ ， $-\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}$.

$$\begin{aligned} s &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + \cos x} dx = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2 \cos^2 \frac{x}{2}} dx \\ &= \sqrt{2} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos \frac{x}{2} dx = 2\sqrt{2} \left[\sin \frac{x}{2} \right]_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = 4 \end{aligned}$$

$$s = \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{1 + (f'(x))^2} dx$$

建议：弧长公式写对 2 分，其余计算及结果 3 分。

10、计算瑕积分 $\int_0^1 \ln x dx$.

解： $\int_0^1 \ln x dx = [x \ln x]_0^1 - \int_0^1 x \cdot \frac{1}{x} dx = -\lim_{x \rightarrow 0} (x \ln x) - 1 = 0 - 1 = -1$.

建议：前两个等号各 2 分，结果 1 分。

二、(本题 15 分)

讨论无穷广义积分 $\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} (1 + \frac{1}{x})^x dx$ ($p > 0$) 的敛散性, 若收敛, 说明是绝对还是条件收敛.

解: 由于 $|\int_1^A \sin x dx| \leq 2$, 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{x^p} \rightarrow 0$, 所以由 Dirichlet 判别法知,

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} dx \text{ 收敛。} \quad \text{-----2 分}$$

同理: $\int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^p} dx$ 收敛。 -----1 分

又由于 $(1 + \frac{1}{x})^x$ 单调有界 ($2 < (1 + \frac{1}{x})^x \leq e$), 所以由 Abel 判别法得

$$\int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} (1 + \frac{1}{x})^x dx \text{ } (p > 0) \text{ 收敛。} \quad \text{-----2 分}$$

$$(1) \quad \text{当 } p > 1 \text{ 时, } |\frac{\sin x}{x^p} (1 + \frac{1}{x})^x| \leq \frac{e}{x^p}, \quad \text{-----2 分}$$

由于 $\int_1^{+\infty} \frac{e}{x^p} dx$ 收敛, 所以由比较判别法, $\int_1^{+\infty} |\frac{\sin x}{x^p} (1 + \frac{1}{x})^x| dx$ 收敛, 因此当

$$p > 1 \text{ 时, } \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} (1 + \frac{1}{x})^x dx \text{ 绝对收敛。} \quad \text{-----3 分}$$

$$(2) \quad \text{当 } 0 < p \leq 1 \text{ 时, 由于 } |\frac{\sin x}{x^p} (1 + \frac{1}{x})^x| \geq \frac{2 \sin^2 x}{x^p} = \frac{1}{x^p} (1 - \cos 2x), \text{-----2 分}$$

$$\text{且 } \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \text{ 发散, } \int_1^{+\infty} \frac{\cos 2x}{x^p} dx \text{ 收敛,} \quad \text{-----1 分}$$

$$\text{所以 } \int_1^{+\infty} |\frac{\sin x}{x^p} (1 + \frac{1}{x})^x| dx \text{ 发散。}$$

$$\text{因此当 } 0 < p \leq 1 \text{ 时, } \int_1^{+\infty} \frac{\sin x}{x^p} (1 + \frac{1}{x})^x dx \text{ 条件收敛。} \quad \text{-----2 分}$$

三、(本题 10 分)

设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界, 且是单调函数, 证明 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积.

证明: 不妨设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增, 对 $[a, b]$ 上的任意分割:

$$\pi: a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b. \quad \text{-----2 分}$$

$$\text{由于 } \sum_{i=1}^n \omega_i(x_i - x_{i-1}) = \sum_{i=1}^n (f(x_i) - f(x_{i-1}))(x_i - x_{i-1}) \leq (f(b) - f(a))\|\pi\|, \text{-----3 分}$$

$$\text{因此 } \forall \varepsilon > 0, \exists \delta = \frac{\varepsilon}{f(b) - f(a)}, \quad \text{-----2 分}$$

当 $\|\pi\| < \delta$ 时, 有

$$\sum_{i=1}^n \omega_i(x_i - x_{i-1}) \leq (f(b) - f(a))\|\pi\| < \varepsilon, \quad \text{-----3 分}$$

因此 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积。

四、(本题 15 分)

设直线 $y = ax$ 与抛物线 $y = x^2$ 所围成的图形面积为 S_1 , 它们与直线 $x = 1$ 所围成图形的面积为 S_2 , 且 $a < 1$,

(1) 确定 a 的值, 使得 $S_1 + S_2$ 达到最小, 并求出最小值;

(2) 求该最小值所对应的平面图形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积.

解: (1)

$$\text{由 } \begin{cases} y = ax \\ y = x^2 \end{cases} \text{ 解出交点 } (0, 0) \text{ 和 } (a, a^2). \quad \text{-----1 分}$$

所以

$$S_1 = \int_0^a (ax - x^2) dx = \frac{1}{6} a^3,$$

$$S_2 = \int_a^1 (x^2 - ax) dx = \frac{a^3}{6} - \frac{a}{2} + \frac{1}{3}. \quad \text{-----3 分}$$

$$\text{因此 } |S_1 + S_2| = \left| \frac{a^3}{6} - \frac{a}{2} + \frac{1}{3} \right|, \text{ 令 } f(a) = \frac{a^3}{6} - \frac{a}{2} + \frac{1}{3}, \text{ 则 } f'(a) = a^2 - \frac{1}{2}, \text{ 则}$$

当 $a > \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $f'(a) > 0$; 当 $a < \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $f'(a) < 0$,

所以当 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, $f(a)$ 取到极小值, 也即最小值 $f(a)_{\min} = \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{6}}{2}$,

即 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}, |S_1 + S_2|_{\min} = \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{6}}{2}$. -----3 分或 4 分

$$(2) \quad V_1 = \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \pi \left(\frac{\sqrt{2}}{2} x \right)^2 dx - \int_0^{\frac{\sqrt{2}}{2}} \pi (x^2)^2 dx = \frac{\sqrt{2}}{60} \pi, \quad \text{-----3 分}$$

$$V_2 = \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \pi (x^2)^2 dx - \int_{\frac{\sqrt{2}}{2}}^1 \pi \left(\frac{\sqrt{2}}{2} x \right)^2 dx = \frac{1}{30} \pi + \frac{\sqrt{2}}{60} \pi, \quad \text{----3 分}$$

$$\text{因此 } V = V_1 + V_2 = \frac{1}{30} (\sqrt{2} + 1) \pi. \quad \text{-----1 分}$$

(建议: 画出草图给 1 分, 交点 1 分)

五、(本题 10 分)

如果 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上连续, 且 $\int_0^{\pi} f(x) \cos x dx = 0$, 证明存在一点 $\xi \in (0, \pi)$, 使得 $f'(\xi) = 0$.

证明: 由积分中值定理, 存在 $\xi_1 \in (0, \frac{\pi}{2})$, $\xi_2 \in (\frac{\pi}{2}, \pi)$, 使得

$$0 = \int_0^{\pi} f(x) \cos x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(x) \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} f(x) \cos x dx \quad \text{-----3 分}$$

$$= f(\xi_1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx + f(\xi_2) \int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \cos x dx \quad \text{-----3 分}$$

$$= f(\xi_1) - f(\xi_2), \quad \text{-----2 分}$$

即 $f(\xi_1) = f(\xi_2)$ 。

由 Rolle 定理知, 存在 $\xi \in (0, \pi)$, 使得 $f'(\xi) = 0$. -----3 分

六 附加 (10 分)

设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上连续, 且 $\int_0^1 f(t) dt = 3 \int_0^{\frac{1}{3}} e^{1-x^2} \left(\int_0^x f(t) dt \right) dx$,

证明至少存在一个 $\xi \in (0,1)$ 使得 $f(\xi) = 2\xi \int_0^\xi f(x) dx$.

证明: 设 $\varphi(x) = e^{-x^2} \int_0^x f(t) dt$, -----2 分

则 $\varphi(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导,

$$\begin{aligned} \text{而 } \varphi(1) &= e^{-1} \int_0^1 f(t) dt = e^{-1} \cdot 3 \int_0^{1/3} e^{1-x^2} \left(\int_0^x f(t) dt \right) dx \\ &= 3 \int_0^{1/3} \varphi(x) dx = 3\varphi(\xi_1) \cdot \frac{1}{3} = \varphi(\xi_1) \end{aligned} \quad \text{-----4 分}$$

根据 Rolle 定理知, $\exists \xi \in (\xi_1, 1)$, 使得 $\varphi'(\xi) = 0$, -----2 分

$$\text{即 } e^{-\xi^2} [f(\xi) - 2\xi \int_0^\xi f(x) dx] = 0 \Rightarrow f(\xi) = 2\xi \int_0^\xi f(x) dx. \quad \text{---2 分}$$