

这是 09 年上学期的数分期末考试题,给你们期末复习作下参考~
原试卷中的错误已经更正
期末加油!

一、 (20) 回答题

1) 叙述带有 Peano 余项的 Taylor 定理.

设函数 f 在点 x_0 有直到 n 阶的导数, 则:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + o[(x-x_0)^n], \quad (x \rightarrow x_0)$$

2) 叙述带有 Lagrange 余项的 Taylor 定理.

f 在 $[a, b]$ 上有 n 阶连续导数, 在 (a, b) 内有 $n+1$ 阶导数,
则对 $\forall x_0, x \in [a, b]$, 有:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(x_0)}{k!} (x-x_0)^k + R_n(x),$$

$$\text{其中 } R_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi_1)}{(n+1)!} (x-x_0)^{n+1}, \quad (\xi_1 \text{ 介于 } x, x_0 \text{ 之间})$$

3) 叙述利用达布上和和下和的可积的两个等价定理。

$$1 \quad \lim_{\|\pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega_i \Delta x_i = 0, \text{ 其中 } \omega_i = M_i - m_i \text{ 是 } f \text{ 在 } [x_{i-1}, x_i] \text{ 上的振幅; } (i=1, 2, \dots, n)$$

$$2 \quad \underline{I} = \overline{I}.$$

4) 叙述定积分的定义.

设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上有界,

在 $[a, b]$ 中任意插入若干个分点

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{n-1} < x_n = b$$

把区间 $[a, b]$ 分成 n 个小区间,

各小区间的长度依次为 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$, $(i=1, 2, \dots, n)$,

在各小区间上任取一点 ξ_i ($\xi_i \in \Delta x_i$),

作乘积 $f(\xi_i) \Delta x_i$ ($i=1, 2, \dots, n$)

并作和

$$S = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i,$$

记 $\lambda = \max\{\Delta x_1, \Delta x_2, \dots, \Delta x_n\}$,

只要当 $\lambda \rightarrow 0$ 时, $I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$ 存在,

称 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上 (Riemann) 可积.

极限值 I 称为函数 $f(x)$

在区间 $[a, b]$ 上的 Riemann 积分或定积分, 记为

$$\int_a^b f(x) dx = I = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

5) 叙述 Lebesgue 定理.

若函数 f 在有限区间 $[a, b]$ 上有界, 那么 f 在 $[a, b]$ 上 Riemann 可积的充要条件是 $D(f)$ 是一零测集.

其中: $D(f) = \{x \in [a, b] : f \text{ 在 } x \text{ 处不连续}\}$

二、 (20) 计算下面问题

1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \sin x}{\sqrt{1+x^2} - \cos x^2}$ (利用带有 Peano 余项的 Maclaurin 公式)

提示: $\sqrt{1+x} = 1 + \frac{1}{2}x + \frac{1}{2!} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} - 1\right)x^2 + o(x^2)$

解: $\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + o(x^2)$ $\sin x = x - \frac{x^3}{3!} + o(x^3)$

$$\ln(1+x) - \sin x = -\frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3!} + o(x^3) = -\frac{x^2}{2} + o(x^2)$$

$$\sqrt{1+x^2} = 1 + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2!} \cdot \frac{1}{2} \cdot \left(\frac{1}{2} - 1\right)x^4 + o(x^4) \quad \cos x^2 = 1 - \frac{x^4}{2!} + o(x^4)$$

$$\sqrt{1+x^2} - \cos x^2 = \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{8}x^4 + o(x^4) = \frac{1}{2}x^2 + o(x^2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \sin x}{\sqrt{1+x^2} - \cos x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{x^2}{2} + o(x^2)}{\frac{x^2}{2} + o(x^2)^2} = -1$$

$$2) \quad \text{求} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sin x} \sqrt{\tan t} dt}{\int_0^{\tan x} \sqrt{\sin t} dt}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{\sin x} \sqrt{\tan t} dt}{\int_0^{\tan x} \sqrt{\sin t} dt} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{\tan(\sin x)} \cos x}{\sqrt{\sin(\tan x)} \sec^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sqrt{\sin x}}{\sqrt{\tan x}} = 1$$

$$3) \quad \text{利用定积分定义, 求} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \dots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n} \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left[\sin \frac{\pi}{n} + \sin \frac{2\pi}{n} + \dots + \sin \frac{(n-1)\pi}{n} + \sin \frac{n\pi}{n} \right]$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \sin \frac{i\pi}{n}$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\sin \frac{i\pi}{n} \right) \cdot \frac{1}{n} = \int_0^1 \sin \pi x dx.$$

或

$$= \frac{1}{\pi} \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \left(\sin \frac{i\pi}{n} \right) \cdot \frac{\pi}{n} = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi \sin x dx.$$

$$4) \quad \text{求} f(x) = \ln(1+x) \text{ 在 } x=3 \text{ 点的泰勒展开.}$$

$$f(x) = \ln(1+x) = \ln(4+x-3) = \ln \left(4 \left(1 + \frac{x-3}{4} \right) \right)$$

$$= \ln 4 + \ln \left(1 + \frac{x-3}{4} \right)$$

$$= \ln 4 + \frac{x-3}{4} - \frac{1}{2} \left(\frac{x-3}{4} \right)^2 + \dots + \frac{(-1)^{n-1}}{n} \left(\frac{x-3}{4} \right)^n + o((x-3)^n)$$

三、 (10) 证明下列问题 (两个题目中任选其一)

$$1. \quad \text{设函数 } f(x) \text{ 在 } \mathbb{R} \text{ 上二阶可导, } M_k = \sup_{x \in \mathbb{R}} |f^{(k)}(x)|, \quad k=0,1,2$$

$$1) \quad \text{求 } f(x+h) \text{ 在 } x \text{ 点的泰勒展开;}$$

$$2) \quad \text{求 } f(x-h) \text{ 在 } x \text{ 点的泰勒展开;}$$

$$3) \text{ 证明: } \forall h > 0, |f'(x)| \leq \frac{M_0}{h} + \frac{h}{2} M_2$$

$$4) \text{ 证明: } M_1^2 \leq 2M_0 M_2$$

解:

$$1) f(x+h) = f(x) + f'(x)h + \frac{f''(\xi_1)}{2}h^2 \quad x < \xi_1 < x+h$$

$$2) f(x-h) = f(x) - f'(x)h + \frac{f''(\xi_2)}{2}h^2 \quad x-h < \xi_2 < x$$

$$3) 2f'(x)h = f(x+h) - f(x-h) + \frac{f''(\xi_2)}{2}h^2 - \frac{f''(\xi_1)}{2}h^2$$

$$f(x) \leq M_0, f^{(2)}(x) \leq M_2 \quad \forall h > 0, |f'(x)| \leq \frac{M_0}{h} + \frac{h}{2} M_2$$

$$4) \frac{M_0}{h} + \frac{h}{2} M_2 \geq 2\sqrt{\frac{M_0}{h} \cdot \frac{h}{2} M_2} = \sqrt{2M_0 M_2}$$

$$\text{当 } \frac{M_0}{h} = \frac{h}{2} M_2, \text{ 即 } h = \sqrt{\frac{2M_0}{M_2}}, \text{ 代入 } \forall h > 0, |f'(x)| \leq \frac{M_0}{h} + \frac{h}{2} M_2, \text{ 有}$$

$$|f'(x)| \leq M_0 \sqrt{\frac{M_2}{2M_0}} + \sqrt{\frac{2M_0}{M_2}} \cdot \frac{M_2}{2} = \sqrt{2M_0 M_2}$$

$$\text{因此, } M_1^2 \leq 2M_0 M_2$$

2. 利用带有 Lagrange 余项的 Taylor 定理证明

f 在 $(-\infty, +\infty)$ 三阶可导, 若 f, f''' 有界, 证明: f', f'' 也有界.

证明: 在 $x_0 = x$ 处展开, 分别计算 $x+1, x-1$ 处值.

$$f(x+1) = f(x) + f'(x) + \frac{f''(x)}{2} + \frac{f'''(\xi_1)}{3!} \quad x < \xi_1 < x+1$$

$$f(x-1) = f(x) - f'(x) + \frac{f''(x)}{2} + \frac{f'''(\xi_2)}{3!} \quad x-1 < \xi_2 < x$$

$$\text{两式相加} \quad f(x+1) + f(x-1) = 2f(x) + f''(x) + \frac{1}{3!}[f'''(\xi_1) + f'''(\xi_2)]$$

$$\therefore |f''(x)| \leq 4M_1 + \frac{1}{3} M_2 \quad \text{有界}$$

$$\text{两式相减} \quad f(x+1) - f(x-1) = 2f'(x) + \frac{1}{3!}[f'''(\xi_1) - f'''(\xi_2)]$$

$$\therefore |f'(x)| \leq M_1 + \frac{1}{3} M_2 \quad \text{有界}$$

四、（20）求或证明下列积分

$$1) \int \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx$$

$$\text{令 } u = \ln(1+x), v' = (2-x)^{-2}$$

$$\begin{aligned} \text{故 } \int \frac{\ln(1+x)}{(2-x)^2} dx &= \int \ln(1+x) d\left(\frac{1}{2-x}\right) \\ &= \frac{1}{2-x} \ln(1+x) - \int \left(\frac{1}{2-x} \cdot \frac{1}{1+x}\right) dx \\ &= \frac{1}{2-x} \ln(1+x) - \frac{1}{3} \int \left(\frac{1}{2-x} + \frac{1}{1+x}\right) dx \\ &= \frac{1}{2-x} \ln(1+x) - \frac{1}{3} \ln(1+x) + \frac{1}{3} \ln|x-2| + C \dots\dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2) \int \frac{dx}{3\sin^2 x - 8\sin x \cos x + 5\cos^2 x} \\ &= \int \frac{dx}{(\cos^2 x)(3\tan^2 x - 8\tan x + 5)} \\ &= \int \frac{d\tan x}{(3\tan^2 x - 8\tan x + 5)} = \int \frac{d\tan x}{3\left(\tan^2 x - \frac{8}{3}\tan x + \frac{5}{3}\right)} \\ &= \frac{1}{3} \int \frac{d\tan x}{\left(\left(\tan x - \frac{4}{3}\right)^2 - \left(\frac{1}{3}\right)^2\right)} = \frac{1}{2} \ln \left| \frac{\tan x + 1}{\tan x - 1} \right| + c \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3) \int \frac{1-x}{1+x^3} dx \\ &= \int \frac{1-x+x^2-x^2}{1+x^3} dx = \int \frac{1-x+x^2}{1+x^3} dx - \int \frac{x^2}{1+x^3} dx \\ &= \ln(1+x) - \frac{1}{3} \ln(1+x^3) + C \end{aligned}$$

4) 设 $f(x)$ 在区间 \mathbf{R} 上连续, 则 $\int_0^{2\pi} f(3\cos\alpha + 4\sin\alpha)d\alpha = \int_0^{2\pi} f(5\cos\beta)d\beta$

$$\begin{aligned} & \int_0^{2\pi} f(3\cos\alpha + 4\sin\alpha)d\alpha \\ &= \int_0^{2\pi} f\left(5\left(\frac{3\cos\alpha}{5} + \frac{4\sin\alpha}{5}\right)\right)d\alpha \\ &= \int_0^{2\pi} f(5\cos(\alpha - \theta))d\alpha \quad \cos\theta = \frac{3}{5} \end{aligned}$$

$$\alpha - \theta = \beta$$

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} f(5\cos(\alpha - \theta))d\alpha &= \int_{-\theta}^{2\pi-\theta} f(5\cos\beta)d\beta \\ &= \int_0^{2\pi} f(5\cos\beta)d\beta \end{aligned}$$

五、 (20) 定积分

1. 在曲线 $y = x^2 (x \geq 0)$ 某点作切线. 使该曲线、切线、与 x 轴围成的面积 $\frac{a}{12}$, 并求此图形绕 x 轴旋转一周所围成的体积.

解: 在曲线 $y = x^2 (x \geq 0)$ 取一点 (a, a^2) ,

过 (a, a^2) 的切线方程为: $y - a^2 = 2a(x - a)$

$$S = \int_0^{a^2} \left(\frac{y + a^2}{2a} - \sqrt{y} \right) dy = \frac{a^3}{12} \Rightarrow a = 1$$

因此切线方程为: $y - 1 = 2(x - 1)$

$$V = \int_0^1 \pi x^4 dx - \int_0^1 \pi (2x - 1)^2 dx = \frac{\pi}{30}$$

3. 假设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $0 < f'(x) < 1, \forall x \in (0, 1), f(0) = 0$, 证明:

$$\left(\int_0^x f(t)dt \right)^2 > \int_0^x f^3(t)dt, \quad \forall x \in (0, 1)$$

$$\text{证明: } F(x) = \left(\int_0^x f(t)dt \right)^2 - \int_0^x f^3(t)dt$$

$$F'(x) = 2f(x) \int_0^x f(t)dt - f^3(x) = f(x) \left(2 \int_0^x f(t)dt - f^2(x) \right)$$

因 $0 < f'(x) < 1, \forall x \in (0, 1), f(0) = 0$, 所以 $f(x) > 0$

令 $g(x) = 2\int_0^x f(t)dt - f^2(x)$, 则 $g'(x) = 2f(x)[1 - f'(x)] > 0$

即得 $g(x) > g(0) = 0$

所以 $F'(x) > 0$,

则 $F(x) = \left(\int_0^x f(t)dt\right)^2 - \int_0^x f^3(t)dt > F(0) = 0, \quad \forall x \in (0,1)$

六、(10 分) 证明下面问题

设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $f(x) > 0$, 证明:

1) $F(x) = \int_0^x f(t)dt - \int_x^1 \frac{dt}{f(t)}$ 存在唯一根 $\alpha \in (0,1)$

解: $F(0) = -\int_0^1 \frac{dt}{f(t)} < 0, \quad F(1) = \int_0^1 f(t)dt > 0$

根据介值定理, 有 $\alpha \in (0,1)$, 使得 $F(\alpha) = 0$

又 $F'(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} > 0$, 即 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上严格递增,

则上述的 α 唯一。

2) 对任意自然数 n , 存在唯一 $x_n \in (0,1)$ 使得

$\int_{\frac{1}{n}}^{x_n} f(t)dt = \int_{x_n}^1 \frac{dt}{f(t)}$, 并且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \alpha$

解: 令 $F_n(x) = \int_{\frac{1}{n}}^x f(t)dt - \int_x^1 \frac{dt}{f(t)}$, 则

$F_n\left(\frac{1}{n}\right) = -\int_{\frac{1}{n}}^1 \frac{dt}{f(t)} < 0, \quad F_n(1) = \int_{\frac{1}{n}}^1 f(t)dt > 0$

根据介值定理, 有 $x_n \in \left(\frac{1}{n}, 1\right)$, 使得 $F_n(x_n) = 0$

又对任意的自然数 n , $F'_n(x) = f(x) + \frac{1}{f(x)} > 0$, 即 $F_n(x)$ 在 $[0, 1]$ 上严格递增,

则上述的 x_n 唯一。

对任意的自然数 n , $F_{n+1}(x) - F_n(x) = \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} f(t)dt > 0$, $\forall x \in (0,1)$

则 $F_n(x) = \int_{\frac{1}{n}}^x f(t)dt - \int_x^1 \frac{dt}{f(t)}$ 对 n 单调递增。

因此, $F_n(x_n) = 0 = F_{n+1}(x_{n+1}) > F_n(x_{n+1})$, 可得 $x_n > x_{n+1}$

$\{x_n\}$ 单调递减且有界, 从而可设 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \beta$

根据 $F_n(x_n) = 0$, 即 $\int_{\frac{1}{n}}^{x_n} f(t)dt = \int_{x_n}^1 \frac{dt}{f(t)}$, 当 $n \rightarrow \infty$, 有

$$\int_0^\beta f(t)dt = \int_\beta^1 \frac{dt}{f(t)},$$

结合 1) 的结果, $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \beta = \alpha$

$$\int \frac{dx}{1+x^3}$$

解：
$$\int \frac{dx}{1+x^3} = \int \frac{1+x-x}{1+x^3} dx$$

$$= \int \frac{1}{1-x+x^2} dx - \int \frac{x}{1+x^3} dx$$

其中

$$\int \frac{1}{1-x+x^2} dx = \frac{2}{3} \sqrt{3} \arctan \frac{2}{3} \sqrt{3} \left(x - \frac{1}{2}\right) + C$$

$$- \int \frac{x}{1+x^3} dx$$

$$= \int \frac{1-x-1}{1+x^3} dx = \int \frac{1-x}{1+x^3} dx - \int \frac{1}{1+x^3} dx$$

$$= \int \frac{1-x+x^2}{1+x^3} dx - \int \frac{x^2}{1+x^3} dx - \int \frac{1}{1+x^3} dx = \ln(1+x) - \frac{1}{3} \ln(1+x^3) - \int \frac{1}{1+x^3} dx$$

因此

$$\int \frac{1}{1+x^3} dx = \frac{1}{2} \ln(1+x) - \frac{1}{6} \ln(1+x^3) + \frac{1}{3} \sqrt{3} \arctan \frac{2}{3} \sqrt{3} \left(x - \frac{1}{2}\right) + C$$