

# 1 Question 1

## 1.1 Part a)

Let  $\Omega$  be the sample space. Therefore  $P(\{\Omega\}) = 1$ . Adding all the joint pmf values must sum to 1:

$$\begin{aligned}\{\Omega\} &= \bigcup_x \bigcup_y \{X = x\} \cap \{Y = y\} \\ P(\{\Omega\}) &= 1 \\ \implies 1 &= P((\{X = -1\} \cap \{Y = -1\}) \cup \dots \cup (\{X = 1\} \cap \{Y = 1\})) \\ &= P(\{X = -1\} \cap \{Y = -1\}) + \dots + P(\{X = 1\} \cap \{Y = 1\}) \\ &= (p - \frac{1}{16}) + (\frac{1}{4} - p) + (0) + (\frac{1}{8}) + (\frac{3}{16}) + (\frac{1}{8}) + (p + \frac{1}{16}) + (\frac{1}{16}) + (\frac{1}{4} - p) \\ 1 &= -\frac{1}{16} + \frac{4}{16} + \frac{7}{16} + \frac{1}{16} + \frac{1}{16} + \frac{4}{16} \\ 1 &= 1\end{aligned}$$

Unfortunately, this tells us no information about  $p$ . From the definition of probability,  $P(\{c\})$  for  $c \in \Omega$  must be greater or equal to 0,  $P(\{c \in \Omega\}) \geq 0$ . This can be used to restrict the possible values of  $p$ :

$$\begin{aligned}P(A \subseteq \Omega) &\geq 0 \\ \implies P(\{X = -1\} \cap \{Y = -1\}) &\geq 0 \\ p - \frac{1}{16} &\geq 0 \\ p &\geq \frac{1}{16} \\ \implies P(\{X = 0\} \cap \{Y = -1\}) &\geq 0 \\ \frac{1}{4} - p &\geq 0 \\ p &\leq \frac{1}{4} \\ \implies P(\{X = -1\} \cap \{Y = 1\}) &\geq 0 \\ p + \frac{1}{16} &\geq 0 \\ p &\leq \frac{1}{16}\end{aligned}$$

Therefore,  $\frac{1}{16} \leq p \leq \frac{1}{4}$ , and can be any value within this range.

## 1.2 Part b)

Aim is to find  $P(\{X = Y\})$ :

$$P(\{X = Y\}) = \sum_a P(\{X = a\} \cap \{Y = a\}) \text{ where}$$