BYRAIN PRO, СПРАВОЧНИК СПЕЦИАЛИСТА

Атлас пептидов

Одиннадцать активов, одна страница на каждый

Класс, INCI, механизм, что решает, опубликованные данные и в каких продуктах BYRAIN содержится. Для подбора ухода по задаче и для разговора с клиенткой на языке состава.



КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АТЛАСОМ

Четыре класса, *одиннадцать* страниц

Классификация по Gorouhi, Maibach, 2009. Комплексы Haloxyl и Eyeliss описаны отдельными страницами, так как работают как единое целое

Класс 01

СИГНАЛЬНЫЕ

Имитируют матрикины и запускают синтез компонентов матрикса фибробластами.

SYN-COLL
PALMITOYL TRIPEPTIDE-1
PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7
HEXAPEPTIDE-11
ПЕПТИДЫ ФАКТОРОВ РОСТА

Класс 02

НОСИТЕЛИ

Доставляют в клетку ионы металлов, нужные ферментам синтеза и защиты.

COPPER TRIPEPTIDE-1

Класс 03

НЕЙРОПЕПТИДЫ

Снижают передачу сигнала от нерва к мимической мышце.

SYN-AKE

Класс 04

ИНГИБИТОРЫ ФЕРМЕНТОВ

Подавляют ферменты разрушения матрикса, меланогенеза и задержки жидкости.

OLIGOPEPTIDE-68
DIPEPTIDE-2
HALOXYL, EYELISS

СТРУКТУРА СТРАНИЦЫ

Слева: класс, название, INCI, ключевые параметры, краткое описание и список продуктов, где актив присутствует. Справа: механизм действия шагами, перечень задач, опубликованные данные и примечание для кабинета.

КОНЦЕНТРАЦИИ

Там, где концентрация указана, она относится к пептидному комплексу в готовом продукте и соответствует диапазону, в котором актив исследован производителем. Позиция в INCI подтверждает порядок величины.

КЛАСС 03, НЕЙРОПЕПТИД

SYN-AKE

DIPEPTIDE DIAMINOBUTYROYL BENZYLAMIDE DIACETATE

ТРИПЕПТИД, ОКОЛО 500 ДА | 4 % В ФОРМУЛЕ | DSM-FIRMENICH

Синтетический трипептид, повторяющий фрагмент Waglerin-1, пептида из яда храмовой куфии. Обратимо снижает тонус мимической мускулатуры и не даёт складке углубляться при каждом сокращении.

В ПРОДУКТАХ BYRAIN

- ○ ABSOLUTE YOUTH CREAM
- ○ ABSOLUTE YOUTH EYE CREAM
- ● **RADIANCE ANTI-AGE FILLER MASK**
- ● **FIRST TRANSFORMATION CREAM**
- ● **FIRST TRANSFORMATION EYE CREAM**
- ○ ACTIVE VITAMIN C 10 % CREAM

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

ШАГ 1
РЕЦЕПТОР МЫШЦЫ
Связывается с никотиновым рецептором ацетилхолина на мышечном волокне.

→

ШАГ 2
КАНАЛ ЗАКРЫТ
Ионный канал не открывается, натрий не входит, мышца не получает команду сократиться.

→

ШАГ 3
РАССЛАБЛЕНИЕ
Амплитуда сокращений падает, кожа над мышцей разглаживается. Эффект обратим.

ЧТО РЕШАЕТ

Мимические морщины лба, межбровья, наружных углов глаз

Профилактика фиксации динамических морщин в статические

Между инъекциями поддержание результата ботулинотерапии

Альтернатива для тех, кому инъекции недоступны по медицинским причинам или по выбору

ДАННЫЕ

−52%
ГЛУБИНА МОРЩИН, МАКСИМУМ ЗА 28 ДНЕЙ

80%
ДОБРОВОЛЬЦЕВ С ИЗМЕРИМЫМ РАЗГЛАЖИВАНИЕМ

−21%
ШЕРОХОВАТОСТЬ RA, P < 0,05

−82%
ЧАСТОТА СОКРАЩЕНИЙ МЫШЕЧНЫХ КЛЕТОК IN VITRO

Плацебо-контролируемое исследование dsm-firmenich: 30 добровольцев 40–60 лет, 4 % на лоб 2 раза в день, 28 дней.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА

Первый видимый результат к 4 неделе. Не заменяет ботулинотерапию при глубоких статических морщинах, но продлевает её эффект и работает там, где инъекции не применяют.

КЛАСС 01, СИГНАЛЬНЫЙ ПЕПТИД

SYN-COLL

PALMITOYL TRIPEPTIDE-5, PAL-LYS-VAL-LYS

ОКОЛО 611 ДА | 3 % В ФОРМУЛЕ | PENTAPHARM, DSM-FIRMENICH

Пальмитоилированный трипептид, копирующий активный участок тромбоспондина-1. Запускает собственный синтез коллагена через главный сигнал фибробласта и одновременно сдерживает ферменты, которые коллаген разрушают.

В ПРОДУКТАХ BYRAIN

- ○ ABSOLUTE YOUTH CREAM
- ○ ABSOLUTE YOUTH EYE CREAM
- ● **RADIANCE ANTI-AGE FILLER MASK**
- ● **FIRST TRANSFORMATION CREAM**
- ● **FIRST TRANSFORMATION EYE CREAM**
- ○ ACTIVE VITAMIN C 10 % CREAM

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

ШАГ 1
ТРОМБОСПОНДИН
Повторяет мотив KRFK тромбоспондина-1, природного активатора латентного TGF-β.

→

ШАГ 2
TGF-B
Активный TGF-β связывается с рецептором фибробласта и включает гены коллагена I и III.

→

ШАГ 3
ЗАЩИТА
Снижает экспрессию MMP-1 и MMP-3. Новые волокна накапливаются, а не расщепляются.

ЧТО РЕШАЕТ

Плотность и упругость кожи при снижении синтеза коллагена

Глубокие морщины статические складки, заломы

Ремоделирование после микронидлинга, лазера, RF

Поры уплотнение дермы уменьшает их выраженность

ДАННЫЕ

+104%
СИНТЕЗ КОЛЛАГЕНА I IN VITRO, 72 ЧАСА

−12%
ВЫРАЖЕННОСТЬ МОРЩИН, 2,5 %, 84 ДНЯ

77%
ОТМЕТИЛИ РОСТ УПРУГОСТИ ЗА 4 НЕДЕЛИ

60%
ЗАМЕТИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ ПОР ЗА 4 НЕДЕЛИ

Патент EP1625150; исследование с участием 45 добровольцев, 1 % и 2,5 %, 2 раза в день, 84 дня; тест с 33 участницами, 4 недели.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА

Структурный актив с горизонтом 8–12 недель. В сочетании с SYN-AKE закрывает и динамический, и статический компонент морщины.

КЛАСС 01, СИГНАЛЬНЫЙ ПЕПТИД, МАТРИКИН

Palmitoyl Tripeptide-1

PAL-GLY-HIS-LYS, PAL-GHK. ЧАСТЬ КОМПЛЕКСА MATRIXYL 3000 ВМЕСТЕ С PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7

ОКОЛО 578 ДА	MATRIXYL 3000, 3 %	SEDERMA

Пальмитоилированный фрагмент α2-цепи коллагена I. Кожа узнаёт его как сигнал о распаде собственного коллагена и отвечает восстановлением: синтезом коллагена, фибронектина и гликозаминогликанов.

В ПРОДУКТАХ BYRAIN

- ● ABSOLUTE YOUTH CREAM
- ○ ABSOLUTE YOUTH EYE CREAM
- ● RADIANCE ANTI-AGE FILLER MASK
- ● FIRST TRANSFORMATION CREAM
- ● FIRST TRANSFORMATION EYE CREAM
- ○ ACTIVE VITAMIN C 10 % CREAM

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

ШАГ 1

МАТРИКИН

GHK образуется в коже при расщеплении коллагена. Синтетическая копия с липидным хвостом проникает в дерму.

→

ШАГ 2

РЕЦЕПТОР

Фибробласт воспринимает фрагмент как признак повреждения матрикса.

→

ШАГ 3

СИНТЕЗ

Растёт выработка коллагена I и III, фибронектина, гиалуроновой кислоты. С Pal-GQPR эффект усиливается.

ЧТО РЕШАЕТ

Морщины уменьшение площади, объёма и глубины

Плотность восстановление дермального матрикса

Ровность тона за счёт выравнивания микрорельефа

Фотостарение восстановление после фрагментации коллагена

ДАННЫЕ

−39%
ПЛОЩАДЬ ГЛУБОКИХ МОРЩИН, 2 МЕСЯЦА

−33%
ПЛОТНОСТЬ ГЛУБОКИХ МОРЩИН, 2 МЕСЯЦА

−23%
ОБЪЁМ МОРЩИН, 2 МЕСЯЦА

+16%
РОВНОСТЬ ТОНА КОЖИ, 2 МЕСЯЦА

Sederma, Matrixyl 3000: 23 женщины 42–67 лет, 3 %, 2 раза в день, 2 месяца.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА

Один из самых документированных матрикинов. В BYRAIN всегда идёт в паре с Palmitoyl Tetrapeptide-7, как в оригинальном исследовании.

КЛАСС 01, СИГНАЛЬНЫЙ ПЕПТИД, ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНЫЙ

Palmitoyl Tetrapeptide-7

PAL-GLY-GLN-PRO-ARG, PAL-GQPR. ЧАСТЬ КОМПЛЕКСОВ MATRIXYL 3000, HALOXYL И EYELISS

ОКОЛО 694 ДА | В ТРЁХ КОМПЛЕКСАХ | SEDERMA

Пальмитоилированный фрагмент иммуноглобулина G. Снижает выработку интерлейкина-6 кератиноцитами и фибробластами после ультрафиолета и тем самым разрывает связь между хроническим воспалением и потерей коллагена.

В ПРОДУКТАХ BYRAIN

- ● ABSOLUTE YOUTH CREAM
- ● ABSOLUTE YOUTH EYE CREAM
- ● RADIANCE ANTI-AGE FILLER MASK
- ● FIRST TRANSFORMATION CREAM
- ● FIRST TRANSFORMATION EYE CREAM
- ○ ACTIVE VITAMIN C 10 % CREAM

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

ШАГ 1
ВОСПАЛЕНИЕ
Ультрафиолет и стресс заставляют клетки кожи выделять интерлейкин-6.

→

ШАГ 2
IL-6 СНИЖЕН
Pal-GQPR уменьшает выброс IL-6 и других медиаторов воспаления.

→

ШАГ 3
МАТРИКС СОХРАНЁН
Меньше цитокинов означает меньше активации металлопротеиназ и меньше потери коллагена.

ЧТО РЕШАЕТ

Воспалительное старение хроническое низкоинтенсивное воспаление дермы

Реактивность покраснение, дискомфорт у чувствительной кожи

Зона глаз отёчность и дряблость тонкой кожи век

Синергия усиливает действие Pal-GHK в Matrixyl 3000

ДАННЫЕ

IL-6
КЛЮЧЕВОЙ ЦИТОКИН, ВЫБРОС КОТОРОГО СНИЖАЕТ ПЕПТИД

3
КОМПЛЕКСА SEDERMA СОДЕРЖАТ PAL-GQPR

5
ПРОДУКТОВ BYRAIN ВКЛЮЧАЮТ ПЕПТИД

2 мес.
СРОК ИССЛЕДОВАНИЯ MATRIXYL 3000

Sederma: исследования in vitro по выбросу IL-6 кератиноцитами после УФ; клинические данные комплексов Matrixyl 3000, Haloxyl, Eyeliss.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пептид, который делает формулу комфортной для чувствительной и постпроцедурной кожи. Противовоспалительное действие без стероидов и без подавления иммунитета.

КЛАСС 02, ПЕПТИД-НОСИТЕЛЬ

Copper Tripeptide-1

GHK-CU, GLY-HIS-LYS В КОМПЛЕКСЕ С ИОНОМ МЕДИ

340 ДА БЕЗ МЕДИ | 1 % В ФОРМУЛЕ | ОТКРЫТ ПИКАРТОМ, 1973

Природный трипептид плазмы крови, уровень которого падает с возрастом. Переносит медь в клетки, где она нужна ферментам сшивки коллагена и антиоксидантной защиты, и сам стимулирует синтез компонентов матрикса.

В ПРОДУКТАХ BYRAIN

- ● ABSOLUTE YOUTH CREAM
- ● ABSOLUTE YOUTH EYE CREAM
- ○ RADIANCE ANTI-AGE FILLER MASK
- ○ FIRST TRANSFORMATION CREAM
- ○ FIRST TRANSFORMATION EYE CREAM
- ● ACTIVE VITAMIN C 10 % CREAM

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

ШАГ 1
МЕДЬ В КЛЕТКУ
GHK связывает Cu^{2+} и переносит ион через мембрану фибробласта.

→

ШАГ 2
ФЕРМЕНТЫ
Медь активирует лизилоксидазу (сшивка коллагена и эластина) и супероксиддисмутазу (защита от радикалов).

→

ШАГ 3
РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ
Растёт синтез коллагена, эластина, декорина, гликозаминогликанов; баланс MMP и их ингибиторов смещается к восстановлению.

ЧТО РЕШАЕТ

Плотность и упругость сшивка новых волокон в прочную сеть

Восстановление после процедур и повреждений, заживление

Истончённая кожа век и шеи в 45+

Тон выравнивание за счёт ремоделирования дермы

ДАННЫЕ

200 → 80
НГ/МЛ GHK В ПЛАЗМЕ В 20 И 60 ЛЕТ

−30%
ГЛУБИНА МОРЩИН ВОКРУГ ГЛАЗ, 8–12 НЕДЕЛЬ

−55%
ОБЪЁМ МОРЩИН ВОКРУГ ГЛАЗ, 8–12 НЕДЕЛЬ

+30%
ЭЛАСТИЧНОСТЬ И ПЛОТНОСТЬ КОЖИ ВЕК

McGill University, Yuvan Research: 67 женщин 35–65 лет. Leyden et al., 2002: 12 недель. Pickart, Margolina, 2018: обзор данных по экспрессии генов.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА

Пептид выбора для подготовки и восстановления после процедур, а также для кожи, которая плохо переносит ретинол: стимуляция без раздражения.

КЛАСС 04, РЕГУЛЯТОР МЕЛАНОГЕНЕЗА

Oligopeptide-68

БИОМИМЕТИЧЕСКИЙ ОЛИГОПЕПТИД В ЛИПОСОМАЛЬНОЙ ФОРМЕ

2,5 % В ФОРМУЛЕ | ЛИПОСОМАЛЬНЫЙ | LUCAS MEYER COSMETICS

Пептид, который действует на регуляцию меланогенеза выше уровня тирозиназы: снижает активность фактора транскрипции MITF. Меланоцит производит меньше пигмента, оставаясь живым и здоровым, в отличие от действия цитотоксичных отбеливателей.

В ПРОДУКТАХ BYRAIN

- ● ABSOLUTE YOUTH CREAM
- ● ABSOLUTE YOUTH EYE CREAM
- ○ RADIANCE ANTI-AGE FILLER MASK
- ○ FIRST TRANSFORMATION CREAM
- ○ FIRST TRANSFORMATION EYE CREAM
- ○ ACTIVE VITAMIN C 10 % CREAM

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

ШАГ 1

СИГНАЛ

Пептид воспринимается меланоцитом как регуляторный сигнал пути TGF-β.

→

ШАГ 2

MITF

Снижается экспрессия MITF, главного регулятора генов пигментации.

→

ШАГ 3

МЕНЬШЕ МЕЛАНИНА

Падает синтез тирозиназы, TRP-1 и TRP-2. Новый пигмент образуется медленнее, старый выводится с обновлением эпидермиса.

ЧТО РЕШАЕТ

Возрастная пигментация лентиго, пятна фотостарения

Неровный тон тусклость и пятнистость в 40+

Тёмные круги пигментного типа

Профилактика поствоспалительной пигментации после процедур

ДАННЫЕ

MITF
МИШЕНЬ ПЕПТИДА: РЕГУЛЯТОР ПИГМЕНТАЦИИ

3
ФЕРМЕНТА МЕЛАНОГЕНЕЗА ПОД КОНТРОЛЕМ MITF

8–12 нед.
ГОРИЗОНТ РЕЗУЛЬТАТА ПО ТОНУ КОЖИ

I–VI
ФОТОТИПЫ, ДЛЯ КОТОРЫХ ПРИГОДЕН МЕХАНИЗМ

Данные производителя: in vitro по экспрессии MITF и тирозиназы в меланоцитах; клиническая оценка тона кожи.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА

Работает в паре с витамином C и SPF. Не вызывает раздражения и не истончает кожу, поэтому подходит для длительного курса и для периода после пилингов и лазера.

КЛАСС 01, СИГНАЛЬНЫЙ ПЕПТИД

Hexapeptide-11

PHE-VAL-ALA-PRO-PHE-PRO, ПЕПТИД ФЕРМЕНТАЦИИ SACCHAROMYCES

ОКОЛО 690 ДА | БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ | ACTIVE CONCEPTS

Гексапептид, выделенный из ферментационного лизата дрожжей. Поддерживает активность фибробластов и тонус дермы, в исследованиях производителя повышал упругость и эластичность кожи и уменьшал признаки дряблости.

В ПРОДУКТАХ BYRAIN

- ● ABSOLUTE YOUTH CREAM
- ● ABSOLUTE YOUTH EYE CREAM
- ○ RADIANCE ANTI-AGE FILLER MASK
- ○ FIRST TRANSFORMATION CREAM
- ○ FIRST TRANSFORMATION EYE CREAM
- ○ ACTIVE VITAMIN C 10 % CREAM

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

ШАГ 1
ФИБРОБЛАСТ
Пептид взаимодействует с фибробластами дермы и поддерживает их синтетическую активность.

→

ШАГ 2
МАТРИКС
Растёт продукция компонентов внеклеточного матрикса, улучшается организация волокон.

→

ШАГ 3
ТОНУС
Кожа становится плотнее и эластичнее, овал держит форму.

ЧТО РЕШАЕТ

Дряблость снижение тонуса кожи лица и шеи

Овал потеря чёткости нижней трети

Эластичность способность кожи возвращать форму

Веки нависание и складчатость верхнего века

ДАННЫЕ

6
АМИНОКИСЛОТ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ

28 дней
СРОК ОЦЕНКИ УПРУГОСТИ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

2
ПРОДУКТА BYRAIN СОДЕРЖАТ ПЕПТИД

35+
ВОЗРАСТ, С КОТОРОГО АКТУАЛЬНА ЗАДАЧА ТОНУСА

Active Concepts: данные in vitro по фибробластам и клиническая оценка упругости и эластичности.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА

Дополняет матрикины: Pal-GHK и SYN-COLL отвечают за количество коллагена, Hexapeptide-11 за тонус ткани. В Absolute Youth работает вместе с фитоэстрогенами.

КЛАСС 01, ПЕПТИДЫ ФАКТОРОВ РОСТА

Комплекс факторов роста

OLIGOPEPTIDE-1, OLIGOPEPTIDE-2, OLIGOPEPTIDE-3, ACETYL GLUTAMINE

BIO-PLACENTA, 3 % | БИОМИМЕТИЧЕСКИЕ | BIO-FD&C

Три олигопептида, воспроизводящие активные участки факторов роста кожи, в первую очередь эпидермального (EGF) и инсулиноподобного (IGF-1), в комплексе с ацетилглутамином. Ускоряют обновление эпидермиса и поддерживают фибробласты.

В ПРОДУКТАХ BYRAIN

- ● ABSOLUTE YOUTH CREAM
- ● ABSOLUTE YOUTH EYE CREAM
- ○ RADIANCE ANTI-AGE FILLER MASK
- ○ FIRST TRANSFORMATION CREAM
- ○ FIRST TRANSFORMATION EYE CREAM
- ○ ACTIVE VITAMIN C 10 % CREAM

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

ШАГ 1

РЕЦЕПТОРЫ ФАКТОРОВ РОСТА

Пептиды связываются с рецепторами кератиноцитов и фибробластов, как природные факторы роста.

→

ШАГ 2

ПРОЛИФЕРАЦИЯ

Ускоряется деление и миграция клеток, эпидермис обновляется быстрее.

→

ШАГ 3

СИНТЕЗ

Фибробласты усиливают выработку коллагена и гиалуроновой кислоты; ацетилглутамин поддерживает энергетический обмен клеток.

ЧТО РЕШАЕТ

Замедленное обновление тусклая, утолщённая роговым слоем кожа

Истончение эпидермиса в период гормонального старения

Восстановление барьера после повреждений и процедур

Сияние за счёт ускоренного обновления

ДАННЫЕ

EGF

ФАКТОР РОСТА, КОТОРЫЙ ВОСПРОИЗВОДИТ OLIGOPEPTIDE-1

IGF-1

ФАКТОР РОСТА, КОТОРЫЙ ВОСПРОИЗВОДИТ OLIGOPEPTIDE-2

3

ОЛИГОПЕПТИДА В КОМПЛЕКСЕ

2

ПРОДУКТА BYRAIN СОДЕРЖАТ КОМПЛЕКС

Данные производителя комплекса по пролиферации кератиноцитов и фибробластов in vitro.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА

Комплекс для кожи 45+, которая обновляется медленно и плохо переносит ретинол. Стимулирует обновление без отшелушивания и раздражения.

КЛАСС 04, ИНГИБИТОР ФЕРМЕНТА

Dipeptide-2

VAL-TRP, ВАЛИН-ТРИПТОФАН. ЧАСТЬ КОМПЛЕКСА EYELISS

303 ДА | EYELISS | SEDERMA

Дипептид, ингибирующий ангиотензин-превращающий фермент в коже. Улучшает лимфодренаж и микроциркуляцию в зоне под глазами, где задержка жидкости формирует мешки и утреннюю отёчность.

В ПРОДУКТАХ BYRAIN

- ○ ABSOLUTE YOUTH CREAM
- ● **ABSOLUTE YOUTH EYE CREAM**
- ○ RADIANCE ANTI-AGE FILLER MASK
- ○ FIRST TRANSFORMATION CREAM
- ● **FIRST TRANSFORMATION EYE CREAM**
- ○ ACTIVE VITAMIN C 10 % CREAM

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

ШАГ 1
АПФ
Дипептид связывает ангиотензин-превращающий фермент и снижает его активность.

→

ШАГ 2
СОСУДЫ И ЛИМФА
Улучшается местная микроциркуляция и отток лимфы.

→

ШАГ 3
МЕНЬШЕ ОТЁКА
Жидкость не задерживается в рыхлой клетчатке под глазами, мешки уменьшаются.

ЧТО РЕШАЕТ

Мешки под глазами хроническая задержка жидкости

Утренняя отёчность после сна, соли, недосыпа

После процедур отёк после инъекций и аппаратных методик в периорбитальной зоне

Контур более чёткая граница нижнего века

ДАННЫЕ

65%
ИЗМЕРИМОЕ УМЕНЬШЕНИЕ МЕШКОВ, EYELISS, 28 ДНЕЙ

70%
ИЗМЕРИМОЕ УМЕНЬШЕНИЕ МЕШКОВ, EYELISS, 56 ДНЕЙ

52%
ОТМЕТИЛИ УМЕНЬШЕНИЕ МЕШКОВ САМИ

62%
ОТМЕТИЛИ РАЗГЛАЖИВАНИЕ КОНТУРА ГЛАЗ

Sederma, Eyeliss: клиническая оценка на 28 и 56 день и самооценка участников.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА

Работает вместе с гесперидином, который укрепляет стенку капилляров. Наносить похлопывающими движениями от внутреннего угла глаза к наружному.

КЛАСС 04 + КЛАСС 01, КОМПЛЕКС ДЛЯ ТЁМНЫХ КРУГОВ

Haloxyl

CHRYSIN, N-HYDROXYSUCCINIMIDE, PALMITOYL TRIPEPTIDE-1, PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7

3 % В ФОРМУЛЕ | SEDERMA | КОЛОРИМЕТРИЯ L*A*B*

Комплекс против тёмных кругов сосудистого типа. Два небелковых компонента выводят пигменты распада гемоглобина, два матрикина уплотняют тонкую кожу под глазами, чтобы сосуды меньше просвечивали.

В ПРОДУКТАХ BYRAIN

- ● **ABSOLUTE YOUTH CREAM**
- ○ ABSOLUTE YOUTH EYE CREAM
- ● **RADIANCE ANTI-AGE FILLER MASK**
- ● **FIRST TRANSFORMATION CREAM**
- ● **FIRST TRANSFORMATION EYE CREAM**
- ○ ACTIVE VITAMIN C 10 % CREAM

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

ШАГ 1

ГЕМОГЛОБИН

Из капилляров под глазами просачиваются эритроциты, гемоглобин распадается на билирубин и железо, которые окрашивают кожу.

→

ШАГ 2

ВЫВЕДЕНИЕ

Хризин активирует фермент UGT1A1, выводящий билирубин; N-гидроксисукцинимид связывает железо в растворимую форму.

→

ШАГ 3

УПЛОТНЕНИЕ

Pal-GHK и Pal-GQPR повышают плотность кожи, тёмная сосудистая сеть становится менее заметной.

ЧТО РЕШАЕТ

Тёмные круги сосудистого и смешанного типа

Синяки ускорение выведения пигментов после инъекций

Тонкая кожа век с просвечивающими сосудами

Усталый вид в сочетании с Eyeliss

ДАННЫЕ

72%
ДОБРОВОЛЬЦЕВ С УМЕНЬШЕНИЕМ КРАСНОГО КОМПОНЕНТА

–19,5%
КРАСНЫЙ КОМПОНЕНТ КРУГОВ У ОТВЕТИВШИХ НА УХОД

+247%
ЭКСПРЕССИЯ UGT1A1 IN VITRO, 2 % HALOXYL

56 дней
СРОК ПЛАЦЕБО-КОНТРОЛИРУЕМОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Sederma: 22 добровольца, 2 % гель на один глаз против плацебо, 56 дней, колориметрия и анализ изображений.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА

При пигментных тёмных кругах комплекс сочетают с Oligopeptide-68, при отёчных с Eyeliss. В BYRAIN три крема для глаз и лица содержат оба механизма.

КЛАСС 04 + КЛАСС 01, КОМПЛЕКС ПРОТИВ ОТЁКОВ

Eyeliss

HESPERIDIN METHYL CHALCONE, DIPEPTIDE-2, PALMITOYL TETRAPEPTIDE-7

SEDERMA | 28 И 56 ДНЕЙ | ДЛЯ ВЕК

Комплекс против мешков под глазами, который действует на три причины отёка сразу: проницаемость капилляров, лимфатический застой и воспаление. Укрепляет, дренирует и успокаивает.

В ПРОДУКТАХ BYRAIN

- ABSOLUTE YOUTH CREAM
- **ABSOLUTE YOUTH EYE CREAM**
- RADIANCE ANTI-AGE FILLER MASK
- FIRST TRANSFORMATION CREAM
- **FIRST TRANSFORMATION EYE CREAM**
- ACTIVE VITAMIN C 10 % CREAM

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ

ШАГ 1

КАПИЛЛЯРЫ

Гесперидин метилхалкон снижает проницаемость стенки капилляров, жидкость меньше выходит в ткань.

→

ШАГ 2

ДРЕНАЖ

Dipeptide-2 ингибирует АПФ и улучшает отток лимфы.

→

ШАГ 3

ВОСПАЛЕНИЕ

Pal-GQPR снижает выброс интерлейкина-6, поддерживает упругость и гладкость кожи век.

ЧТО РЕШАЕТ

Мешки под глазами хронические и утренние

Отёк после процедур инъекции, лазер, микронидлинг периорбитальной зоны

Дряблость век потеря упругости нижнего века

Усталый взгляд в сочетании с Haloxyl

ДАННЫЕ

65%
ИЗМЕРИМОЕ УЛУЧШЕНИЕ ЧЕРЕЗ 28 ДНЕЙ

70%
ИЗМЕРИМОЕ УЛУЧШЕНИЕ ЧЕРЕЗ 56 ДНЕЙ

62%
ОТМЕТИЛИ БОЛЕЕ ГЛАДКИЙ КОНТУР ГЛАЗ

3
МЕХАНИЗМА В ОДНОМ КОМПЛЕКСЕ

Sederma, Eyeliss: клиническая оценка на 28 и 56 день, самооценка участников.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА

Рекомендовать клиенткам с утренней отёчностью и после периорбитальных процедур. Наносить вечером, при выраженных отёках дополнительно утром.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Пептиды *по продуктам*

По составам продуктов. Haloxyl учитывается при наличии хризина и N-гидроксисукцинимида, Eyeliss при наличии гесперидина метилхалкона и Dipeptide-2

ПРОДУКТ	SYN-AKE	SYN-COLL	PAL-TRIPEPTIDE-1	PAL-TETRAPEPTIDE-7	GHK-CU	OLIGOPEPTIDE-68	HEXAPEPTIDE-11	ФАКТОРЫ РОСТА	DIPEPTIDE-2	HALOXYL	EYELISS
ABSOLUTE YOUTH CREAM			●	●	●	●	●	●		●	
ABSOLUTE YOUTH EYE CREAM				●	●	●	●	●	●		●
RADIANCE ANTI-AGE FILLER MASK	●	●	●	●						●	
FIRST TRANSFORMATION CREAM	●	●	●	●						●	
FIRST TRANSFORMATION EYE CREAM	●	●	●	●					●	●	●
ACTIVE VITAMIN C 10 % CREAM					●						

Absolute Youth

ПЛОТНОСТЬ, ТОН, ОБНОВЛЕНИЕ

Матрикины, GHK-Cu, Hexapeptide-11, факторы роста и Oligopeptide-68 плюс фитоэстрогены. Самая широкая пептидная система линейки для кожи 35+.

First Transformation

МИМИКА И КОЛЛАГЕН

SYN-AKE, SYN-COLL и Matrixyl 3000 в церамидной базе. Для кожи 25+ и для поддержки результата инъекций в любом возрасте.

Зона глаз

КРУГИ, ОТЁКИ, ЗАЛОМЫ

Haloxyl и Eyeliss в двух кремах для век, SYN-AKE в First Transformation Eye Cream, GHK-Cu и фитоэстрогены в Absolute Youth Eye Cream.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

Пептиды *по задачам*

Навигация для консультации: от жалобы клиентки к активу и продукту

ЗАДАЧА	ПЕПТИДЫ	ПРОДУКТЫ ПЕРВОГО ВЫБОРА
МИМИЧЕСКИЕ МОРЩИНЫ	SYN-AKE, SYN-COLL, Matrixyl 3000	First Transformation Cream, Filler Mask
СТАТИЧЕСКИЕ МОРЩИНЫ И ЗАЛОМЫ	SYN-COLL, Matrixyl 3000, GHK-Cu	Absolute Youth Cream, First Transformation Cream
ПОТЕРЯ ПЛОТНОСТИ И УПРУГОСТИ	SYN-COLL, GHK-Cu, Hexapeptide-11, факторы роста	Absolute Youth Cream
ОВАЛ ЛИЦА И ДРЯБЛОСТЬ	Hexapeptide-11, SYN-COLL, Matrixyl 3000	Absolute Youth Cream, Filler Mask
ПИГМЕНТАЦИЯ И НЕРОВНЫЙ ТОН	Oligopeptide-68, GHK-Cu	Absolute Youth Cream, Active Vitamin C Cream
ТЁМНЫЕ КРУГИ	Haloxyl, Oligopeptide-68	Absolute Youth Eye Cream, First Transformation Eye Cream
МЕШКИ И ОТЁКИ	Eyeliss, Dipeptide-2	Absolute Youth Eye Cream, First Transformation Eye Cream
ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ ПРОЦЕДУР	Pal-GQPR, GHK-Cu, факторы роста	Absolute Youth Cream, First Transformation Cream
ПОДДЕРЖКА БОТУЛИНОТЕРАПИИ	SYN-AKE	First Transformation Cream, First Transformation Eye Cream

ПРАВИЛО ПОДБОРА

Одна задача, один ведущий актив, один продукт-носитель. Вторая задача добавляет второй продукт, а не второй крем с тем же пептидом. Полный протокол редко превышает три средства на этап ухода.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ АТЛАСОМ В КАБИНЕТЕ

Пять правил *разговора* о пептидах

01 Начинайте с задачи, а не с названия: клиентка приходит с мимической морщиной, а не за SYN-AKE. Таблица задач ведёт к активу.

02 Называйте механизм одним предложением: «расслабляет мышцу», «даёт команду строить коллаген», «выводит пигмент». Подробности на странице актива.

03 Показывайте состав: пептид на 4–7 позиции INCI это рабочая доза. Это ваш аргумент против любого бренда с пептидом в конце списка.

04 Называйте сроки: нейропептиды 4 недели, сигнальные 8–12, комплексы для глаз 4–8. Так ожидания совпадут с результатом.

05 Сочетайте классы: один пептид решает одну задачу. Плотный результат даёт система из сигнала, носителя, миорелаксанта и защиты.

Источники: dsm-firmenich, Sederma (Croda), Lucas Meyer Cosmetics, Active Concepts, BIO-FD&C, патент EP1625150; Robinson et al., 2005; Leyden et al., 2002; Pickart, Margolina, 2018; Gorouhi, Maibach, 2009.

