

Фигури от втора степен

Нека \mathcal{A} е n -мерно афинно пространство и K е афинна координатна система в \mathcal{A} .

Определение 1 Подмножеството S на \mathcal{A} се нарича *хиперповърхнина от втора степен* (при $n = 2$ крива от втора степен, при $n = 3$ повърхнина от втора степен), ако спрямо K има уравнение $F(x) = 0$, където $F(x) = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j + 2 \sum_{i=1}^n a_{i,n+1}x_i + a_{n+1,n+1}$

и матрицата $A = (a_{ij})_{i,j=1,\dots,n}$ от коефициентите на квадратичната част е ненулева симетрична матрица. (Ако означим $a = (a_{1,n+1}, \dots, a_{n,n+1})$ и го разглеждаме като ред, а x разглеждаме като стълб, то $F(x) = x^t A x + 2ax + a_{n+1,n+1}$.)

Забележка 1 Дефиницията е коректна, тоест спрямо друга афинна координатна система K' уравнението на S е от същия вид, но с други коефициенти: ако смяната на координатите между K и K' се задава с $x = s + Tx'$, то спрямо K' уравнението на S е $x'^t A' x' + 2a' x' + a'_{n+1,n+1} = 0$, където

$$A' = T^t A T, \quad a' = (a + s^t A)T, \quad a'_{n+1,n+1} = a_{n+1,n+1} + 2as + s^t A s.$$

Забележка 2 Считаме, че точките могат да имат и комплексни координати, тоест разширили сме \mathcal{A} до комплексно афинно пространство.

Твърдение 1 Нека хиперповърхнините от втора степен S и S' имат спрямо K уравнения

$$S: \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_i x_j + \sum_{i=1}^n a_{i,n+1}x_i + a_{n+1,n+1} = 0 \quad \text{и} \quad S': \sum_{i,j=1}^n a'_{ij}x_i x_j + \sum_{i=1}^n a'_{i,n+1}x_i + a'_{n+1,n+1} = 0.$$

Тогава $S = S' \Leftrightarrow$ съществува $\rho \in \mathbb{R}$, $\rho \neq 0$, такова че $a'_{ij} = \rho a_{ij}$ за всички i, j (тоест когато уравнението на S' е уравнението на S , умножено с ρ).

Обратната посока на това твърдение е очевидна, а правата няма да я доказваме за да спестим време.

Забележка 3 В горното твърдение е съществено, че допускаме точки с комплексни координати. Ако разглеждаме само обичайните реални точки, то не е вярно. Например при $n = 2$ да разгледаме кривите с уравнения $x_1^2 + x_2^2 + 1 = 0$ и $x_1^2 + 1 = 0$. Тия уравнения нямат реални решения, така че ако разглеждаме кривите като реални криви те и двете са празното множество и значи съвпадат. Но уравненията им не са пропорционални.

Тъй като формулата за смяната на координатната система и уравненията на афинните трансформации имат един и същ вид, от сметката в Забележка 1 следва също

Твърдение 2 Образът на хиперповърхнина от втора степен при афинна трансформация (а следователно и при метрична трансформация, тоест еднаквост, когато A е евклидово) е хиперповърхнина от втора степен.

Определение 2 От Твърдение 2 следва, че множеството от хиперповърхнините от втора степен в A се разбива на класове на еквивалентност относно релацията афинна еквивалентност, а когато A е евклидово и относно релацията метрична еквивалентност, тоест еднаквост. Тия класове се наричат *афинни класове на фигури от втора степен* и съответно *метрични класове на фигури от втора степен*.

Забележка 4 Тъй като формулата за смяната на координатите при смяна на афинни координатни системи и уравненията на афинните трансформации имат един и същ вид, то две фигури от втора степен да са афинно еквивалентни, тоест едната да се получава от другата с афинна трансформация, е същото като да може да се намери друга афинна координатна система, така че уравнението на едната фигура спрямо нея да е същото като уравнението на другата фигура спрямо първоначалната.

Аналогично, тъй като формулата за смяната на координатите при смяна на ортонормирани координатни системи и уравненията на метричните трансформации имат един и същ вид, то две фигури от втора степен да са метрично еквивалентни, тоест едната да се получава от другата с метрична трансформация, е същото като да може да се намери друга ортонормирана координатна система, така че уравнението на едната фигура спрямо нея да е същото като уравнението на другата фигура спрямо първоначалната.

Теорема 1 (афинна класификация на хиперповърхнините от втора степен)

Съществуват краен брой афинни класове фигури от втора степен в n -мерно афинно пространство. Те се задават от хиперповърхнините, които спрямо дадена афинна координатна система имат някое от следните уравнения:

$$\begin{aligned} x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+q}^2 &= 1, & 1 \leq p+q \leq n, \\ x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+q}^2 &= 0, & n \geq p \geq q \geq 0, 1 \leq p+q \leq n, \\ x_1^2 + \dots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \dots - x_{p+q}^2 - 2x_{p+q+1} &= 0, & n \geq p \geq q \geq 0, 1 \leq p+q \leq n-1. \end{aligned}$$

(без доказателство)

Теорема 2 (метрична класификация на хиперповърхнините от втора степен)

Съществуват безбройно много метрични класове фигури от втора степен в n -мерно евклидово афинно пространство. Те се задават от хиперповърхнините, които спрямо дадена ортонормирана координатна система имат някое от следните уравнения:

$$\begin{aligned}
\frac{x_1^2}{a_1^2} + \dots + \frac{x_p^2}{a_p^2} - \frac{x_{p+1}^2}{a_{p+1}^2} - \dots - \frac{x_{p+q}^2}{a_{p+q}^2} &= 1, & 1 \leq p+q \leq n, \\
&& a_1 \geq \dots \geq a_p > 0, \\
&& a_{p+1} \geq \dots \geq a_{p+q} > 0, \\
\frac{x_1^2}{a_1^2} + \dots + \frac{x_p^2}{a_p^2} - \frac{x_{p+1}^2}{a_{p+1}^2} - \dots - \frac{x_{p+q}^2}{a_{p+q}^2} &= 0, & n \geq p \geq q \geq 0, \ 1 \leq p+q \leq n, \\
&& a_1 \geq \dots \geq a_p > 0, \\
&& a_{p+1} \geq \dots \geq a_{p+q} > 0, \\
\frac{x_1^2}{a_1^2} + \dots + \frac{x_p^2}{a_p^2} - \frac{x_{p+1}^2}{a_{p+1}^2} - \dots - \frac{x_{p+q}^2}{a_{p+q}^2} - 2x_{p+q+1} &= 0, & n \geq p \geq q \geq 0, \ 1 \leq p+q \leq n-1, \\
&& a_1 \geq \dots \geq a_p > 0, \\
&& a_{p+1} \geq \dots \geq a_{p+q} > 0.
\end{aligned}$$

(без доказателство)

Забележка 5 Неравенствата между p и q в Теорема 1 са за да се осигури поне едно събираемо от втора степен (за да е фигура от втора степен) и когато няма свободен член броят на събираемите с коефициент $+1$ да е не по-малък от броя на събираемите с коефициент -1 . Последното може да се постигне чрез преномериране на координатите, което е афинна трансформация.

Аналогична е причината за неравенствата между p и q , а също и за неравенствата между a -тата в Теорема 2, защото преномерирането на координатите на ортонормирана координатна система е метрична трансформация.

Това е така, защото преномерирането на координатите се задава с уравнението $y = Tx$, където стълбовете на T са стълбовете на единичната матрица, но пермутирани по същия начин както са пермутирани координатите. Следователно T е ортогонална, така че тая трансформация е метрична, когато координатната система е ортонормирана, и афинна, когато координатната система е афинна.

Забележка 6 Броят на афинните класове е краен, защото двойките (p, q) , които удовлетворяват неравенствата в Теорема 1, е краен. Метричните класове са безбройно много, защото при тях участват още коефициентите a , а броят на a -тата, които удовлетворяват неравенствата в Теорема 2 е безкраен.

Забележка 7 Поради Забележка 4 Теорема 1 може да се интерпретира по следния начин: За всяка хиперповърхнина от втора степен в афинно пространство съществува афинна координатна система, спрямо която уравнението ѝ е някое от уравненията от Теорема 1. Поради това тия уравнения се наричат *афинни канонични уравнения на фигурите от втора степен*.

Аналогично Теорема 2 може да се интерпретира по следния начин: За всяка хиперповърхнина от втора степен в евклидово афинно пространство съществува ортонормирана координатна система, спрямо която уравнението ѝ е някое от уравненията от Теорема 2. Поради това тия уравнения се наричат *метрични канонични уравнения на фигурите от втора степен*.

Забележка 8 Доказателството на Теорема 2 се свежда по същество до диагонализация на симетричната матрица A , тоест до намиране на собствените ѝ стойности и ортонормиран базис от собствени вектори (който ще е координатния базис на новата координатна система). След това се прави трансляция, тоест $y = s + x$, за да се изчислят всички събираеми от първа степен, чиито променливи участват и на втора степен. Накрая, ако е нужно, се прави още една смяна на ортонормирания базис за да остане само едно събираемо от първа степен и след това с още една трансляция (при която само компонентата s_{p+q+1} на s е евентуално различна от 0) се изчиства свободния член.

Същото може да се направи и за да се докаже Теорема 1. Тъй като се работи относно афинна координатна система, то трансформациите, които се извършват, няма да са метрични, а само афинни (или еквивалентно, новите координатни системи ще са афинни, а не ортонормирани). Това обаче не проваля нищо, защото за тая теорема ни трябват само афинни трансформации. Накрая, след като са получени уравненията от Теорема 2, се прави трансформация от вида $y_i = \frac{x_i}{a_i}$ (това очевидно е афинна трансформация) за да се махнат параметрите a и да останат уравненията от Теорема 1.

При $n = 2$ от Теорема 1 и Теорема 2 получаваме:

Теорема 3 (афинна класификация на кривите от втора степен в равнината)

Съществуват 9 афинни класа криви от втора степен:

№	наименование	представител/ афинно канонично уравнение	бележки
1	имагинерна елипса	$q_1 : x_1^2 + x_2^2 + 1 = 0$	Няма реални точки.
2	елипса	$q_2 : x_1^2 + x_2^2 - 1 = 0$	
3	хипербола	$q_3 : x_1^2 - x_2^2 + 1 = 0$	
4	парабола	$q_4 : x_1^2 - 2x_2 = 0$	
5	две комплексно спрегнати пресичащи се приви	$q_5 : x_1^2 + x_2^2 = 0$	Състои се от две комплексно спрегнати пресичащи се прави и има единствена реална точка – пресечната им точка. За q_5 това са правите $x_1 - ix_2 = 0$ и $x_1 + ix_2 = 0$ и точката $(0, 0)$.
6	две комплексно спрегнати успоредни приви	$q_6 : x_1^2 + 1 = 0$	Няма реални точки. Състои се от две комплексно спрегнати успоредни прави. За q_6 това са правите $x_1 - i = 0$ и $x_1 + i = 0$.
7	две реални пресичащи се приви	$q_7 : x_1^2 - x_2^2 = 0$	Състои се от две реални пресичащи се прави. За q_7 това са правите $x_1 - x_2 = 0$ и $x_1 + x_2 = 0$ и пресечната им точка е $(0, 0)$.
8	две реални успоредни приви	$q_8 : x_1^2 - 1 = 0$	Състои се от две реални успоредни прави. За q_8 това са правите $x_1 - 1 = 0$ и $x_1 + 1 = 0$.
9	една двойна права	$q_9 : x_1^2 = 0$	Състои се от една реална права. За q_9 това е правата $x_1 = 0$.

Теорема 4 (метрична класификация на кривите от втора степен в равнината)

Съществуват безбройно много метрични класове криви от втора степен. Те се задават от кривите с уравнения:

представител/ метрично канонично уравнение	афинен клас
$\frac{x_1^2}{a_1^2} + \frac{x_2^2}{a_2^2} + 1 = 0, a_1 \geq a_2 > 0$	имагинерна елипса
$\frac{x_1^2}{a_1^2} + \frac{x_2^2}{a_2^2} - 1 = 0, a_1 \geq a_2 > 0$	елипса
$\frac{x_1^2}{a_1^2} - \frac{x_2^2}{a_2^2} + 1 = 0, a_1 > 0, a_2 > 0$	хипербола
$x_1^2 - 2px_2 = 0, p > 0$	парабола
$x_1^2 + a^2x_2^2 = 0, a \geq 1$	две комплексно спрегнати пресичащи се прави
$x_1^2 + a^2 = 0, a > 0$	две комплексно спрегнати успоредни прави
$x_1^2 - a^2x_2^2 = 0, a \geq 1$	две реални пресичащи се прави
$x_1^2 - a^2 = 0, a > 0$	две реални успоредни прави
$x_1^2 = 0$	една двойна права

Забележка 9 Теорема 4 всъщност е доказана на упражненията — това е алгоритъмът за канонизация. А Теорема 3 следва от нея по същия начин както Теорема 1 следва от Теорема 2 — виж Забележка 8.