Incrementalidad y comparador

Nombre: _____

Fecha: _____

Ejemplo ilustrativo del Estado de Luvina. Escriba sus respuestas y compare con su facilitador. Use signo negativo cuando una diferencia sea un ahorro o una pérdida.

Datos del caso

El ISES evalúa un tratamiento nuevo, T, para una enfermedad crónica. En el ISES, el tratamiento de uso rutinario para esa enfermedad es R. Existe otro tratamiento, S, más costoso y de uso poco frecuente. La tabla muestra el costo y los años de vida por paciente en el horizonte del análisis.

Opción	Costo por paciente (MXN)	Años de vida por paciente
T (nuevo)	240,000	10.0
Sin tratamiento activo	60,000	6.0
R (uso rutinario en el ISES)	200,000	9.5
S (más costoso, uso poco frecuente)	260,000	9.0

Parte A. T frente a sin tratamiento activo

1. Diferencia de costos

Respuesta: _____ MXN

2. Diferencia de efectos

Respuesta: _____ años de vida

3. RCEI

Respuesta: _____ MXN por año de vida ganado

Parte B. T frente a R, el tratamiento de uso rutinario

4. Diferencia de costos

Respuesta: _____ MXN

5. Diferencia de efectos

Respuesta: _____ años de vida

6. RCEI

Respuesta: _____ MXN por año de vida ganado

Parte C. T frente a S

7. Diferencia de costos

Respuesta: _____ MXN

8. Diferencia de efectos

Respuesta: _____ años de vida

9. ¿Cómo se lee el resultado frente a S?

- ☐ T cuesta menos y da más años de vida que S.
- ☐ T cuesta más y da menos años de vida que S.
- ☐ El cálculo tiene un error porque la diferencia de costos es negativa.

Parte D. ¿Qué comparador usa el ISES?

10. ¿Qué comparador responde a la pregunta del ISES?

- ☐ Sin tratamiento activo, porque así se diseñan los ensayos clínicos.
- ☐ R, porque es el tratamiento de uso rutinario que T desplazaría.
- ☐ S, porque con él T sale más favorable.

11. ¿Por qué la RCEI frente a sin tratamiento sale más baja que frente a R?

- ☐ Porque mide todo el beneficio frente a no tratar, no el beneficio adicional frente al tratamiento vigente.
- ☐ Porque no tratar es más caro que tratar.
- ☐ Porque hay un error de cálculo en la Parte A.

12. Un informe dice: «T cuesta MXN 240,000 y da 10 años de vida; por lo tanto cuesta MXN 24,000 por año de vida». ¿Qué está mal?

- ☐ Divide totales de una sola opción; no compara T contra ninguna alternativa.
- ☐ Debió expresar el resultado en meses de vida.
- ☐ Debió sumar los costos de R.