GRADE: certeza de la evidencia

Nombre: _____

Fecha: _____

Ejemplos ilustrativos, salvo el caso del casco, que es publicado (Guyatt 2008). Elija o escriba su respuesta y compare con su facilitador.

Parte A. Dominio por dominio

La SSAL evalúa la evidencia de T para el alivio del dolor, medido con una escala que responde el propio paciente. El cuerpo de evidencia son 3 ensayos aleatorizados. La tabla resume el juicio del equipo en cada dominio.

Dominio	Hallazgo	Juicio del equipo
Riesgo de sesgo	Ningún ensayo cegó a los pacientes, y el desenlace es subjetivo	Serio
Inconsistencia	I^2 de 20%; los 3 ensayos en la misma dirección	No serio
Evidencia indirecta	Los ensayos excluyeron a pacientes con diabetes; en la SSAL son la mayoría	Serio
Imprecisión	El intervalo cruza la diferencia mínima clínicamente importante	Serio
Sesgo de publicación	Sin señales en el registro de ensayos	No detectado

1. ¿De qué certeza parte?
   - ☐ Alta
   - ☐ Moderada
   - ☐ Baja
   - ☐ Muy baja

2. ¿Qué certeza queda después del riesgo de sesgo?
   - ☐ Alta
   - ☐ Moderada
   - ☐ Baja
   - ☐ Muy baja

3. ¿Qué certeza queda después de la inconsistencia?
   - ☐ Alta
   - ☐ Moderada
   - ☐ Baja
   - ☐ Muy baja

4. ¿Qué certeza queda después de la evidencia indirecta?
   - ☐ Alta
   - ☐ Moderada
   - ☐ Baja
   - ☐ Muy baja

5. ¿Cuántos niveles baja en total?

Respuesta: _____ niveles

6. ¿Cuál es la certeza final?

- ☐ Alta
- ☐ Moderada
- ☐ Baja
- ☐ Muy baja

Parte B. ¿Qué dominio es?

7. En otro cuerpo de ensayos aleatorizados, la población es más joven que la de la SSAL y el desenlace es subrogado (hemoglobina glucosilada) en lugar de las complicaciones. El equipo juzga que el problema del conjunto es serio. ¿Cuántos niveles baja el dominio de evidencia indirecta?

Respuesta: _____ niveles

8. El intervalo del efecto absoluto va de 2 eventos más a 30 eventos menos por 1,000 pacientes, y cruza el umbral de decisión.

- ☐ Riesgo de sesgo
- ☐ Inconsistencia
- ☐ Imprecisión
- ☐ Sesgo de publicación

9. Solo hay 2 ensayos publicados, ambos del mismo patrocinador. El registro de ensayos muestra 3 estudios terminados que no se publicaron.

- ☐ Riesgo de sesgo
- ☐ Evidencia indirecta
- ☐ Imprecisión
- ☐ Sesgo de publicación

10. Un ensayo muestra un beneficio grande y otro muestra daño. Las poblaciones se parecen y nadie encuentra una explicación.

- ☐ Inconsistencia
- ☐ Evidencia indirecta
- ☐ Imprecisión
- ☐ Sesgo de publicación

Parte C. Subir la certeza y usarla

11. Un metaanálisis de estudios observacionales sobre el uso de casco muestra una razón de momios de 0.31 (IC 95%: 0.26 a 0.37) para lesiones craneales, sin razones para bajar la certeza. ¿Qué certeza le corresponde?

- ☐ Baja, porque la evidencia observacional no puede subir.
- ☐ Moderada: parte de baja y sube 1 nivel por la gran magnitud del efecto.
- ☐ Alta, porque el intervalo es estrecho.

12. En la tabla de resumen de hallazgos, la certeza global es el promedio de la certeza de los desenlaces críticos.

☐ Verdadero ☐ Falso

13. Una certeza alta garantiza una recomendación fuerte.

☐ Verdadero ☐ Falso

Diplomado en Economía de la Salud y Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Pulso. La explicación completa está en la página de la unidad U18.