Análisis de subgrupos

Nombre: _____

Fecha: _____

Ejemplos ilustrativos. Escriba sus respuestas con un decimal cuando haga falta o elija una opción y compare con su facilitador.

Parte A. Hallazgos por azar

Si no hay efecto real y las comparaciones son independientes, la probabilidad de que ninguna salga significativa con p menor de 0.05 es 0.95 elevado al número de comparaciones. La probabilidad de al menos un falso positivo es 1 menos ese valor.

Número de comparaciones	0.95 elevado a ese número
5	0.774
10	0.599
20	0.358

1. Probabilidad de al menos un falso positivo con 5 comparaciones

Respuesta: _____ %

2. Probabilidad de al menos un falso positivo con 10 comparaciones

Respuesta: _____ %

3. Un artículo reporta 1 subgrupo significativo de 20 analizados y no menciona los otros 19. ¿Qué sesgo puede haber?

- ☐ Sesgo de deserción
- ☐ Sesgo de análisis selectivo
- ☐ Sesgo de detección

Parte B. Calificar subgrupos

Un ensayo de T frente a R tiene un resultado global favorable a T. El artículo reporta tres subgrupos.

Subgrupo	Lo que reporta el artículo
C: mujeres	Post hoc. p = 0.02 dentro del subgrupo; prueba de interacción no reportada. Sin mecanismo propuesto. Misma dirección que el global. Sin replicación.
D: pacientes con la mutación M	En el protocolo. Prueba de interacción p = 0.004. T bloquea la vía que activa la mutación. Misma dirección que el global. Confirmado en un ensayo independiente.
E: mayores de 75 años	En el protocolo. Prueba de interacción p = 0.40. Sin mecanismo propuesto. Efecto en dirección contraria al global. Sin replicación.

4. ¿Cuántos de los cuatro criterios cumple el subgrupo C?
Respuesta: _____ criterios

5. ¿Cuántos criterios cumple el subgrupo D?
Respuesta: _____ criterios

6. ¿Cuántos criterios cumple el subgrupo E?
Respuesta: _____ criterios

7. ¿Qué subgrupo puede sustentar una decisión de cobertura?

- ☐ C
- ☐ D
- ☐ E

8. Con base en el subgrupo E, alguien propone que el Instituto de Salud del Estado (ISES) de Luvina restrinja T a menores de 75 años. ¿Qué responde?

- ☐ Procede, porque el subgrupo E estaba en el protocolo.
- ☐ No procede con esta evidencia: la prueba de interacción no muestra diferencia, no hay mecanismo y el resultado contradice al global.
- ☐ Procede, porque en E el efecto va en dirección contraria.

9. Un valor p menor de 0.05 dentro de un subgrupo demuestra que el efecto en ese subgrupo es distinto al del resto.

☐ Verdadero ☐ Falso

Diplomado en Economía de la Salud y Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Pulso. La explicación completa está en la página de la unidad U12.