Nombre: _____

Fecha: _____

Lectura del forest plot

Ejemplo ilustrativo. Use los datos de la tabla, escriba sus respuestas y compare con su facilitador.

Datos del caso

La Secretaría de Salud de Luvina revisa un metaanálisis de T frente a placebo para el dolor crónico. El desenlace es la diferencia de medias en una escala de dolor de 0 a 100 puntos. Un valor negativo favorece a T. La diferencia mínima clínicamente importante en esta escala es 10 puntos.

Estudio	Diferencia de medias (puntos)	Intervalo de confianza al 95%	Peso
Estudio A	-4	-9 a 1	11%
Estudio B	-6	-10 a -2	17%
Estudio C	-3	-5 a -1	70%
Estudio D	-12	-25 a 1	2%
Combinado (diamante)	-3.8	-5.5 a -2.1	100%

Parte A. Leer el gráfico

1. ¿En qué valor está la línea de nulidad?

Respuesta: _____ puntos

2. ¿El efecto combinado es estadísticamente significativo?

- ☐ Sí, porque el intervalo del diamante (-5.5 a -2.1) no cruza 0.
- ☐ No, porque dos estudios cruzan la línea de nulidad.
- ☐ No se puede saber sin el valor p.

3. ¿Cuántos estudios, por sí solos, no alcanzan significancia estadística?

Respuesta: _____ estudios

4. ¿Qué porcentaje del peso suman los estudios que, por sí solos, no alcanzan significancia estadística?

Respuesta: _____ %

5. ¿Qué estudio domina el resultado combinado?

- ☐ Estudio C, con 70% del peso.
- ☐ Estudio D, porque tiene el efecto más grande.
- ☐ Estudio B, porque es el más significativo.

Parte B. Interpretar

6. ¿Qué concluye sobre la relevancia clínica del efecto combinado?
   ☐ Es estadísticamente significativo, pero ni el extremo más favorable del intervalo (5.5 puntos) llega a los 10 puntos de la diferencia mínima: probablemente no es clínicamente relevante.
   ☐ Es clínicamente relevante porque es estadísticamente significativo.
   ☐ Es clínicamente relevante porque el estudio D muestra 12 puntos.

7. El estudio D muestra el efecto más grande. ¿Por qué pesa tan poco?
   ☐ Porque su intervalo es muy ancho: es el estimado menos preciso.
   ☐ Porque su calidad metodológica es mala.
   ☐ Porque su efecto se aleja de los demás.

8. El estudio C tiene más de 50% del peso. ¿Qué pregunta debe hacerse el evaluador?
   ☐ Si el estudio C tiene bajo riesgo de sesgo, porque el resultado combinado depende sobre todo de él.
   ☐ Si conviene eliminar el estudio C del metaanálisis.
   ☐ Ninguna, porque un peso alto garantiza un buen estudio.

9. Un cuadrado grande indica que el estudio tiene buena calidad metodológica.
   ☐ Verdadero ☐ Falso

10. En un forest plot de riesgos relativos, la línea de nulidad está en 0.
    ☐ Verdadero ☐ Falso

11. Si el intervalo de un estudio cruza la línea de nulidad, ese estudio demuestra que el tratamiento no tiene efecto.
    ☐ Verdadero ☐ Falso

Diplomado en Economía de la Salud y Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Pulso. La explicación completa está en la página de la unidad U15.