Heterogeneidad

Nombre: _____

Fecha: _____

Ejemplos ilustrativos. Elija o escriba su respuesta y compare con su facilitador.

Parte A. Clasificar el I^2

Use los rangos convencionales del punto 4 de «La idea».

1. Un metaanálisis reporta I^2 de 12%.
   - ☐ Heterogeneidad baja
   - ☐ Heterogeneidad moderada
   - ☐ Heterogeneidad alta

2. Un metaanálisis reporta I^2 de 48%.
   - ☐ Heterogeneidad baja
   - ☐ Heterogeneidad moderada
   - ☐ Heterogeneidad alta

3. Un metaanálisis reporta I^2 de 88%.
   - ☐ Heterogeneidad baja
   - ☐ Heterogeneidad moderada
   - ☐ Heterogeneidad alta

4. Un metaanálisis reporta I^2 de 0%. ¿Qué significa?
   - ☐ Que el azar podría explicar toda la variación entre estudios.
   - ☐ Que todos los estudios tienen la misma población.
   - ☐ Que el efecto es clínicamente relevante.

Parte B. El criterio de la GEI

Un expediente presenta 4 metaanálisis para distintos desenlaces del mismo insumo.

Metaanálisis	Desenlace	I^2
1	Mortalidad	18%
2	Hospitalización	47%
3	Calidad de vida	62%
4	Eventos adversos graves	79%

5. ¿Cuántos de los 4 metaanálisis cumplen la condición de la GEI (I^2 no mayor al 50%)?

Respuesta: _____ metaanálisis

6. ¿Cómo se lee el metaanálisis 3?

- ☐ Heterogeneidad moderada por convención, y por encima del 50% que la GEI pone como condición para recomendar el metaanálisis.
- ☐ Heterogeneidad alta; la GEI prohíbe todo metaanálisis.
- ☐ Heterogeneidad moderada; la GEI no pone condiciones al I^2.

Parte C. Tipos y consecuencias

7. En un metaanálisis, 3 estudios incluyen adultos de 30 a 45 años y 2 incluyen mayores de 70 años. ¿Qué tipo de heterogeneidad es?

- ☐ Clínica
- ☐ Metodológica
- ☐ Estadística

8. En otro metaanálisis, 2 estudios son doble ciego y 3 no tienen cegamiento. ¿Qué tipo de heterogeneidad es?

- ☐ Clínica
- ☐ Metodológica
- ☐ Estadística

9. Un metaanálisis tiene I^2 de 85% y un intervalo amplio del estimado combinado. ¿Cómo se lee su resultado?

- ☐ Exploratorio, no concluyente.
- ☐ Concluyente, porque combina varios estudios.
- ☐ Inválido, sin necesidad de más análisis.

10. En un metaanálisis, al excluir los 2 estudios con resultados extremos, el efecto combinado deja de ser significativo. ¿Qué indica?

- ☐ Que la heterogeneidad pesa en la conclusión.
- ☐ Que los 2 estudios eran los de mejor calidad.
- ☐ Que el metaanálisis es más sólido de lo que parecía.

11. Un I^2 alto obliga a descartar siempre el metaanálisis.

☐ Verdadero ☐ Falso

12. El I^2 indica cuál es la causa de la heterogeneidad.

☐ Verdadero ☐ Falso