Comparaciones indirectas y metaanálisis en red

Nombre: _____

Fecha: _____

Ejemplo ilustrativo. Use la tabla de la red, escriba o elija su respuesta y compare con su facilitador.

Datos de la red

El Instituto de Salud del Estado de Luvina (ISES) revisa un metaanálisis en red con 4 tratamientos (E, F, G y H) y el estándar de atención (S).

Comparación directa	Ensayos
E frente a S	5
F frente a S	3
G frente a S	2
E frente a F	2
H frente a G	1

Parte A. Leer la red

1. ¿Cuántas ligas (comparaciones directas) tiene la red?

Respuesta: _____ ligas

2. ¿Cuántos pares posibles hay entre los 5 nodos?

Respuesta: _____ pares

3. ¿Cuántos pares no tienen evidencia directa?

Respuesta: _____ pares

4. ¿En qué par se puede contrastar la evidencia directa con la indirecta para revisar la incoherencia?

- ☐ E frente a F
- ☐ H frente a G
- ☐ F frente a G
- ☐ H frente a S

5. ¿Qué tratamiento depende de un solo intermediario y de una liga con un solo ensayo?

- ☐ E
- ☐ F
- ☐ G
- ☐ H

Parte B. Supuestos y rankings

6. Los ensayos de E frente a S incluyeron pacientes en primera línea. Los de G frente a S incluyeron pacientes que ya habían fallado a 2 tratamientos. ¿Qué supuesto queda en duda para estimar E frente a G?

- ☐ Transitividad
- ☐ Consistencia (coherencia)
- ☐ Precisión del ranking

7. Para E frente a F, los ensayos directos muestran beneficio de E y la vía indirecta, a través de S, muestra lo contrario. ¿Cómo se llama ese desacuerdo?

- ☐ Incoherencia
- ☐ Heterogeneidad entre los estudios de un mismo par
- ☐ Intransitividad

8. El ranking da a H un SUCRA de 0.91 y a E de 0.85. Los intervalos de credibilidad de H y E frente a S se superponen ampliamente. ¿Qué se concluye?

- ☐ H es el mejor tratamiento de la red.
- ☐ H tiene mayor probabilidad de estar entre los primeros lugares, pero el orden entre H y E no está demostrado, y la única liga de H se apoya en un solo ensayo.
- ☐ E es mejor que H porque tiene más ensayos.

9. Comparar el brazo de E de un ensayo con el brazo de G de otro ensayo, sin considerar sus grupos control, es aceptable para la GCEEE.

☐ Verdadero ☐ Falso

10. Un insumo nuevo se presenta para una población en la que ya existen otros 4 insumos. Según la GEI, ¿qué debe presentarse?

- ☐ Un metaanálisis en red que analice todas las opciones, con atención a la transitividad y la consistencia.
- ☐ Solo el ensayo del insumo nuevo frente a placebo.
- ☐ La comparación de los brazos de distintos estudios, sin ajuste.

Diplomado en Economía de la Salud y Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Pulso. La explicación completa está en la página de la unidad U17.