

4.13.10

Aditya Mishra - EE25BTECH11005

October 3, 2025

Question

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} -1 \\ -7 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \end{pmatrix}$$

Equation of the internal bisector of $\angle ABC$.

Given lines $\mathbf{n}_1^\top \mathbf{x} = c_1$, $\mathbf{n}_2^\top \mathbf{x} = c_2$,

Angle bisectors satisfy $\frac{|\mathbf{n}_1^\top \mathbf{x} - c_1|}{\|\mathbf{n}_1\|} = \frac{|\mathbf{n}_2^\top \mathbf{x} - c_2|}{\|\mathbf{n}_2\|}$.

$$\Rightarrow \frac{\mathbf{n}_1^\top \mathbf{x} - c_1}{\|\mathbf{n}_1\|} = \pm \frac{\mathbf{n}_2^\top \mathbf{x} - c_2}{\|\mathbf{n}_2\|}.$$

Solution

Internal bisector: sign chosen so that for $\mathbf{u} = \frac{\mathbf{A} - \mathbf{B}}{\|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|} + \frac{\mathbf{C} - \mathbf{B}}{\|\mathbf{C} - \mathbf{B}\|}$,

we have $\text{sgn}(\mathbf{n}_1^\top \mathbf{u}) = -\text{sgn}(\mathbf{n}_2^\top \mathbf{u})$

Normals:

$$\mathbf{n}_1 = \begin{pmatrix} -8 \\ 6 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{n}_2 = \begin{pmatrix} 9 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Norms:

$$\|\mathbf{n}_1\| = 10$$

$$\|\mathbf{n}_2\| = \sqrt{97}$$

Equation of angle bisector:

$$\frac{\mathbf{n}_1^\top (\mathbf{x} - \mathbf{B})}{10} = -\frac{\mathbf{n}_2^\top (\mathbf{x} - \mathbf{B})}{\sqrt{97}}$$

$$\sqrt{97} \mathbf{n}_1^\top (\mathbf{x} - \mathbf{B}) + 10 \mathbf{n}_2^\top (\mathbf{x} - \mathbf{B}) = 0$$

Solution


With $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix}$, equation of Angle Bisector is:

$$(90 - 8\sqrt{97} \ 40 + 6\sqrt{97})^T \mathbf{x} + (34\sqrt{97} - 490) = 0$$

Or,

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} 40 + 6\sqrt{97} \\ -(90 - 8\sqrt{97}) \end{pmatrix}, \quad \lambda \in \mathbb{R}$$

Triangle and Angle Bisector of angle $\angle ABC$



For Codes, refer to the URL below:

<https://github.com/Aditya-Mishra11005/ee1030-2025/tree/temp/ee25btech11005/matgeo/4.13.10/Codes>