

LES SUITES NUMÉRIQUES

I Quelques définitions

Définition n°1. Suite numérique réelle (deux versions)

Une suite numérique (réelle) est une collection de nombres réels numérotés à partir de zéro.

Une suite numérique (réelle) u est une application de l'ensemble des nombres entiers naturels (\mathbb{N}) dans l'ensemble des nombres réels (\mathbb{R}).

Autrement dit :

$$u: \begin{cases} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \\ n \mapsto u(n) \end{cases}$$

LES SUITES NUMÉRIQUES

Remarque n°1. Notations

On utilisera la notation classique qui consiste à remplacer $u(n)$ par u_n .
Ainsi :

$$u: \begin{cases} \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R} \\ n \mapsto u_n \end{cases}$$

On pourra noter : u ou $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ou $(u_n)_{n \geq 0}$ pour **nommer la suite**.

(On s'autorisera parfois (u_n) mais on évitera le plus possible)

On dira que u_n est le terme de rang n .

Remarque n°2.

À partir de maintenant, on dira « suite » plutôt que « suite numérique réelle ».

LES SUITES NUMÉRIQUES E01

EXERCICE N°1 Vocabulaire

On donne ici les premiers termes d'une suite $(v_n)_{n \geq 0}$:

5 , 8 , 11 , 14 , 17 , 20 , ...

- 1) Donner la valeur du premier terme de v .
- 2) Donner la valeur du terme de rang 4.
- 3) Donner la valeur du cinquième terme de v puis donner son rang.

LES SUITES NUMÉRIQUES E01

EXERCICE N°2 *Attention on ne commence pas toujours à zéro*

- 1) On donne ici les premiers termes d'une suite $(w_n)_{n \geq 1}$:
- 5 , 8 , 11 , 14 , 17 , 20 , ...
- 1.a) Donner la valeur du premier terme de w .
- 1.b) Donner la valeur du terme de rang 4.
- 1.c) Donner la valeur du cinquième terme de w puis donner son rang.
- 2) On donne ici les premiers termes d'une suite $(t_n)_{n \geq 4}$:
- 5 , 8 , 11 , 14 , 17 , 20 , ...
- 2.a) Donner la valeur du premier terme de t .
- 2.b) Donner la valeur du terme de rang 4.
- 2.c) Donner la valeur du cinquième terme de t puis donner son rang.

LES SUITES NUMÉRIQUES E01

EXERCICE N°3 Notation fonctionnelle vs Notation classique

On donne ici les premiers termes d'une suite $(v_n)_{n \geq 0}$:

5 , 8 , 11 , 14 , 17 , 20 , ...

- 1) Donner $v(1)$ et $v(4)$.
- 2) Donner v_1 et v_4 .
- 3) Déterminer $v(2)+1$ et $v(2+1)$.
- 4) Déterminer v_2+1 et v_{2+1} .

LES SUITES NUMÉRIQUES

Définition n°2. Suite définie de façon explicite

L'application u peut être **définie de façon explicite** :

$$\boxed{\forall n \in \mathbb{N}, u_n = f(n)}$$

(avec f au moins définie pour tous les entiers naturels)

Exemple n°1. Une suite définie de façon explicite

La suite u définie pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 2n - 3$

Ses premiers termes sont :

$$u_0 = -3, u_1 = -1, u_2 = 1, u_3 = 3, \dots$$

Ici $f : x \mapsto 2x - 3$

LES SUITES NUMÉRIQUES E01

EXERCICE N°4 Suite explicite : premier contact

On donne la suite u définie pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 4n + 7$

- 1) Identifier la fonction f du cours.
- 2) Déterminer u_0 , u_1 , u_2 et u_{1000} .
- 3) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, calculer la différence $u_{n+1} - u_n$.

LES SUITES NUMÉRIQUES E01

EXERCICE N°5 Suite explicite : deuxième contact

On donne la suite v définie pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = 2n^2 - 3n - 1$

- 1) Identifier la fonction f du cours.
- 2) Déterminer v_0 , v_1 , v_2 et v_{1000} .
- 3) Pour tout n , calculer la différence $v_{n+1} - v_n$.

LES SUITES NUMÉRIQUES E01

EXERCICE N°6 Suite explicite : troisième contact

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on pose $u_n = \sqrt{2n-5}$.

- 1) Identifier la fonction f du cours.
- 2) À partir de quel rang la suite u est-elle définie ?
- 3) Déterminer, en fonction de n , u_{n-1} et u_{n+1} .

LES SUITES NUMÉRIQUES E01

EXERCICE N°7 Suite explicite : un peu d'intuition...

On donne à chaque fois les premiers termes d'une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$. Conjecturer une expression de u_n en fonction de n .

1) $-1, 1, 3, 5, \dots$

2) $1, 2, 5, 10, 17, \dots$

LES SUITES NUMÉRIQUES E01

EXERCICE N°8 Suite explicite : du concret !

(Exercice extrait du sesamath 1^{er} spé : 39 p 64)

Alphonse paye 45€ un abonnement résidentiel annuel pour garer sa voiture dehors. Il doit ensuite payer 1,5 € supplémentaire par jour de stationnement.

On note u_n le prix payé par Alphonse pour son abonnement et n jours de stationnement.

- 1) Donner une expression de u_n en fonction de n .
- 2) Combien payera-t-il au total, s'il gare sa voiture dehors 300 jours par an ?

LES SUITES NUMÉRIQUES

Définition n°3.

L'application u peut être **définie par une relation de récurrence** :

$$u: \begin{cases} u_0 = k & (k \text{ étant un nombre réel}) \\ u_{n+1} = f(u_n), \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

Exemple n°2.

Une suite définie par une relation de récurrence

La suite v définie par :
$$\begin{cases} v_0 = 1 \\ v_{n+1} = 2v_n - 3 \end{cases}, \text{ pour tout } n \in \mathbb{N}$$

Ses premiers termes sont :

$$v_0 = 1, v_1 = -1, v_2 = -5, v_3 = -13, \dots$$

Ici $f: x \mapsto 2x - 3$ (Ne pas confondre la fonction f avec l'application u !)

LES SUITES NUMÉRIQUES E02

EXERCICE N°1 Suite et relation de récurrence : 1^{er} contact

On donne la suite u définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 7 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 4u_n + 7 \end{cases} .$$

- 1) Identifier la fonction f du cours.
- 2) Déterminer, *si possible*, u_1 , u_2 , u_8 et u_{1000} .

LES SUITES NUMÉRIQUES E02

EXERCICE N°2 Suite et relation de récurrence : 2^{ème} contact

On donne la suite v définie par :
$$\begin{cases} v_0 = 2 \\ \forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = \frac{2v_n - 2}{v_n - 3} \end{cases} .$$

(On admet que $\forall n \in \mathbb{N}, v_n \neq 3$ et donc que la suite est correctement définie)

- 1) Identifier la fonction f du cours.
- 2) Déterminer v_1 , v_2 et v_{15} .

LES SUITES NUMÉRIQUES

Remarque n°3.

Une suite peut être définie par un énoncé qui peut prendre plusieurs formes :

- un algorithme (suite d'instructions informatiques ou non)
- un motif géométrique : (triangle de Sierpiński)
- une simple phrase : « la suite w est la suite des nombres impairs positifs ».
- ou encore un ensemble (infini) de points du type $M(n, u_n)$.
- ...

Réviser pour l'interrogation écrite n°1.

Il faut connaître parfaitement :

- le paragraphe I

ainsi que

- La fiche E01 et la fiche E02 jusque l'exercice n°2 inclus

LES SUITES NUMÉRIQUES E02

EXERCICE N°3 Suite définie par un algorithme (Python)

On donne la suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $w_0 = 3$

Pour un terme w_n ,

- w_{n+1} s'obtient de la façon suivante :
- Multiplier w_n par 2.
 - Enlever 5 au résultat.


- 1) Écrire une fonction «premiers_termes_de_w» en Python qui prend comme argument un entier n et qui renvoie une liste contenant les valeurs des $n+1$ premiers termes de la suite.
- 2) Écrire une fonction « w » en Python qui prend comme argument un entier n et qui renvoie la valeur de w_{n+1} . (On pourra utiliser la question 1)

LES SUITES NUMÉRIQUES E02


EXERCICE N°4 Triangle de Sierpinski

On considère un triangle équilatéral de côté 1 colorié en gris ($n=0$).


À chaque étape, on trace dans chaque triangle gris, un triangle blanc qui a pour sommets les milieux des côtés du triangle gris.



$n=0$



$n=1$



$n=2$



$n=3$

- 1) Il y a un triangle gris à l'étape 0, puis trois à l'étape 1...
 - 1.a) Combien y-a-t-il de triangles gris, à l'étape 2 ?
 - 1.b) Combien y-a-t-il de triangles gris, à l'étape 3 ?
 - 1.c) Combien y-a-t-il de triangles gris, à l'étape 4 ?
- 2) Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note u_n le nombre de triangles gris à l'étape n .
 - 2.a) Exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
 - 2.b) Exprimer u_n en fonction de n .
- 3) Déterminer le nombre de triangles gris à la 10^e étape.
- 4) Déterminer u_{10} .

LES SUITES NUMÉRIQUES

II Suites arithmétiques

Définition n°4. Suite arithmétique

Une suite est dite **arithmétique**, si, en connaissant un terme de la suite, on peut obtenir le suivant en lui ajoutant toujours le même nombre.

Autrement dit :

- Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est arithmétique s'il existe $r \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\text{Pour tout } n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n + r$$

- Le nombre r est appelé : **raison** de la suite.

Remarque n°4. Lien avec la définition n°3

La suite u est définie par récurrence (à condition de penser à donner u_0) et on a : $f : x \mapsto x + r$

Exemple n°3.

- La suite $u : \begin{cases} u_0 = -1,5 \\ u_{n+1} = u_n + 0,9, \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$ est une suite arithmétique de raison $0,9$ et de premier terme $u_0 = -1,5$.



Ses quatre premiers termes sont :

$$u_0 = -1,5, \quad u_1 = -0,6, \quad u_2 = 0,3, \quad u_3 = 1,2$$

- La suite $v : \begin{cases} v_0 = 3 \\ v_{n+1} = v_n - 1,1, \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$ est une suite arithmétique de raison $-1,1$ et de premier terme $v_0 = 3$.

Ses quatre premiers termes sont :

$$v_0 = 3, \quad v_1 = 1,9, \quad v_2 = 0,8, \quad v_3 = -0,3$$



Remarque n°5.

Le 1^{er} terme est u_0 , le deuxième u_1 ...

On restera vigilant face à ce « décalage » ...

LES SUITES NUMÉRIQUES E03

EXERCICE N°1 *Suite arithmétique ou pas*

1) Soit w la suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, w_n = 4n+5$.

1.a) Calculer les trois premiers termes de la suite w .

1.b) Représenter graphiquement les 3 premiers termes de w .

1.c) D'après la représentation graphique, la suite w semble-t-elle arithmétique ? Justifier.

1.d) Démontrer que la suite w est arithmétique et préciser sa raison r .

2) Soit v la suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, v(n)=n^2+3$.

2.a) Calculer les trois premiers termes de la suite v .

2.b) Représenter graphiquement les 3 premiers termes de v .

2.c) D'après la représentation graphique, la suite v semble-t-elle arithmétique ? Justifier.

2.d) Démontrer que la suite v n'est pas arithmétique.

LES SUITES NUMÉRIQUES

Propriété n°1. Expression de u_n en fonction de n

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r et u_0 son premier terme.

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 + n \times r$$

preuve :

Soit $n \in \mathbb{N}$, on peut écrire les termes suivants à l'aide la définition par récurrence :

$$u_1 = u_0 + r$$

$$u_2 = u_1 + r$$

\vdots

$$u_n = u_{n-1} + r$$

Puis, en additionnant membre à membre ces n égalités, on obtient

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n = u_0 + r + u_1 + r + \dots + u_{n-1} + r$$

qui équivaut à :

$$u_1 + u_2 + \dots + u_n = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} + n \times r$$

puis en soustrayant $(u_1 + u_2 + \dots + u_{n-1})$ à chaque membre

$$u_n = u_0 + n \times r$$

Remarque n°6. Lien avec la définition n°2

Cette fois-ci la suite est définie de façon explicite et on a : $f : x \mapsto u_0 + r \times x$

LES SUITES NUMÉRIQUES E03

EXERCICE N°2 Suite arithmétique et formule explicite : départ à 0

(u_n) est la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $r = 2$.

- 1) Pour tout entier naturel n , exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
- 2) Calculer les termes u_1 , u_2 et u_3 .
- 3) Pour tout entier n , exprimer u_n en fonction de n .
- 4) Donner alors les valeurs de u_{10} , u_{17} et u_{23} .

LES SUITES NUMÉRIQUES

Propriété n°2. Une généralisation

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r et $p \in \mathbb{N}$.

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_p + (n-p) \times r$$

preuve : Laissée en exercice

LES SUITES NUMÉRIQUES E03

EXERCICE N°3 Suite arithmétique et formule explicite : départ à 1

(u_n) est la suite arithmétique de premier terme $u_1 = -80$ et de raison $r = 10$.

- 1) Pour tout entier naturel $n \neq 0$, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
- 2) Calculer les termes u_2 , u_3 et u_4 .
- 3) Pour tout entier $n \neq 0$, exprimer u_n en fonction de n .
- 4) Donner alors les valeurs de u_7 , u_{10} et u_{14} .
- 5) Quel est le rang du terme égal à 80 ? Justifier.

LES SUITES NUMÉRIQUES

Propriété n°3. Sommes des premiers entiers

Soit $n \in \mathbb{N}$, alors

$$\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

(Notation : $\sum_{k=0}^n k = 0+1+2+3+\dots+(n-1)+n$)

preuve :

Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé,

▪ On remarque que $\sum_{k=0}^n k = \sum_{k=0}^n (n-k)$

(car : $0+1+2+\dots+(n-2)+(n-1)+n = n+(n-1)+(n-2)+\dots+2+1+0$)

▪ et donc : $2 \times \sum_{k=0}^n k = (n+1) \times n$

(car :
$$\begin{array}{cccccccc} 0 & + & 1 & + & 2 & + & \dots & + & (n-2) & + & (n+1) & + & n \\ + & n & + & (n-1) & + & (n-2) & + & \dots & + & 2 & + & 1 & + & 0 \\ = & \underbrace{n & + & n & + & n & + & \dots & + & n & + & n & + & n}_{n+1 \text{ termes}} \end{array}$$
)

Ainsi : $\sum_{k=0}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$

cqfd

LES SUITES NUMÉRIQUES

Propriété n°4. Sommes des premiers termes d'une suite arithmétique

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique de raison r et de premier terme u_0 .
Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^n u_k = (n+1) \frac{u_0 + u_n}{2}$$

(Notation : $\sum_{k=0}^n u_k = u_0 + u_1 + \dots + u_{n-1} + u_n$)

preuve :

Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé,

$$\blacksquare \sum_{k=0}^n u_k = \sum_{k=0}^n (u_0 + k r) \quad (\text{d'après la propriété n°1})$$

$$(\text{car : } \begin{array}{ccccccc} u_0 & + & u_1 & + & \dots & + & u_{n-1} & + & u_n \\ = u_0 + 0 \times r & + & u_0 + 1 \times r & + & \dots & + & u_0 + (n-1) \times r & + & u_0 + n \times r \end{array})$$

▪ Or :

$$\sum_{k=0}^n (u_0 + k r) = \sum_{k=0}^n u_0 + \sum_{k=0}^n k r = \underbrace{\sum_{k=0}^n u_0}_{(n+1)u_0} + r \times \underbrace{\sum_{k=0}^n k}_{\frac{n(n+1)}{2}}$$

▪ d'où :

$$\begin{aligned} \sum_{k=0}^n u_k &= (n+1)u_0 + \frac{r \times n(n+1)}{2} = \frac{2(n+1)u_0 + r n(n+1)}{2} \\ &= \frac{(n+1)(2u_0 + r n)}{2} = \frac{(n+1)(u_0 + u_0 + r n)}{2} = \frac{(n+1)(u_0 + u_n)}{2} \\ &= (n+1) \frac{u_0 + u_n}{2} \end{aligned}$$

cqfd

LES SUITES NUMÉRIQUES

Remarque n°7. Une façon de retenir la formule

$$Somme = \text{nombre de termes} \times \frac{\text{premier terme} + \text{dernier terme}}{2}$$

LES SUITES NUMÉRIQUES E03

EXERCICE N°4 Suite arithmétique : Somme de termes

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite arithmétique de premier terme $u_0 = 2$ et de raison $r = 3$.

- 1) Calculer u_1 , u_2 et u_3 .
- 2) Exprimer le terme u_n en fonction de n . En déduire les valeurs de u_{20} et u_{50} .
- 3) Calculer la somme S des 21 premiers termes de la suite et la somme S' des 51 premiers termes.

LES SUITES NUMÉRIQUES E03

EXERCICE N°5 Suite arithmétique : Somme de termes

Soit la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $v_n = 7 - 3n$.

- 1) Calculer v_0 , v_1 et v_2 .
- 2) Démontrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite arithmétique et déterminer la raison de la suite.
- 3) Quelle est la valeur du 51^e terme ?
- 4) Calculer la somme des 51 premiers termes.

Réviser pour IE02 :

- Il faut connaître parfaitement le paragraphe II
- et
- savoir refaire les exercices de la fiche E03

LES SUITES NUMÉRIQUES

III Suites géométriques

Définition n°5. Suite géométrique

Une suite est dite géométrique si, en connaissant un terme de la suite, on peut obtenir le suivant en le multipliant toujours par le même nombre.

Autrement dit :

- Une suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est géométrique s'il existe $q \in \mathbb{R}$ tel que :

$$\text{Pour tout } n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n \times q$$

- Le nombre q est appelé : **raison** de la suite.

Remarque n°8. Lien avec la définition n°3

La suite u est définie par récurrence (à condition de penser à donner u_0) et on a : $f : x \mapsto x \times q$

Exemple n°4.

- La suite $u : \begin{cases} u_0 = 0,5 \\ u_{n+1} = u_n \times 1,9, \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$ est une suite

géométrique de raison 1,9 et de premier terme $u_0 = 0,5$.

Ses quatre premiers termes sont :


$$u_0 = 0,5, u_1 = 0,95, u_2 = 1,805, u_3 = 3,4295$$

- La suite $v : \begin{cases} v_0 = 3 \\ v_{n+1} = v_n \times 0,5, \forall n \in \mathbb{N} \end{cases}$ est une suite

géométrique de raison 0,5 et de premier terme $v_0 = 3$.

Ses quatre premiers termes sont :

$$v_0 = 3, v_1 = 1,5, v_2 = 0,75, v_3 = 0,375$$



LES SUITES NUMÉRIQUES E04

EXERCICE N°1 Suite géométrique ou pas

1) Soit t la suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, t_n = 3^n$.

1.a) Calculer les trois premiers termes de la suite t .

1.b) Représenter graphiquement les 3 premiers termes de t .

1.c) D'après la représentation graphique, la suite t semble-t-elle géométrique ? Justifier.

1.d) Démontrer que la suite t est géométrique et préciser sa raison q .

2) Soit v la suite définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, z_n = (n+3)^2$.

2.a) Calculer les trois premiers termes de la suite v .

2.b) Représenter graphiquement les 3 premiers termes de v .

2.c) D'après la représentation graphique, la suite v semble-t-elle géométrique ? Justifier.

2.d) Démontrer que la suite v n'est pas géométrique.

LES SUITES NUMÉRIQUES

Propriété n°5. Expression de u_n en fonction de n

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison q et u_0 son premier terme.

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_n = u_0 \times q^n$$

preuve :

- Si $u_0 = 0$ ou $q = 0$ alors tous les termes de la suite sont nuls et l'égalité $u_n = u_0 \times q^n$ ($0=0$) est vraie pour tout $n \in \mathbb{N}$
- Si $u_0 \neq 0$ et $q \neq 0$ alors on admet que **tous les termes de la suite sont non nuls** et on peut écrire :

$$u_1 = u_0 \times q$$

$$u_2 = u_1 \times q$$

\vdots

$$u_n = u_{n-1} \times q$$

Puis, en multipliant membre à membre ces n égalités, on obtient :

$$u_1 \times u_2 \times \dots \times u_n = u_0 \times q \times u_1 \times q \times \dots \times u_{n-1} \times q$$

qui équivaut à :

$$u_1 \times u_2 \times \dots \times u_n = u_0 \times u_1 \times \dots \times u_{n-1} \times q^n$$

puis en divisant chaque membre par $(u_1 \times u_2 \times \dots \times u_{n-1})$ (qui est non nul...)

$$u_n = u_0 \times q^n$$

LES SUITES NUMÉRIQUES E04

EXERCICE N°2 Suite géométrique et formule explicite : départ à 0

(u_n) est la suite géométrique de premier terme $u_0 = 4$ et de raison $q = 2$.

- 1) Pour tout entier naturel n , exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
- 2) Calculer les termes u_1 , u_2 et u_3 .
- 3) Pour tout entier n , exprimer u_n en fonction de n .
- 4) Donner alors les valeurs de u_{10} , u_{17} et u_{23} .

LES SUITES NUMÉRIQUES E04

EXERCICE N°3 Suite géométrique et formule explicite : départ à 1

(u_n) est la suite géométrique de premier terme $u_1 = -8000$ et de raison $q = 0,1$.

- 1) Pour tout entier naturel $n \neq 0$, exprimer u_{n+1} en fonction de u_n .
- 2) Calculer les termes u_2 , u_3 et u_4 .
- 3) Pour tout entier $n \neq 0$, exprimer u_n en fonction de n .
- 4) Donner alors les valeurs de u_7 , u_{10} et u_{14} .
- 5) Quel est le rang du terme égal à 80 ? Justifier.

LES SUITES NUMÉRIQUES

Propriété n°6. Somme des premiers termes d'une suite géométrique

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite géométrique de raison $q \neq 1$ et u_0 son premier terme. Alors, pour tout $n \in \mathbb{N}$:

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q}, \text{ en particulier si } u_0 = 1, \quad \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$$

preuve :

Nous allons commencer par le cas particulier et nous en déduisons le cas général.

▪ Soit $n \in \mathbb{N}$ fixé, on remarque que :

$$\sum_{k=0}^n u_k = \underbrace{\sum_{k=0}^n u_0 \times q^k}_{\text{d'après la propriété n°5}} = u_0 \times \underbrace{\sum_{k=0}^n q^k}_{\text{par factorisation par } u_0}$$

▪ Posons $S_n = \sum_{k=0}^n q^k$ et calculons $S_n - q S_n$.

$$S_n - q S_n = \sum_{k=0}^n q^k - q \times \sum_{k=0}^n q^k = \sum_{k=0}^n q^k - \sum_{k=0}^n q^{k+1} = \sum_{k=0}^n (q^k - q^{k+1})$$

(car :

$$S_n = q^0 + q^1 + \dots + q^{n-1} + q^n$$

$$q \times S_n = q \times (q^0 + q^1 + \dots + q^{n-1} + q^n) = q^{0+1} + q^{1+1} + \dots + q^{n-1+1} + q^{n+1}$$

▪ donc, par télescopage (à retenir !):

$$S_n - q \times S_n = 1 - q^{n+1}$$

(car

$$S_n - q \times S_n = q^0 - \underbrace{q^{0+1}}_0 + q^1 + q^{1+1} + \dots + q^{n-1} - \underbrace{q^{n-1+1}}_0 + q^n - q^{n+1}$$

les termes se télescopent au fur et à mesure et il ne reste que le 1^{er} et le dernier)

▪ Or :

$$S_n - q \times S_n = (1-q) S_n \quad (\text{par factorisation})$$

▪ Donc

$$(1-q) S_n = 1 - q^{n+1}$$

Comme $q \neq 1, 1-q \neq 0$ et on peut diviser chaque membre par $1-q$ pour obtenir :

$$S_n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$$

(Nous avons obtenu le cas particulier)

▪ D'après la remarque du premier point (▪)

$$\sum_{k=0}^n u_k = u_0 \times \sum_{k=0}^n q^k = u_0 \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$$

(Nous avons obtenu le cas général)

cqfd

LES SUITES NUMÉRIQUES

Remarque n°9. Une façon de retenir la formule

La somme des n premiers termes d'une suite géométrique de raison q avec $q \neq 1$ vaut :

$$Somme = \text{premier terme} \times \frac{1 - q^{\text{nombre de termes}}}{1 - q}$$

LES SUITES NUMÉRIQUES

Méthode n°1. Calcul de la somme des n premiers termes d'une suite géométrique

- Soit (v_n) la suite géométrique de raison $r=3$ et de premier terme $v_0=-5$. On veut calculer la somme A des dix premiers termes.

$$\left(\text{C'est à dire } A = \sum_{k=0}^9 v_k = v_0 + v_1 + \dots + v_9 \right)$$

$$A = v_0 \times \frac{1-q^{10}}{1-q} = -5 \times \frac{1-3^{10}}{1-3} = -147\,620$$

- Soit (w_n) la suite géométrique de raison $r=1,5$ et de premier terme $w_1=2$. On veut calculer la somme B des 5 premiers termes.

$$\left(\text{C'est à dire } B = \sum_{k=1}^5 w_k = w_1 + w_2 + w_3 + w_4 + w_5 \right)$$

$$B = w_1 \times \frac{1-q^5}{1-q} = 2 \times \frac{1-1,5^5}{1-1,5} = 26,375$$

Remarque n°10.

Si $q=1$ alors la suite est constante et la somme des n premiers termes vaut simplement : $n \times \text{premier terme}$

LES SUITES NUMÉRIQUES E04

EXERCICE N°4 Suite géométrique : Somme de termes

Soit la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $v_n = 1,5 \times 2^n$.

- 1) Calculer v_0 , v_1 et v_2 .
- 2) Démontrer que $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite géométrique et déterminer la raison de la suite.
- 3) Quelle est la valeur du 11^e terme ?
- 4) Calculer la somme des 11 premiers termes.

LES SUITES NUMÉRIQUES E04

EXERCICE N°5 *Suite géométrique : Somme de termes*

Soit (u_n) la suite géométrique de premier terme $u_0 = \frac{1}{9}$ et de raison $q = 3$.

Déterminer $S_8 = \sum_{k=0}^8 u_k$

Réviser pour IE03 :

- Il faut connaître parfaitement le paragraphe III et
- savoir refaire les exercices de la fiche E04.

LES SUITES NUMÉRIQUES

Remarque n°11.

Tant que n est fixé, on sait donc faire pas mal de choses sur les suites. Mais n peut devenir aussi grand que l'on veut : on dit que n peut « tendre vers l'infini ». On aimerait alors savoir comment se comportent les termes de la suite vers cet « infini ». C'est ce qui motive ce dernier paragraphe. Conformément au programme nous resterons dans l'intuition et nous utiliserons parfois des « pseudo-définitions » (cela sera signalé).

LES SUITES NUMÉRIQUES

IV Comportement de suite

IV.1 Monotonie

Définition n°6. Suite croissante, suite décroissante

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite.

▪ $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante si et seulement si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \geq u_n$.

▪ $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante si et seulement si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} > u_n$.

▪ $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante si et seulement si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq u_n$.

▪ $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement décroissante si et seulement si $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} < u_n$.

Remarque n°12.

$$u_{n+1} \geq u_n \Leftrightarrow u_{n+1} - u_n \geq 0$$

En pratique, c'est surtout la partie de droite de l'équivalence qui sera utilisée.

LES SUITES NUMÉRIQUES

Exemple n°5.

La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $v_n = n^2 + 3n + 2$ est strictement croissante. En effet :

- Soit $n \in \mathbb{N}$.
- Étudions la différence $v_{n+1} - v_n$

$$\begin{aligned} v_{n+1} - v_n &= \underbrace{(n+1)^2 + 3(n+1) + 2}_{v_{n+1}} - \underbrace{(n^2 + 3n + 2)}_{v_n} \\ &= n^2 + 2n + 1 + 3n + 3n + 2 - n^2 - 3n - 2 \\ &= 2n + 1 \end{aligned}$$

- Or n est un entier naturel donc $n \geq 0$ d'où $2n \geq 0$ et enfin $2n + 1 \geq 1 > 0$
- Ainsi, $v_{n+1} - v_n > 0$ qui équivaut à $v_{n+1} > v_n$.
- En conclusion : la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante.

LES SUITES NUMÉRIQUES

Définition n°7. Suite monotone ou strictement monotone

- Une suite monotone est une suite qui est soit constante, soit croissante, soit décroissante.
- Une suite monotone est une suite qui est soit strictement croissante, soit strictement décroissante.

LES SUITES NUMÉRIQUES E05

EXERCICE N°1 Comportement d'une suite définie explicitement

Étudier les variations des suites suivantes :

1) La suite u définie par : $\forall n \in \mathbb{N} , u_n = n^2 + n$

2) La suite v définie par : $\forall n \in \mathbb{N} , v_n = \frac{3^n}{7^{n+1}}$

3) La suite w définie par : $\forall n \in \mathbb{N} , w_n = -5^n$

4) La suite t définie par : $\forall n \in \mathbb{N} , t_n = (-5)^n$

LES SUITES NUMÉRIQUES E05

EXERCICE N°2 Comportement d'une suite définie par récurrence

Étudier les variations des suites suivantes :

1) La suite u définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n - \sqrt{n+1} \end{cases}$$

2) La suite v définie par :
$$\begin{cases} v_0 = 7 \\ \forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = \frac{7}{v_n} \end{cases}$$

LES SUITES NUMÉRIQUES

Propriété n°7. Comportement d'une suite arithmétique

Soit u une suite arithmétique de raison r .

- Si $r = 0$ alors u est constante.
- Si $r > 0$ alors u est strictement croissante.
- Si $r < 0$ alors u est strictement décroissante.

preuve :

- Le premier point est évident.
- Pour les deux autres points, remarquons que :
 - $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} - u_n = r$
 - Si $r > 0$ alors par définition, la suite est strictement croissante.
 - Si $r < 0$ alors par définition, la suite est strictement décroissante.

LES SUITES NUMÉRIQUES E05

EXERCICE N°3 Comportement d'une suite arithmétique

Étudier les variations des suites suivantes :

1) La suite u définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = u_n - 4,5 \end{cases}$$

2) La suite v définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = 5n + 4$

LES SUITES NUMÉRIQUES

Propriété n°8.

Comportement d'une suite géométrique



Scanner
ou
Cliquer
Pour visualiser

Soit u une suite géométrique de raison q et de premier terme $u_0 \neq 0$.

- Si $q > 1$
 - et si $u_0 > 0$ alors la suite est strictement croissante.
 - et si $u_0 < 0$ alors la suite est strictement décroissante.
- Si $0 < q < 1$
 - et si $u_0 > 0$ alors la suite est strictement décroissante.
 - et si $u_0 < 0$ alors la suite est strictement croissante.
- Si $q < 0$ alors la suite u n'est pas monotone.
- Si $q = 1$ alors la suite u est constante.
- Si $q = 0$
 - et si $u_0 = 1$ alors la suite est constante.
 - et si $u_0 \neq 1$ alors la suite est constante à partir du deuxième rang.

preuve :

- Soit $n \in \mathbb{N}$, $u_{n+1} - u_n = q u_n - u_n = q \times q^n u_0 - q^n u_0 = q^n (q - 1) u_0$
Ainsi, étudier la monotonie de la suite revient à étudier le signe de l'expression $q^n (q - 1) u_0$.
- Si $q > 1$ alors $q^n (q - 1) > 0$
 - et si $u_0 > 0$ alors $q^n (q - 1) u_0 > 0$ c'est à dire $u_{n+1} - u_n > 0$
ceci étant valable pour tout $n \in \mathbb{N}$, la suite est bien strictement croissante.
- Le raisonnement est similaire pour les autres cas, regardons seulement le cas $q < 0$:
Dans ce cas $q - 1 < 0$ mais q^n est positif si n est pair et négatif sinon. Par conséquent $q^n (q - 1) u_0$ et donc $u_{n+1} - u_n$ changent de signe selon la parité de n .
- Essayez de traiter les autres cas vous-même.

LES SUITES NUMÉRIQUES E05

EXERCICE N°4 Comportement d'une suite géométrique

Étudier les variations des suites suivantes :

1) La suite u définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 3 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 0,5 u_n \end{cases}$$

2) La suite v définie par : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = 4 \times 5^n$

LES SUITES NUMÉRIQUES

IV.2 Convergence, divergence, limite de suite

Définition n°8. Convergence, divergence, limite (pseudo-définition)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite et l un nombre réel.

On dira que :

- la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l si les termes de la suite tendent vers l ,

On dira alors que la limite de $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vaut l et on notera $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = l$.

- la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $+\infty$ si les termes de la suite tendent vers $+\infty$,
- la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge vers $-\infty$ si les termes de la suite tendent vers $-\infty$,
- la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge si les termes de la suite ne tendent vers rien.

LES SUITES NUMÉRIQUES

Remarque n°13.

L'arnaque vient du fait qu'on n'a pas défini ce que « tendre » veut dire...

Donnons tout de même une précision :

- Dire qu'une suite tend vers l signifie qu'à partir d'un certain rang **tous** les termes de suite seront aussi proches que l'on veut de l .
- Dire qu'une suite tend vers $+\infty$ signifie qu'à partir d'un certain rang **tous** les termes de suite seront aussi grands que l'on veut.

LES SUITES NUMÉRIQUES

Exemple n°6.

- La suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $v_0 = 10$ et $\forall n \in \mathbb{N} \ v_{n+1} = \frac{v_n}{5}$ converge vers zéro. ($l=0$)
- La suite $(w_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $w_0 = 10$ et $\forall n \in \mathbb{N} \ w_{n+1} = w_n + 5$ diverge vers $+\infty$.
- La suite $(t_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $t_0 = 10$ et $\forall n \in \mathbb{N} \ t_{n+1} = t_n - 5$ diverge vers $-\infty$.
- La suite $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $a_0 = 10$ et $\forall n \in \mathbb{N} \ a_{n+1} = a_n + (-1)^n$ diverge.

LES SUITES NUMÉRIQUES E05

EXERCICE N°5 Limite d'une suite : 1^{ère} approche

Conjecturer, si elle existe, la limite des suites suivantes pour lesquelles on a donné quelques termes.

1) $u_0 = 1$, $u_{52} = -30$, $u_{7589} = -5000$, $u_{20000} = -168699245$

2) $v_3 = -5$, $v_{52} = -30$, $v_{789} = 22$, $v_{5240} = -30$, $v_{35240} = 2$

LES SUITES NUMÉRIQUES E05

EXERCICE N°6 Limite d'une suite : 2^{ème} approche

Conjecturer, si elle existe, la limite des suites suivantes.

1) La suite u définie par $\forall n \in \mathbb{N}, u_n = n$

2) La suite v définie par $\forall n \in \mathbb{N}^*, v_n = \frac{1}{n}$

LES SUITES NUMÉRIQUES E06


EXERCICE N°1 Lecture graphique

On a représenté ci-contre une fonction f .

On définit une suite u par $\forall n \in \mathbb{N} , u_n = f(n)$.

On admet que $u_0 = 1$.

Donner les valeurs des six termes suivants.



LES SUITES NUMÉRIQUES E06

EXERCICE N°2 Utiliser un graphique (méthode à connaître)




On a représenté une fonction g ainsi que la droite d'équation $y = x$ dans le graphique ci-contre.

On définit la suite v par :

$$\begin{cases} v_0 = -3 \\ \forall n \in \mathbb{N}, v_{n+1} = g(v_n) \end{cases}$$

Déterminer les cinq premiers termes de la suite v .



LES SUITES NUMÉRIQUES E06

EXERCICE N°3 *Un peu de python*



basthon

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par : $u_0 = 5$ et $u_{n+1} = -u_n + 4$.

On considère l'algorithme ci-contre :

- 1) Que permet d'afficher cet algorithme ?
- 2) Quelle valeur affiche cet algorithme ?
- 3) Modifier cet algorithme pour qu'il affiche la valeur de u_{40}
- 4) Coder cet algorithme en Python.

```
u ← 5
Pour i allant de 1 à 25
    u ← -u + 4
Fin pour
Afficher u.
```


LES SUITES NUMÉRIQUES E06

EXERCICE N°4 *Encore un peu de python*



basthon

Soit u la suite définie par
$$\begin{cases} u_0 = 5 \\ \forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 2u_n + 1 \end{cases}$$

- 1) Calculer u_1 et u_2 .
- 2) Écrire un algorithme permettant de calculer u_{20} .
- 3) Coder cet algorithme en Python et l'utiliser pour calculer u_{20}

LES SUITES NUMÉRIQUES E07

EXERCICE N°1 Du concret : Écologie

En 2019, le maire d'une ville a fait comptabiliser le nombre de mégots ramassés dans la rue principale. Sur l'ensemble de l'année, le nombre de mégots ramassés est de 20 000.

Souhaitant que ce nombre diminue fortement, le maire fait voter en conseil municipal une loi instaurant une amende de 160 € par mégot laissé par terre.

Des statisticiens ont prévu, sur une période de 10 ans, une diminution du nombre de mégots jetés par terre de 15 % par an grâce à cette amende.

Sous cette hypothèse, pour tout entier naturel n , on appelle u_n le nombre de mégots jetés par terre pendant l'année $2019+n$. Ainsi, u_0 est le nombre de mégots jetés par terre en 2019. On a $u_0=20\,000$.

1) Justifier par le calcul que $u_1=17\,000$. Interpréter ce résultat dans le contexte de l'énoncé.

2)

2.a) Quelle est la nature de la suite (u_n) ? Justifier.

2.b) Donner l'expression de u_n en fonction de n .

2.c) Calculer le nombre de mégots qui, selon ce modèle, seraient jetés par terre en 2028. Arrondir le résultat à l'unité.

3) Le maire souhaite savoir combien de mégots seraient ramassés par les agents municipaux de 2019 à 2028.

3.a) Exprimer la somme que le maire doit effectuer pour trouver ce nombre en fonction des termes de la suite (u_n) .

3.b) Trouver alors le nombre de mégots ramassés.

LES SUITES NUMÉRIQUES E07

EXERCICE N°2 *Du concret : 1^{er} appart !*

Un étudiant loue une chambre pour 3 ans. On lui propose deux types de bail.

1^{er} contrat : un loyer de 200 euros pour le premier mois puis une augmentation de 5 euros par mois jusqu'à la fin du bail.

2^{ème} contrat: un loyer de 200 euros pour le premier mois puis une augmentation de 2% par mois jusqu'à la fin du bail.

- 1) Calculer, pour chacun des deux contrats, le loyer du deuxième mois puis le loyer du troisième mois.
- 2) Calculer, pour chacun des deux contrats, le loyer du dernier (c'est-à-dire du 36^e mois).
- 3) Quel est le contrat globalement le plus avantageux pour un bail de 3 ans ? (Justifier à l'aide de calculs.)

LES SUITES NUMÉRIQUES E07

EXERCICE N°3 Du concret : Héritage

Mathilde a reçu 80 000 € en héritage. Elle décide de placer cette somme et trouve un placement au taux de 8%. Mais chaque année, elle doit retirer 4000 € pour payer les impôts dus à ce placement. On appelle C_n le capital acquis au bout de n années de placement.

- 1) Expliquer pourquoi $(C_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ vérifie la relation suivante: $C_{n+1} = 1,08 \times C_n - 4000$.
- 2) Calculer à la calculatrice les premiers termes de cette suite. Est-elle arithmétique ? Géométrique ?
- 3) On considère la suite auxiliaire (U_n) définie par : $U_n = C_n - 50\,000$.
- 3.a) Montrer que (U_n) est une suite géométrique dont on précisera les caractéristiques.
- 3.b) Exprimer U_n puis C_n en fonction de n .
- 3.c) De quelle somme Mathilde disposera-t-elle au bout de 5 ans ?
- 3.d) Mathilde veut acheter une maison à 180000 €. Combien d'années devra-t-elle attendre avant de disposer de cette somme ?

Commencer les révisions pour le Devoir Surveillé

Il faut :

- connaître parfaitement toutes les formules du cours
- savoir faire les questions interrogations rapidement et sans hésitation.
- savoir refaire les exercices fait en classe et à la maison.
- revoir le résumé du chapitre précédent (le jour du bac, les exercices porteront sur plusieurs chapitres, il faut s'y habituer)

LES SUITES NUMÉRIQUES E08

EXERCICE N°1 Somme des premiers carrés

Extrait remanié du sésamath 1^{er} spé 143 p 74

Pour tout entier $n \geq 1$, on note u_n la somme des n premiers carrés, c'est à dire $u_n = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$.

4) Calculer les trois premiers termes de la suite u .

5) Déterminer une relation entre u_{n+1} et u_n .

6) On pose v la suite définie par : Pour tout entier naturel n non nul,

$$v_n = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

6.a) Montrer que $v_1 = u_1$

6.b) Montrer que la suite v suit la même relation de récurrence que la suite u et conclure.

LES SUITES NUMÉRIQUES E08

EXERCICE N°2 *Algorithme de Héron (un premier contact)*

On donne a et b deux nombres réels tels que : $a > 0$ et $b > \sqrt{a}$.

On donne également la fonction $f : x \mapsto \frac{1}{2} \left(x + \frac{a}{x} \right)$.

On considère la suite u définie par
$$\begin{cases} u_0 = b \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$$
 .

Notre but est de comprendre que le terme u_n tend vers \sqrt{a} .

1) Un premier cas : $a = 2$ et $b = 5$.

1.a) Calculer les cinq premiers termes de la suite.

1.b) À l'aide de la calculatrice, conjecturer, si elle existe, la limite de la suite u et la comparer avec \sqrt{a} .

2) Un premier cas : $a = 5$ et $b = 10$.

2.a) Calculer les cinq premiers termes de la suite.

2.b) À l'aide de la calculatrice, conjecturer, si elle existe, la limite de la suite u et la comparer avec \sqrt{a} .

LES SUITES NUMÉRIQUES E08

EXERCICE N°3 Suite auxiliaire (sans calculatrice)

On donne la suite u définie par :
$$\begin{cases} u_0 = 0 \\ u_{n+1} = \frac{1}{2}\sqrt{u_n^2 + 12} \end{cases}$$

- 1) Calculer u_1 , u_2 et u_3 , on donnera les valeurs exactes.
- 2) On définit la suite v par : $\forall n \in \mathbb{N}, v_n = u_n^2 - 4$
 - 2.a) Montrer que la suite v est géométrique et donner ses éléments caractéristiques.
 - 2.b) Exprimer v_n en fonction de n .
 - 2.c) On a admet que pour tout entier n , $v_n > -4$. En déduire une expression de u_n en fonction de n .
 - 2.d) Conjecturer alors la limite de la suite u .

LES SUITES NUMÉRIQUES E08

EXERCICE N°4 Suite auxiliaire et tableur

- Soit la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
 $u_0 = 2$ et pour tout entier naturel n ,
 $u_{n+1} = 2u_n + 2n^2 - n$.

- Soit la suite $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par :
pour tout entier naturel n , $v_n = u_n + 2n^2 + 3n$.

1) Voici un extrait de feuille de tableur ci-contre :
Quelles formules a-t-on écrites dans les cellules C2
et B3 et copiées vers le bas pour afficher les termes
des suites u et v ?

2) Déterminer, en justifiant, une expression de
 v_n puis de u_n en fonction de n .

	A	B	C
1	n	u	v
2	0	2	7
3	1	4	14
4	2	9	28
5	3	24	56
6	4	63	112
7	5	154	224
8	6	353	448

Préparer sa copie à l'avance...