

LA FONCTION EXPONENTIELLE E03C

EXERCICE N°2 Étudier les variations d'une fonction (niveau 2)

Étudier les variations des fonctions suivantes sur leur ensemble de définition D .

1) $f: x \mapsto (x+1)e^x$ avec $D = \mathbb{R}$

2) $f: x \mapsto \frac{4x}{e^x}$ avec $D = \mathbb{R}$

3) $f: x \mapsto \frac{4e^x}{x}$ avec $D = \mathbb{R}^* =]-\infty ; 0[\cup]0 ; +\infty[$

1)

▪ f est une combinaison linéaire de fonctions de référence dérivables sur \mathbb{R} , elle est donc dérivable sur \mathbb{R} et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = u(x)v(x)$$

avec

$$u(x) = x+1 \quad \text{et} \quad u'(x) = 1$$

$$v(x) = e^x \quad \text{et} \quad v'(x) = e^x$$

d'où

$$f'(x) = 1e^x + (x+1)e^x = (x+2)e^x$$

▪ Dressons le tableau de signes de f' pour en déduire le tableau de variations de f .


▫ $x+2 > 0 \Leftrightarrow x > -2$

▫ $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$x-2$		$-$	$+$
e^x	$+$	$+$	$+$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	$-e^{-2}$	$+\infty$

$$f(-2) = (-2+1)e^{-2} = -e^{-2}$$

Cette année les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$ sont justes « intuitives ».



2)

▪ f est un quotient de fonctions de référence dérivables sur \mathbb{R} , de plus $x \mapsto e^x$ ne s'annule pas sur \mathbb{R} . f est donc dérivable sur \mathbb{R} et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = \frac{4x}{e^x} = 4xe^{-x}$$

Ainsi

$$f(x) = u(x)v(x)$$

avec

$$u(x) = 4x \quad \text{et} \quad u'(x) = 4$$

$$v(x) = e^{-x} \quad \text{et} \quad v'(x) = -e^{-x}$$

d'où

$$f'(x) = 4e^{-x} - 4x \times (-e^{-x}) = 4(1+x)e^{-x}$$

▪ Dressons le tableau de signes de f' pour en déduire le tableau de variations de f .

▫ 4 est un nombre positif.


▫ $1-x > 0 \Leftrightarrow -x > -1 \Leftrightarrow x < 1$

▫ $e^{-x} > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ (car la fonction exponentielle est strictement positive)

x	$-\infty$	1	$+\infty$
4	+	+	
$1-x$	+	0	-
e^{-x}	+	+	
$f'(x)$	+		-
$f(x)$	$-\infty$	$\frac{4}{e}$	0

$$f(-2) = (-2+1)e^{-2} = -e^{-2}$$

Cette année les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$ sont justes « intuitives ».



3)

▪ f est un quotient de fonctions de référence dérivables sur \mathbb{R}^* , de plus $x \mapsto e^x$ ne s'annule pas sur \mathbb{R}^* . f est donc dérivable sur \mathbb{R}^* et pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$$

avec

$$\begin{aligned} u(x) &= 4e^x & \text{et} & & u'(x) &= 4e^x \\ v(x) &= x & \text{et} & & v'(x) &= 1 \end{aligned}$$

d'où




$$f'(x) = \frac{4e^x \times x - 1 \times 4e^x}{x^2} = \frac{(4x-4)e^x}{x^2}$$

▪ Dressons le tableau de signes de f' pour en déduire le tableau de variations de f .

▫ $4x-4 > 0 \Leftrightarrow x > 1$

▫ $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$

▫ $x^2 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$4x-4$	—		0	+
e^x	+		+	+
x^2	+	0	+	+
$f'(x)$	—		0	+
$f(x)$	$+\infty$ 		$+\infty$  $4e$	$+\infty$ 

$$f(1) = \frac{4e^1}{1} = 4e$$

Cette année les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$ ainsi qu'en 0^- et 0^+ sont justes « intuitives ».

