

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

I Ce que l'on sait déjà

Définition n°1. Expérience aléatoire, issue, univers

On appelle **expérience aléatoire** toute expérience qui, renouvelée dans les mêmes conditions, ne donne pas à chaque essai les mêmes résultats. Les résultats possibles de cette expérience aléatoire sont appelés les **issues**. L'ensemble des issues est appelé **univers** de l'expérience aléatoire. On notera Ω cet univers.

Remarque n°1.

Dans ce chapitre, sauf mention explicite du contraire, Ω est fini. Autrement dit, il y a un nombre fini d'issues pour l'expérience aléatoire considérée.

Définition n°2. Événement élémentaires, événement, événement contraire

Les issues sont aussi appelées événements élémentaires. Un événement A est un ensemble composé d'issues. L'événement contraire de A peut être noté \bar{A} , A^c , $\Omega \setminus A$... (nous n'utiliserons que la première), c'est l'ensemble composé de toutes les issues qui ne sont pas dans A . L'ensemble de tous les événements contenus dans Ω est noté $\mathcal{P}(\Omega)$.

Définition n°3. Probabilité

Une probabilité est une application P de l'ensemble des parties de l'univers $\mathcal{P}(\Omega)$ dans $[0, 1]$ telle que la somme des probabilités des issues vaut 1. (attention les deux « P » sont différents)

Remarque n°2. Événement impossible, événement certain, événements incompatibles

- L'ensemble vide, noté \emptyset est appelé événement impossible : $P(\emptyset) = 0$.
- L'ensemble Ω est appelé événement certain : $P(\Omega) = 1$.
- Si A et B deux événements sont tels que $A \cap B = \emptyset$ alors on dit que A et B sont incompatibles et dans ce cas : $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Exemple n°1. Le dé cubique (non pipé)

Quand on jette un dé cubique et que l'on relève le nombre inscrit sur la face du dessus, on réalise une expérience aléatoire. Les issues sont alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6 et l'univers est donc $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.

L'événement A : « Obtenir un nombre pair » est composé des issues 2, 4 et 6. On a donc $A = \{2, 4, 6\}$ et $\bar{A} = \{1, 3, 5\}$.

Comme le dé est non pipé : $P(A) = \frac{1}{2}$.

(A est bien un élément de $\mathcal{P}(\Omega)$ et $P(A)$ appartient bien à $[0, 1]$)

Remarque n°3.

Dans toute la suite de cours, Ω désignera l'univers et P la probabilité.

Propriété n°1. Probabilité de l'événement contraire

Soit A un événement alors $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$

preuve :



A s'écrit à l'aide certaines issues et \bar{A} à l'aide de toutes les autres.


Donc $P(A) + P(\bar{A}) = 1$ d'après la définition n°3, et en soustrayant $P(A)$ à chaque membre, on obtient bien $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$. cqfd

Propriété n°2. Formule du crible (ou de Poincaré)

Soit A et B deux événements alors

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

preuve :



$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A \cap \bar{B}) + P(A \cap B) + P(B \cap \bar{A}) \\ &= P(A) - P(A \cap B) + P(A \cap B) + P(B) - P(A \cap B) \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \end{aligned}$$

cqfd

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES E01

EXERCICE N°1 Remise en forme n°1

Dans son garage, Julien range des bidons et des bouteilles, qui peuvent être avec ou sans étiquette, selon la répartition ci-après :

	Bidon	Bouteille	Total
Avec étiquette	2	9	11
Sans étiquette	6	3	9
Total	8	12	20

Il prend un de ses récipients au hasard et on considère les événements :

A : « Le récipient a une étiquette. »

D : « Le récipient est un bidon. »

1) Déterminer les probabilités $P(A)$ et $P(D)$.

2) Décrire chacun des événements $A \cap D$, $A \cup D$, $\bar{A} \cap D$, par une phrase et donner sa probabilité.

3) Écrire l'événement « Le récipient est une Bouteille sans étiquette » à l'aide des événements A et D .

4) Associer les événements suivants à la valeur qui correspond :

Probabilité qu'une bouteille ait une étiquette.	▪	▪	$\frac{9}{20}$
Probabilité qu'un récipient avec étiquette est une bouteille.	▪	▪	$\frac{9}{11}$
Probabilité qu'un récipient soit une bouteille avec étiquette.	▪	▪	$\frac{9}{12}$

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES E01

EXERCICE N°2 Remise en forme n°2

On considère une urne contenant 3 jetons numérotés de 1 à 3.

On tire un jeton dans cette urne puis **on le remet dans l'urne** et on en tire un second : le résultat de l'expérience aléatoire est le produit des deux nombres obtenus.

- 1) Représenter cette expérience aléatoire par un arbre puis par un tableau.
- 2) Donner la loi de probabilité associée à cette expérience aléatoire.
- 3) Quelle est la probabilité que le résultat de cette expérience aléatoire soit pair ?

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES E01

EXERCICE N°3 Remise en forme n°3

Dans un parc d'attractions, à un manège, le temps d'attente annoncé est 5 , 10 , 15 et 20 minutes avec les probabilités suivantes :

Temps d'attente (en min)	5	10	15	20
Probabilité	0,3	0,1	0,15	

- 1) Déterminer la probabilité d'attendre 20 minutes.
- 2) Déterminer la probabilité d'attendre au plus 10 minutes.
- 3) Déterminer la probabilité d'attendre plus de 10 minutes.
- 4) Déterminer la probabilité d'attendre au moins 10 minutes.
- 5) Déterminer la probabilité d'attendre moins de 10 minutes.

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

II Qu'est-ce-qu'une probabilité conditionnelle ?

Définition n°4. Probabilité de A sachant B

Soit A et B deux événements de probabilité non nulle.
La probabilité de A sachant B se note $P_B(A)$ et on a :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

Propriété n°3. Probabilité de A sachant B en cas d'équiprobabilité

Soit A et B deux événements de probabilité non nulle.

Dans le cadre d'une situation d'équiprobabilité :

$$P_B(A) = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(B)}$$

Remarque n°4. Cardinal d'un ensemble fini

Soit A un ensemble fini, on appelle cardinal de A et on note $\text{Card}(A)$ le nombre d'éléments appartenant à A .

preuve :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(\Omega)}}{\frac{\text{Card}(B)}{\text{Card}(\Omega)}} = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(\Omega)} \times \frac{\text{Card}(\Omega)}{\text{Card}(B)} = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(B)}$$

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES E02

EXERCICE N°1 Avec la définition

(Calculatrice non nécessaire mais autorisée)

Dans un univers Ω , on considère deux événements A et B .

1) On donne $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,4$ et $P(A \cap B) = 0,1$.

Déterminer $P_A(B)$ et $P_B(A)$.

2) On donne $P_A(B) = 0,6$, $P(B) = 0,25$ et $P(A \cap B) = 0,15$.

Déterminer $P(A)$ et $P_B(A)$.

3) On donne $P_B(A) = 0,6$, $P(B) = 0,15$ et $P(A) = 0,45$.

Déterminer $P(A \cap B)$ et $P_A(B)$.

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES E02

EXERCICE N°2 Avec la propriété en cas d'équiprobabilité

(Calculatrice non nécessaire mais autorisée)

Dans un univers Ω , on considère deux événements A et B .

1) On donne $\text{Card}(\Omega) = 50$, $\text{Card}(A) = 30$, $\text{Card}(B) = 15$ et $\text{Card}(A \cap B) = 12$.
Déterminer $P_A(B)$ et $P_B(A)$.

2) On donne $\text{Card}(\Omega) = 50$, $P_A(B) = 0,525$, $\text{Card}(B) = 40$ et $\text{Card}(A \cap B) = 21$.

3)
Déterminer $\text{Card}(A)$, $P(A)$ et enfin $P_B(A)$.

4) On donne $P_B(A) = 0,2$, $\text{Card}(B) = 105$ et $\text{Card}(A) = 70$.
Déterminer $\text{Card}(A \cap B)$ et $P_A(B)$.

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

Méthode n°1. Déterminer une probabilité conditionnelle avec un tableau croisé.

Énoncé

Dans une classe de première de 35 élèves, on a étudié deux caractères :

La réussite et le travail à la maison.

Le résultat de cette étude est présenté dans le tableau suivant :

	R	\bar{R}	Total
T	19 $Card(T \cap R)$	6 $Card(T \cap \bar{R})$	25 $Card(T)$
\bar{T}	3 $Card(\bar{T} \cap R)$	7 $Card(\bar{T} \cap \bar{R})$	10 $Card(\bar{T})$
Total	22 $Card(R)$	13 $Card(\bar{R})$	35 $Card(\Omega)$

Situation
d'équiprobabilité
car

On choisit un élève au hasard dans cette classe.

On note les événements :

R : « L'élève est en situation de réussite »

T : « L'élève travaille à la maison »

Les résultats seront donnés sous forme de fraction irréductible.

1) Déterminer $P_T(R)$ et exprimer par une phrase ce que signifie ce résultat.

2) Déterminer la probabilité qu'un élève travaille sachant qu'il ne réussit pas.

Réponse

$$1) P_T(R) = \frac{Card(R \cap T)}{Card(T)} = \frac{19}{25}$$

Cela signifie, que la probabilité qu'un élève réussisse sachant qu'il travaille vaut $\frac{19}{25}$.

2) Il s'agit de calculer $P_{\bar{R}}(T)$

$$P_{\bar{R}}(T) = \frac{Card(T \cap \bar{R})}{Card(\bar{R})} = \frac{6}{13}$$

Ainsi la probabilité qu'un élève travaille sachant qu'il ne réussit pas vaut $\frac{6}{13}$

Ce qui nous
permet
d'utiliser
la propriété n°3

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES E02

EXERCICE N°3 Avec un tableau en cas d'équiprobabilité

(Calculatrice non nécessaire mais autorisée)

Inspiré du sésamath 1^{er} Spé

Dans une boulangerie, on dispose d'une réduction si l'on choisit la formule « dessert mystère » pour laquelle le dessert accompagnant le menu est tiré au hasard.

Gérard choisit cette formule alors que les desserts encore disponibles sont répartis comme suit.

	Chocolat	Vanille	Total
Tartelette	8	11	19
Éclair	13	7	20
Total	21	18	39

On considère les événements E : « Son dessert est un éclair » et V : « Son dessert est à la vanille ».

- 1) Calculer $P_E(V)$, $P_V(E)$, $P_{\bar{E}}(V)$.
- 2) Gérard voit que son dessert est un éclair. Écrire la probabilité qu'il soit au chocolat comme une probabilité conditionnelle puis la calculer.

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

Remarque n°5.

On pourrait se demander si ces événements dépendent l'un de l'autre ou pas...
Mais au fait qu'est-ce que cela veut dire ?

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

III Indépendance de deux événements

Définition n°5. Événements indépendants

Soient A et B deux événements.

On dira que A et B sont **indépendants** si et seulement si

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

Propriété n°4. *Autre façon de vérifier l'indépendance de deux événements*

Soient A et B deux événements de **probabilité non nulle**.

A et B sont **indépendants** si et seulement si $P_A(B) = P(B)$ ou $P_B(A) = P(A)$.

preuve :

- Soient A et B deux événements de **probabilité non nulle**.
- A et B sont indépendants équivaut à $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- Comme $P(A)$ et $P(B)$ sont non nuls, en divisant chaque membre de l'égalité par $P(A)$ on obtient :

$$\frac{P(A \cap B)}{P(A)} = P(B) \quad \text{c'est à dire : } P_A(B) = P(B)$$

- et en divisant chaque membre de la (toute) première égalité par $P(B)$, on obtient :

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A) \quad \text{c'est à dire : } P_B(A) = P(A) \quad \text{cqfd}$$

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

Remarque n°6.

On a obtenu trois caractérisations de l'indépendance de deux événements et donc dès que l'une est vérifiée, les autres le sont ou aussi et si l'une n'est pas vérifiée, les autres ne le sont pas non plus. On choisit, par conséquent, la plus pratique selon la situation.

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

Méthode n°2. Tester l'indépendance de deux événements.

	R	\bar{R}	Total
T	19 $Card(T \cap R)$	6 $Card(T \cap \bar{R})$	25 $Card(T)$
\bar{T}	3 $Card(\bar{T} \cap R)$	7 $Card(\bar{T} \cap \bar{R})$	10 $Card(\bar{T})$
Total	22 $Card(R)$	13 $Card(\bar{R})$	35 $Card(\Omega)$

On se pose la question : Est-ce-que le fait de travailler influence ou non la réussite (ce qui équivaut à se demander si le fait de réussir influence ou non le fait de travailler). Autrement dit : Les événements T et R sont-ils indépendants ?

On va vérifier si $P_T(R) = P(R)$

$$P_T(R) = \frac{19}{25} \quad (\text{d'après la question 1}) \quad \text{et} \quad P(R) = \frac{22}{35}$$

Ainsi $P_T(R) \neq P(R)$ ce qui signifie que :

T et R ne sont pas indépendants (je vous laisse en tirer vos conclusions...)
(On nuancera vos conclusions en exercices...)

Remarque n°7.

Ici, on aurait pu choisir choisir n'importe qu'elle caractérisation mais comme $P_T(R)$ était déjà connu, on a gagné un peu de temps.

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

Remarque n°8.

Hé oui, cela peut paraître étrange, mais on préfère dire « pas indépendants » plutôt que « dépendants ». Cela permet sûrement de se rappeler que la propriété que l'on utilise permet de tester l'indépendance et pas la dépendance...

Remarque n°9. Ne pas confondre indépendance et incompatibilité

Soient A et B deux événements de probabilité non nulle.

« A et B indépendants » signifie que $P_A(B) = P(B)$ donc que le fait de connaître A ne donne donc aucune information sur B .

alors que :

« A et B incompatibles » signifie que $A \cap B = \emptyset$ c'est à dire que si A est réalisé alors B ne peut pas l'être. Ici le fait de connaître A donne beaucoup d'information sur B .

On comprend même ici que des événements indépendants ne peuvent pas être incompatibles et vice et versa...

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES E03

EXERCICE N°1 Appréhender la définition et la propriété

Soient Ω un univers et A et B deux événements de probabilité non nulle.
Dans chaque cas vérifier l'indépendance de A et B .

1) $P(A) = 0,3$, $P(B) = 0,2$ et $P(A \cap B) = 0,06$.

2) $P_A(B) = 0,3$ $P(B) = 0,5$, $P(A \cap B) = 0,15$.

3) $P(A) = 0,2$ $P(B) = 0,6$ $P(A \cup B) = 0,68$.

4) $P(\overline{A}) = 0,7$ $P(\overline{B}) = 0,8$ $P(A \cap B) = 0,06$.

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES E03

EXERCICE N°2 Démontrer l'indépendance

Une urne contient 12 boules numérotées de 1 à 12. On tire une boule au hasard.

On note

D l'événement « obtenir un multiple de deux »,

T l'événement « obtenir un multiple de trois »,

N l'événement « obtenir un nombre supérieur ou égal à neuf ».

1) Les événements N et T sont-ils indépendants ?

2) Que dire des événements D et N ?

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES E03

EXERCICE N°3 Indépendance vs incompatibilité

Soient Ω un univers et A et B deux événements tels que : $P(A) = 0,4$ et $P(B) = 0,3$.

- 1) Calculer les probabilités de $A \cap B$ et $A \cup B$ si A et B sont indépendants.
- 2) Calculer les probabilités de $A \cap B$ et $A \cup B$ si A et B sont incompatibles.

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES E03

EXERCICE N°4 Des questions à se poser...

Soient Ω un univers et A et B deux événements de probabilité non nulle.
Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ? Justifier la réponse.

- 1) L'événement A et son événement contraire \bar{A} sont indépendants.
- 2) Si A et B sont indépendants alors A et B ne sont pas incompatibles.
- 3) Si A et B sont indépendants alors $P_A(B) = P_B(A)$.
- 4) Si A et B sont indépendants alors \bar{A} et B le sont aussi.

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES E03

EXERCICE N°5 Réussite et/ou travail

Dans une classe de première de 35 élèves, on a étudié deux caractères :

La réussite et le travail à la maison. Le résultat de cette étude est présenté dans le tableau suivant :

	R	\bar{R}	Total
T	12	9	21
\bar{T}	8	6	14
Total	20	15	35

On choisit un élève au hasard dans cette classe. On note les événements :

R : « L'élève est en situation de réussite »

T : « L'élève travaille à la maison »

Les résultats seront donnés sous forme de fraction irréductible.

- 1) Déterminer $P(R)$ et $P_T(R)$ et exprimer par une phrase ce que signifie ces résultats.
- 2) Dans ce contexte, le fait de travailler influence-t-il le fait de réussir ?
- 3) Dans ce contexte, le fait de ne pas travailler influence-t'il le fait de ne pas réussir ?

PROBABILITÉS CONDITIONNELLES

IV Arbre pondéré


Définition n°6. Partition

Un univers Ω étant donné, on appelle partition de Ω toute collection finie de parties non vides de Ω qui vérifient :

- La réunion de ces parties égale Ω
- Ces parties sont deux à deux disjointes.

Exemple n°2.

L'univers Ω est représenté par le rectangle. Dans cet univers, les parties A, B, C et D sont bien disjointes et leur réunion égale Ω : elles forment donc bien une partition de Ω .



Définition n°7. Partition (version « technique »)

Soit Ω un univers, soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ et soit A_1, A_2, \dots, A_n des événements de probabilité non nulle. Ces événements forment une partition de Ω si et seulement si :

- $\bigcup_{k=1}^n A_k = \Omega$
- $\forall (i, j) \in \mathbb{N}^2, 1 \leq i \leq n, 1 \leq j \leq n, i \neq j \Rightarrow A_i \cap A_j = \emptyset$

Remarque n°10.



- $\bigcup_{k=1}^n A_k = A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n$

Dans l'exemple n°2, $n = 4$, $A_1 = A$, $A_2 = B$, $A_3 = C$ et $A_4 = D$

Connaissance n°1 Un arbre pondéré très simple

Supposons à présent, une expérience aléatoire dont l'univers est celui de l'exemple n°2. N'importe quelle issue appartient soit à l'événement A , soit à B soit à C soit à D (car on a une partition de l'univers).

On peut représenter cette expérience à l'aide d'un arbre pondéré.



On peut choisir A avec la probabilité $P(A)$, B avec la probabilité $P(B)$ etc.... jusque D .

$$P(A) + P(B) + P(C) + P(D) = P(A \cup B \cup C \cup D) = P(\Omega) = 1$$

Définition n°8. Vocabulaire sur les arbres (première partie)

Le point de départ de tous les segments s'appelle un nœud, les segments s'appellent des branches.

Propriété n°5.

Dans un arbre pondéré, la somme des probabilités des branches vaut 1.

preuve :

Un nœud représente le choix entre les différents éléments d'une partition. D'une part, par définition ces derniers sont incompatibles entre eux et donc la probabilité de leur union égale la somme de leurs probabilités respectives.


D'autres part leur union égale Ω et comme $P(\Omega) = 1$, la propriété est démontrée.

Connaissance n°2 Deux arbres pondérés pour un même diagramme

Nous considérons à présent deux partitions d'un même univers que nous « superposons » :




A, B, C et D forment une partition n°1 de l'univers Ω .

E et \bar{E} forment une partition n°2 de l'univers Ω .



Si on considère en premier la partition n°1 alors on peut réaliser l'événement E sachant que A est réalisé, on peut réaliser E sachant que B est réalisé etc.... jusque D

Si on considère la partition n°2 en premier alors on peut réaliser l'événement A sachant que l'événement E est réalisé ou sachant qu'il n'est pas réalisé (\bar{E}), etc.... jusque D



Si on suit la branche A puis la branche E alors on réalise l'événement $A \cap E$.

Or :

$$P(A) \times P_A(E) = P(A) \times \frac{P(A \cap E)}{P(A)} = P(A \cap E)$$


En suivant le chemin, on a multiplié les probabilités des branches.

Si on suit la branche E puis la branche A alors on réalise l'événement $A \cap E$.

Or :

$$P(E) \times P_E(A) = P(E) \times \frac{P(A \cap E)}{P(E)} = P(A \cap E)$$

En suivant le chemin, on a multiplié les probabilités des branches.



Définition n°9. Vocabulaire sur les arbres (seconde partie)

Une succession de branches de la racine de l'arbre jusqu'à un « événement final » s'appelle un chemin.

Méthode n°3.

Pour déterminer la probabilité d'un chemin, il suffit de multiplier les probabilités des branches qui le composent.

Propriété n°6. Formule des probabilités totales (admise)

Soit Ω un univers, soit B un événement, soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ et soit A_1, A_2, \dots, A_n une partition de Ω , alors

$$P(B) = \sum_{k=1}^n P(A_k) \times P_{A_k}(B)$$


c'est à dire :

$$P(B) = P(A_1) \times P_{A_1}(B) + P(A_2) \times P_{A_2}(B) + \dots + P(A_n) \times P_{A_n}(B)$$


Remarque n°11. Une idée de la preuve pour $n = 4$

Comme A, B, C et D forment une partition de l'univers on a, grâce à la connaissance n°2 :

$$P(E) = \underbrace{P(E \cap A)}_{P(A) \times P_A(E)} + \underbrace{P(E \cap B)}_{P(B) \times P_B(E)} + \underbrace{P(E \cap C)}_{P(C) \times P_C(E)} + \underbrace{P(E \cap D)}_{P(D) \times P_D(E)}$$

**Méthode n°4. Formule des probabilités totales et arbre pondéré**

La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des événements correspondant aux chemins qui y aboutissent.

Exemple n°3.

$$P(E) = P(A) \times P_A(E) + P(B) \times P_B(E) + P(C) \times P_C(E) + P(D) \times P_D(E)$$

V Le résumé du cours

Probabilité
conditionnelle de A
sachant B

(Le paragraphe I doit bien sûr être connu, on résume ce qui est nouveau)

Soit A et B **deux événements de probabilité non nulle.**

La probabilité de A sachant B se note $P_B(A)$ et on a :

$$P_B(A) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Probabilité
conditionnelle de A
sachant B pour les
tableaux croisés.

Soit A et B **deux événements de probabilité non nulle.**

Dans le cadre d'une situation d'équiprobabilité :

$$P_B(A) = \frac{\text{Card}(A \cap B)}{\text{Card}(B)}$$

$$P_T(R) = \frac{\text{Card}(R \cap T)}{\text{Card}(T)} = \frac{19}{25}$$

$$P_{\bar{T}}(R) = \frac{\text{Card}(T \cap \bar{R})}{\text{Card}(\bar{R})} = \frac{6}{13}$$

	R	\bar{R}	Total
T	19 <small>$\text{Card}(T \cap R)$</small>	6 <small>$\text{Card}(T \cap \bar{R})$</small>	25 <small>$\text{Card}(T)$</small>
\bar{T}	3 <small>$\text{Card}(\bar{T} \cap R)$</small>	7 <small>$\text{Card}(\bar{T} \cap \bar{R})$</small>	10 <small>$\text{Card}(\bar{T})$</small>
Total	22 <small>$\text{Card}(R)$</small>	13 <small>$\text{Card}(\bar{R})$</small>	35 <small>$\text{Card}(\Omega)$</small>

Indépendance de
deux événements

Soient A et B deux événements.

On dira que A et B sont **indépendants** si et seulement si

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

Ne pas confondre
Indépendants et
Incompatibles

Les notions d'indépendance et d'incompatibilité n'ont rien avoir l'une avec l'autre.

Comment tester
l'indépendance de
deux événements

Si de plus A et B sont de **probabilité non nulle** alors


Les quatre assertions suivantes sont équivalentes :

- A et B sont **indépendants**
- $P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$
- $P_A(B) = P(B)$
- $P_B(A) = P(A)$

Partition de
l'univers

Un univers Ω étant donné, on appelle partition de Ω toute collection finie de parties non vides de Ω qui vérifient :



- La réunion de ces parties égale Ω
- Ces parties sont deux à deux disjointes.



A, B, C et D forment
une partition de
l'univers

Il faudra connaître la définition technique l'année
prochaine...

Arbre pondéré
(ou de
probabilités)



Les règles sur les
arbres pondérés

▪ La somme des probabilités des branches d'un nœud vaut toujours 1.

$$P(A) + P(B) + P(C) + P(D) = 1, \quad P_A(E) + P_A(\overline{E}) = 1, \dots$$

▪ Quand on suit un chemin, on multiplie les probabilités des branches.

$$P(D) \times P_D(E) = P(A \cap E)$$

▪ La probabilité d'un événement est la somme des probabilités des événements correspondant aux chemins qui y aboutissent.

$$P(E) = P(A) \times P_A(E) + P(B) \times P_B(E) + P(C) \times P_C(E) + P(D) \times P_D(E)$$

Grâce à

Formules des
probabilités totales

Soit Ω un univers, soit B un événement, soit $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$ et soit A_1, A_2, \dots, A_n une partition de Ω , alors

$$P(B) = \sum_{k=1}^n P(A_k) \times P_{A_k}(B)$$

c'est à dire :

$$P(B) = P(A_1) \times P_{A_1}(B) + P(A_2) \times P_{A_2}(B) + \dots + P(A_n) \times P_{A_n}(B)$$