

LA FONCTION EXPONENTIELLE M03

EXERCICE N°1 Étudier les variations d'une fonction (niveau 1)

[VOIR LE CORRIGÉ](#)

Étudier les variations des fonctions suivantes, toutes définies sur \mathbb{R} .

1) $f: x \mapsto e^{-x} + e^x$

2) $g: x \mapsto e^{3x} - 3x$

3) $h: x \mapsto e^{5x} - 5x + 3$

EXERCICE N°2 Étudier les variations d'une fonction (niveau 2)

[VOIR LE CORRIGÉ](#)

Étudier les variations des fonctions suivantes sur leur ensemble de définition D .

1) $f: x \mapsto (x-1)e^x$ avec $D = \mathbb{R}$

2) $f: x \mapsto \frac{-2x}{e^x}$ avec $D = \mathbb{R}$

3) $f: x \mapsto \frac{-2e^x}{x}$ avec $D = \mathbb{R}^* =]-\infty ; 0[\cup]0 ; +\infty[$

EXERCICE N°3 Étudier les variations d'une fonction (niveau 3)

[VOIR LE CORRIGÉ](#)

Étudier les variations des fonctions suivantes sur leur ensemble de définition D .

1) $f: x \mapsto \frac{x^3}{e^{-x}}$ avec $D = \mathbb{R}$

2) $f: x \mapsto (x^2 - x)e^{x+1}$ avec $D = \mathbb{R}$

Ne pas avoir
peur des calculs
Ce n'est pas si dur

Aide au calcul n°1

$$\left(\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2} \right)^2 - \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \right) e^{\frac{-1-\sqrt{5}}{2}+1} \approx 2,28$$
$$\left(\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2} \right)^2 - \frac{-1+\sqrt{5}}{2} \right) e^{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}+1} \approx -1,19$$

3) $f: x \mapsto \frac{e^x}{x^2-1}$ avec $D = \mathbb{R} \setminus \{-1 ; 1\} =]-\infty ; -1[\cup]-1 ; 1[\cup]1 ; +\infty[$

Question difficile
Ne pas se décourager !

Aide au calcul n°2

$$f(1-\sqrt{2}) = \approx -0,8$$
$$f(1+\sqrt{2}) = \approx 2,32$$

LA FONCTION EXPONENTIELLE M03C

EXERCICE N°1 Étudier le signe d'une expression (niveau 1)

[RETOUR À L'EXERCICE](#)

Étudier les variations des fonctions suivantes, toutes définies sur \mathbb{R} .

1) $f: x \mapsto e^{-x} + ex$

2) $g: x \mapsto e^{3x} - 3x$

3) $h: x \mapsto e^{5x} - 5x + 3$

1)

▪ f est composée de fonctions de référence dérivables sur \mathbb{R} , elle est donc dérivable sur \mathbb{R} et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f'(x) = -e^{-x} + e$$


▪ Dressons le tableau de signes de f' pour en déduire le tableau de variations de f .

$$\square f'(x) > 0 \Leftrightarrow -e^{-x} + e > 0 \Leftrightarrow -e^{-x} > -e^1 \Leftrightarrow e^{-x} < e^1 \Leftrightarrow -x < 1 \Leftrightarrow x > -1$$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	0	$+\infty$

$$f(-1) = e^{-(-1)} + e \times (-1) = e - e = 0$$

Cette année les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$ sont justes « intuitives ».



2)

▪ g est une combinaison linéaire de fonctions de référence dérivables sur \mathbb{R} , elle est donc dérivable sur \mathbb{R} et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$g'(x) = 3e^{3x} - 3$$


▪ Dressons le tableau de signes de g' pour en déduire le tableau de variations de g .

$$\begin{aligned} g'(x) > 0 &\Leftrightarrow 3e^{3x} - 3 > 0 \\ &\Leftrightarrow 3(e^{3x} - 1) > 0 \\ &\Leftrightarrow \underbrace{e^{3x} - 1}_{\text{car } 3 > 0} > 0 \\ &\Leftrightarrow e^{3x} > e^0 \\ &\Leftrightarrow 3x > 0 \\ &\Leftrightarrow \underbrace{x}_{\text{car } 3 > 0} > 0 \end{aligned}$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$		$-$	$+$
$g(x)$	$+\infty$	1	$+\infty$

$$g(0) = e^{3 \times 0} - 3 \times 0 = 1 - 0 = 1$$

Cette année les limites de g en $-\infty$ et $+\infty$ sont justes « intuitives ».



3)

▪ h est une combinaison linéaire de fonctions de référence dérivables sur \mathbb{R} , elle est donc dérivable sur \mathbb{R} et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$h'(x) = 5e^{5x} - 5$$

▪ Dressons le tableau de signes de h' pour en déduire le tableau de variations de h .

$$h'(x) > 0 \Leftrightarrow 5e^{5x} - 5 > 0$$

$$\Leftrightarrow 5(e^{5x} - 1) > 0$$

$$\Leftrightarrow e^{5x} - 1 > 0$$

$\underbrace{\quad}_{\text{car } 5 > 0}$

$$\Leftrightarrow e^{5x} > e^0$$

$$\Leftrightarrow 5x > 0$$


$$\Leftrightarrow x > 0$$

$\underbrace{\quad}_{\text{car } 5 > 0}$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$h'(x)$	$-$	0	$+$
$h(x)$	$+\infty$	4	$+\infty$

$$h(0) = e^{5 \times 0} - 5 \times 0 + 1 = 1 + 0 + 3 = 4$$

Cette année les limites de h en $-\infty$ et $+\infty$ sont justes « intuitives ».



$$y = e^{5x} - 5x + 3$$

LA FONCTION EXPONENTIELLE M03C

EXERCICE N°2 Étudier les variations d'une fonction (niveau 2)

[RETOUR À L'EXERCICE](#)

Étudier les variations des fonctions suivantes sur leur ensemble de définition D .

1) $f: x \mapsto (x-1)e^x$ avec $D = \mathbb{R}$

2) $f: x \mapsto \frac{-2x}{e^x}$ avec $D = \mathbb{R}$

3) $f: x \mapsto \frac{-2e^x}{x}$ avec $D = \mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$

1)

▪ f est une combinaison linéaire de fonctions de référence dérivables sur \mathbb{R} , elle est donc dérivable sur \mathbb{R} et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = u(x)v(x)$$

avec

$$u(x) = x-1 \quad \text{et} \quad u'(x) = 1$$

$$v(x) = e^x \quad \text{et} \quad v'(x) = e^x$$

d'où

$$f'(x) = 1e^x + (x-1)e^x = xe^x$$

▪ Dressons le tableau de signes de f' pour en déduire le tableau de variations de f .

▫ $x > 0 \Leftrightarrow x > 0$ (la bonne blague... oui mais il ne faut pas oublier que 0 va avoir son rôle)

▫ $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
x	$-$	0	$+$
e^x	$+$	$+$	$+$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-1	$+\infty$

$$f(0) = (0-1)e^0 = -1$$

Cette année les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$ sont justes « intuitives ».



$$y = (x-1)e^x$$

2)

▪ f est un quotient de fonctions de référence dérivables sur \mathbb{R} , de plus $x \mapsto e^x$ ne s'annule pas sur \mathbb{R} . f est donc dérivable sur \mathbb{R} et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = \frac{-2x}{e^x} = -2xe^{-x}$$

Ainsi

$$f(x) = u(x)v(x)$$

avec

$$u(x) = -2x \quad \text{et} \quad u'(x) = -2$$

$$v(x) = e^{-x} \quad \text{et} \quad v'(x) = -e^{-x}$$

d'où

$$f'(x) = -2e^{-x} + (-2x) \times (-e^{-x}) = (-2 + 2x)e^{-x}$$

▪ Dressons le tableau de signes de f' pour en déduire le tableau de variations de f .


$$\square -2 + 2x > 0 \Leftrightarrow 2x > 2 \Leftrightarrow x > 1$$

$$\square e^{-x} > 0 \text{ pour tout } x \in \mathbb{R} \text{ (car la fonction exponentielle est strictement positive)}$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$-2 + 2x$	—	0	+
e^{-x}	+		+
$f'(x)$	—		+
$f(x)$	$+\infty$	$-\frac{2}{e}$	0

$$f(1) = -2 \times 1 \times e^{-1} = -2e^{-1}$$

Cette année les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$ sont justes « intuitives ».



3)

▪ f est un quotient de fonctions de référence dérivables sur \mathbb{R}^* , de plus $x \mapsto e^x$ ne s'annule pas sur \mathbb{R}^* . f est donc dérivable sur \mathbb{R}^* et pour tout $x \in \mathbb{R}^*$:

$$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$$

avec

$$\begin{aligned} u(x) &= -2e^x & \text{et} & & u'(x) &= -2e^x \\ v(x) &= x & \text{et} & & v'(x) &= 1 \end{aligned}$$

d'où

$$f'(x) = \frac{-2e^x \times x - 1 \times (-2e^x)}{x^2} = \frac{(-2x+2)e^x}{x^2}$$

▪ Dressons le tableau de signes de f' pour en déduire le tableau de variations de f .

▫ $-2x+2 > 0 \Leftrightarrow -2x > -2 \Leftrightarrow x < 1$


▫ $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$

▫ $x^2 > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^*$

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
$-2x-2$	+	+	0	-
e^x	+	+	+	+
x^2	+	0	+	+
$f'(x)$	+	+	0	-
$f(x)$	0	$+\infty$	$-2e$	$-\infty$

$$f(1) = \frac{-2e^1}{1} = -2e$$

Cette année les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$ ainsi qu'en 0^- et 0^+ sont justes « intuitives ».



LA FONCTION EXPONENTIELLE M03C

EXERCICE N°3 Étudier les variations d'une fonction (niveau 3)

[RETOUR À L'EXERCICE](#)

Étudier les variations des fonctions suivantes sur leur ensemble de définition D .

1) $f: x \mapsto \frac{x^3}{e^{-x}}$ avec $D = \mathbb{R}$

2) $f: x \mapsto (x^2 - x)e^{x+1}$ avec $D = \mathbb{R}$

3) $f: x \mapsto \frac{e^x}{x^2 - 1}$ avec
 $D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$
 $=]-\infty; -1[\cup]-1; 1[\cup]1; +\infty[$

1)

▪ f est un quotient de fonctions de référence dérivables sur \mathbb{R} , de plus $x \mapsto e^{-x}$ ne s'annule pas sur \mathbb{R} . f est donc dérivable sur \mathbb{R} et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = \frac{x^3}{e^{-x}} = x^3 e^x$$

Ainsi :

$$f(x) = u(x)v(x)$$

avec

$$u(x) = x^3 \quad \text{et} \quad u'(x) = 3x^2$$

$$v(x) = e^x \quad \text{et} \quad v'(x) = e^x$$

d'où

$$f'(x) = 3x^2 e^x + x^3 e^x = (x^3 + 3x^2)e^x = x^2(x+3)e^x$$

▪ Dressons le tableau de signes de f' pour en déduire le tableau de variations de f .

▫ $x^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq 0$


▫ $x+3 > 0 \Leftrightarrow x > -3$

▫ $e^x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$

x	$-\infty$	-3	0	$+\infty$
x^2	+	+	0	+
$x+3$	-	0	+	+
e^x	+	+	+	+
$f'(x)$	-	0	+	+
$f(x)$	0	$-\frac{27}{e^3}$	0	$+\infty$

$$f(-3) = \frac{(-3)^3}{e^{-(-3)}} = -\frac{27}{e^3}$$

Cette année les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$ sont justes « intuitives ».



2)

▪ f est une combinaison linéaire de fonctions de référence dérivables sur \mathbb{R} , elle est donc dérivable sur \mathbb{R} et pour tout $x \in \mathbb{R}$:

$$f(x) = u(x)v(x)$$

avec

$$u(x) = x^2 - x \quad \text{et} \quad u'(x) = 2x - 1$$

$$v(x) = e^{x+1} \quad \text{et} \quad v'(x) = e^{x+1}$$

d'où

$$f'(x) = (2x-1)e^{x+1} + (x^2-x)e^{x+1} = (x^2+x-1)e^{x+1}$$

▪ Dressons le tableau de signes de f' pour en déduire le tableau de variations de f .

Commençons par factoriser $f'(x)$.

Posons $\Delta = 1^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 5$ le discriminant du trinôme x^2+x-1 . $\Delta > 0$, il y a donc deux racines distinctes :

$$x_1 = \frac{-1-\sqrt{5}}{2 \times 1} = \frac{-1-\sqrt{5}}{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-1+\sqrt{5}}{2 \times 1} = \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$$

Ainsi,

$$f'(x) = (x-x_1)(x-x_2)e^{x+1}$$

$$\square \quad x-x_1 > 0 \Leftrightarrow x - \frac{-1-\sqrt{5}}{2} > 0 \Leftrightarrow x > \frac{-1-\sqrt{5}}{2}$$

$$\square \quad x-x_2 > 0 \Leftrightarrow x - \frac{-1+\sqrt{5}}{2} > 0 \Leftrightarrow x > \frac{-1+\sqrt{5}}{2}$$

ici on a bien $x_1 < x_2$

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$	
$x-x_1$	—	0	+	+	
$x-x_2$	—	—	0	+	
e^{x+1}	+	+	+	+	
$f'(x)$	+	0	—	0	+
$f(x)$	0	$\nearrow \approx 2,28$	$\searrow \approx -1,19$	$\nearrow +\infty$	


$$f(x_1) = f\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right) = \left(\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right)^2 - \frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right)e^{\frac{-1-\sqrt{5}}{2}+1} \approx 2,28$$

$$\left(\left(\frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right)^2 - \frac{-1-\sqrt{5}}{2}\right)e^{\frac{-1-\sqrt{5}}{2}+1} \approx 2,28$$

$$f(x_2) = f\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right) = \left(\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 - \frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)e^{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}+1} \approx -1,19$$

$$\left(\left(\frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)^2 - \frac{-1+\sqrt{5}}{2}\right)e^{\frac{-1+\sqrt{5}}{2}+1} \approx -1,19$$

Cette année les limites de f en $-\infty$ et $+\infty$ sont justes « intuitives ».



$$y = (x^2 - x)e^{x+1}$$

3)

▪ f est un quotient de fonctions de référence dérivables sur D , de plus $x \mapsto x^{-1}$ ne s'annule pas sur D . f est donc dérivable sur D et pour tout $x \in D$:

On n'oublie pas : $D = \mathbb{R} \setminus [-1 ; 1] =]-\infty ; -1[\cup]-1 ; 1[\cup]1 ; +\infty[$

$$f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$$

avec

$$\begin{aligned} u(x) &= e^x & \text{et} & & u'(x) &= e^x \\ v(x) &= x^2 - 1 & \text{et} & & v'(x) &= 2x \end{aligned}$$

d'où

$$f'(x) = \frac{(x^2-1)e^x - 2xe^x}{(x^2-1)^2} = \frac{x^2+x-1}{(x+1)^2(x-1)^2}$$

$$\begin{aligned} (x^2-1)^2 &= [(x+1)(x-1)]^2 \\ &= (x+1)^2(x-1)^2 \end{aligned}$$

▪ Dressons le tableau de signes de f' pour en déduire le tableau de variations de f .

Commençons par factoriser $f'(x)$.

Posons $\Delta = (-2)^2 - 4 \times 1 \times (-1) = 8$ le discriminant du trinôme $x^2 - 2x - 1$. $\Delta > 0$, il y a donc deux racines distinctes :

$$x_1 = \frac{-(-2) - \sqrt{8}}{2 \times 1} = \frac{2 - 2\sqrt{2}}{2} = 1 - \sqrt{2} \quad \text{et} \quad x_2 = \frac{-(-2) + \sqrt{8}}{2 \times 1} = \frac{2 + 2\sqrt{2}}{2} = 1 + \sqrt{2}$$

Ainsi,

$$f'(x) = \frac{x^2+x-1}{(x+1)^2(x-1)^2} = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x+1)^2(x-1)^2}$$

$$\square x - x_1 > 0 \Leftrightarrow x - (1 - \sqrt{2}) > 0 \Leftrightarrow x > 1 - \sqrt{2}$$

$$\square x - x_2 > 0 \Leftrightarrow x - (1 + \sqrt{2}) > 0 \Leftrightarrow x > 1 + \sqrt{2}$$

$$\square (x+1)^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq -1$$

$$\square (x-1)^2 > 0 \Leftrightarrow x \neq 1$$

x	$-\infty$	-1	x_1	1	x_2	$+\infty$	
$x-x_1$	$-$	$-$	0	$+$	$+$	$+$	
$x-x_2$	$-$	$-$	$-$	$-$	0	$+$	
$(x+1)^2$	$+$	0	$+$	$+$	$+$	$+$	
$(x-1)^2$	$+$	$+$	$+$	0	$+$	$+$	
$f'(x)$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$f(x)$	<div><div>0</div><div>$+\infty$</div></div>	<div><div>$-\infty$</div><div>$\approx -0,8$</div><div>$-\infty$</div></div>	<div><div>$+\infty$</div><div>$\approx 2,32$</div><div>$+\infty$</div></div>				

$$f(x_1) = f(1 - \sqrt{2}) = \approx -0,8$$

$$f(x_2) = f(1 + \sqrt{2}) = \approx 2,32$$

aide au calcul

$$f(1 - \sqrt{2}) = \approx -0,8$$

$$f(1 + \sqrt{2}) = \approx 2,32$$

