

Nom :

Prénom :

Classe :

Correction 1

4 pts

- a. $4(x+4)(5-2x) = 4(5x-2x^2+20-8x)$
 $= 4(-2x^2-3x+20) = -8x^2-12x+80$
- b. $2x+1+(4x-3)^2 = 2x+1+(16x^2-24x+9)$
 $= 16x^2-22x+10$
- c. $3+(5+x)^2 = 3+(25+10x+x^2)$
 $= x^2+10x+28$
- d. $[(x+1)(x-1)](2x-3) = (x^2-1)(2x-3)$
 $= 2x^3-3x^2-2x+3$

Correction 2


4 pts

- a. $\frac{5}{7} + \frac{1}{7} \times \left(5 + \frac{1}{2}\right) = \frac{5}{7} + \frac{1}{7} \times \left(\frac{10}{2} + \frac{1}{2}\right)$
 $= \frac{5}{7} + \frac{1}{7} \times \frac{11}{2} = \frac{5}{7} + \frac{11}{14} = \frac{10}{14} + \frac{11}{14} = \frac{21}{14} = \frac{3}{2}$
- b. $\frac{3}{7} - \frac{2}{7} \times \frac{21}{8} = \frac{3}{7} - \frac{2}{7} \times \frac{21}{8} = \frac{3}{7} - \frac{1}{1} \times \frac{3}{4}$
 $= \frac{3}{7} - \frac{3}{4} = \frac{12}{28} - \frac{21}{28} = -\frac{9}{28}$
- c. $\frac{\frac{2}{3} + \frac{1}{2}}{\frac{3}{9} - \frac{1}{3}} = \frac{\frac{4}{6} + \frac{3}{6}}{\frac{3}{9} - \frac{3}{9}} = \frac{\frac{7}{6}}{\frac{0}{9}} = \frac{7}{6} \times \frac{9}{14} = \frac{1}{2} \times \frac{3}{2} = \frac{3}{4}$
- d. $\frac{2}{13} - \frac{5}{13} \div \frac{10}{16} = \frac{2}{13} - \frac{5}{13} \times \frac{16}{10} = \frac{2}{13} - \frac{1}{13} \times \frac{16}{2}$
 $= \frac{2}{13} - \frac{1}{13} \times 8 = \frac{2}{13} - \frac{8}{13} = -\frac{6}{13}$

Correction 3

4 pts

Voici la représentation de la figure utilisée :



- a. $\vec{AC} + \vec{JA} = \vec{JA} + \vec{AC} = \vec{JC}$
- b. $\vec{AI} + \vec{AD} = \vec{AI} + \vec{IJ} = \vec{AJ}$
- c. $\vec{AB} + \vec{IJ} - \vec{DJ} = (\vec{AI} + \vec{IB}) + \vec{IJ} + \vec{JD}$
 $= \vec{IB} + (\vec{AI} + \vec{IJ} + \vec{JD})$
 D'après la relation de Chasles, on a :
 $= \vec{IB} + \vec{AD} = \vec{IB} + \vec{BC} = \vec{IC}$

Correction 4

4 pts

1. Cette équation n'est pas définie lorsque les dénominateurs des deux fractions s'annulent : c'est à dire en -1 . L'ensemble de résolution est $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$

2.

$$\frac{3x-1}{x+1} = \frac{6x-3}{3x+3}$$

$$\frac{3x-1}{x+1} = \frac{2x-1}{x+1}$$

$$\frac{3x-1}{x+1} - \frac{2x-1}{x+1} = 0$$

$$\frac{3x-1-(2x-1)}{x+1} = 0$$

$$\frac{3x-1-2x+1}{x+1} = 0$$

$$\frac{x}{x+1} = 0$$

Un quotient est nul si, et seulement si, le numérateur est nul

$$x = 0$$

Cette équation admet 0 pour unique solution.

Correction 5

4 pts

- a. $(3x+1)(5x-2) = (6x+2)(1-x)$
 $(3x+1)(5x-2) - (6x+2)(1-x) = 0$
 $(3x+1)(5x-2) - [2(3x+1)](1-x) = 0$
 $(3x+1)(5x-2) - 2(3x+1)(1-x) = 0$
 $(3x+1)[(5x-2) - 2(1-x)] = 0$
 $(3x+1)(5x-2-2+2x) = 0$
 $(3x+1)(7x-4) = 0$

Un produit est nul si, et seulement si, au moins un de ses facteurs est nul.

$$\begin{array}{l|l} 3x+1=0 & 7x-4=0 \\ 3x=-1 & 7x=4 \\ x=-\frac{1}{3} & x=\frac{4}{7} \end{array}$$

On en déduit l'ensemble des solutions de cette équation :

$$S = \left\{ -\frac{1}{3}; \frac{4}{7} \right\}$$

b.

$$\frac{1}{x+1} + \frac{2}{x-1} = 0$$

$$\frac{1 \times (x-1)}{(x+1)(x-1)} + \frac{2(x+1)}{(x-1)(x+1)} = 0$$

$$\frac{(x-1) + 2(x+1)}{(x-1)(x+1)} = 0$$

$$\frac{x-1+2x+2}{(x-1)(x+1)} = 0$$

$$\frac{3x+1}{(x-1)(x+1)} = 0$$

Si un quotient est nul alors son numérateur est nul :

$$3x+1=0$$

$$3x=-1$$

$$x=-\frac{1}{3}$$

Cette équation admet pour unique solution $-\frac{1}{3}$.

On ne peut pas diviser par zéro

Or : $x+1=0 \Leftrightarrow x=-1$ et $x-1=0 \Leftrightarrow x=1$

Donc -1 et 1 sont des valeurs interdites

Le domaine de résolution est donc : $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$