#### EXERCICE N°1 Maîtrise du vocabulaire

Compléter les cases vides avec un « P » si l'expression qui se situe à leur gauche est un produit ou un « S » si c'est une somme (algébrique).

 $(4x+2)^2 + (5x-7)^3$ (5x+2)(3x+2)(x+1)

5 x	4(3x+2)-7	
5x+7	2+(3x+2)(5x-7)	
5x-7	(x+7)(7-5x)-(5x+2)	
3x(5x-7)	$(3x+7)^2$	
(3x+2)(5x-7)	$(3x+7)^5$	
	·	

#### EXERCICE N°2 Échauffement

Transformer les produits suivant en sommes (algébriques) : On développe

- 1) 3(x+2)
- 2)  $(2x-7)\times 5$  3) 3x(5-2x) 4) -4x(2x+5)

#### EXERCICE N°3 Une première démonstration

Soient a, b, c, d et k des nombres.

On rappelle la propriété suivante : k(a+b)=ka+kb

À l'aide de cette propriété et en posant k=c+d , démontrer l'égalité suivante :

$$(a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd$$

#### EXERCICE N°4 Entraînement

À l'aide la propriété suivante : (a+b)(c+d)=ac+ad+bc+bd et en utilisant la règle des signes, développer les expressions suivantes :

1) 
$$(3x+2)(4+1,5x)$$

$$(3x+2)(4+1,5x)$$
 2)  $(3x-2)(4+1,5x)$  3)  $(-5x+2)(2x-3)$ 

3) 
$$(-5x+2)(2x-3)$$

# I Développer et réduire une expression

Définition n°1.

Développer c'est transformer un produit en une somme algébrique.

Remarque n°1.

Réduire une expression, c'est « regrouper les termes semblables » et faire les calculs

Exemple n°1.

$$(2x+3)(x-4)$$
 =  $2x^2-8x+3x-12$  =  $2x^2-5x-12$   
produit  $\rightarrow$  somme  $\rightarrow$  expression réduite

### I.1 La distributivité

Dans toute la suite de ce chapitre, a, b, c, d et k sont des nombres.

Propriété n°1. Simple distributivité

$$k(a+b)=k a+k b$$
 et  $k(a-b)=k a-k b$ 

Exemple n°2.

$$3x(7+2x)=21x+6x^2$$
 et  $3x(7-2x)=21x-6x^2$ 

Remarque n°2.

$$(7+2x)\times 3x = 3x(7+2x)$$

#### Propriété n°2. Double distributivité

$$(a+b)(c+d) = ac+ad+bc+bd$$

#### Remarque n°3.

On n'oublie pas d'appliquer la règle des signes.

#### Méthode n°1.

$$(2x+3)(x-4)$$
 L1

$$= (+2x) \times (+x) + (+2x) \times (-4) + (+3) \times (+x) + (+3) \times (-4)$$
 L2

$$=2\times x - 2x \times 4 + 3 \times x - 3 \times 4$$

$$=2x^2-8x+3x-12$$
 L4

$$=2x^2-5x-12$$
 L5

#### Remarque n°4.

Si il y a plus de termes dans les parenthèses, il suffit d'ajouter assez de flèches que ce soit dans la propriété n°1 ou dans la n°2.

### Exercice n°1.

Développer et réduire :

$$A=-2x(7-3x)$$
;  $B=(4x-3)(5-3x)$  et  $C=(2x+3y)(4-2z)$ 

# 1.2 Les identités remarquables

### Propriété n°3. 1<sup>re</sup> identité remarquable

$$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

**preuve:** 
$$(a+b)^2 = (a+b)(a+b) = a^2 + ab + ba + b^2 = a^2 + ab + ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$$

Exemple n°3.

$$(8+3x)^2 = 8^2 + 2 \times 8 \times 3x + (3x)^2 = 64 + 48x + 9x^2 = 9x^2 + 48x + 64$$

#### Remarque n°5.

Il est de coutume d'ordonner selon les puissances décroissantes de l'inconnue.

Propriété n°4. 2<sup>e</sup> identité remarquable

$$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

**preuve:** 
$$(a-b)^2 = (a-b)(a-b) = a^2 - ab - ba + b^2 = a^2 - ab - ab + b^2 = a^2 - 2ab + b^2$$

Exemple n°4.

$$(8-3x)^2=8^2-2\times 8\times 3x+(3x)^2=64-48x+9x^2=9x^2-48x+64$$

Propriété n°5. 3<sup>e</sup> identité remarquable

$$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$$

**preuve:** 
$$(a+b)(a-b)=a^2-ab+ba-b^2=a^2-ab+ab-b^2=a^2-b^2$$

Exemple n°5.

$$(8-3x)(8+3x)=8^2-(3x)^2=64-9x^2=-9x^2+64$$

### Exercice n°2.

Développer et réduire :

$$D = (1,5x+2)^2$$
 ;  $E = (3x-2y)^2$  ;  $F = (2x-1)(2x+1)$ 

#### Méthode n°2. Développer une expression « plus complexe »

Développons et réduisons l'expression G.

$$G=4(3x+2)^2-(x+2)(7-3x)$$
 L1

$$G = 4(9x^2 + 12x + 4) - (7x - 3x^2 + 14 - 6x)$$
 L2

$$G = 36 x^2 + 48 x + 16 - 7 x + 3 x^2 - 14 + 6 x$$
 L3

$$G = 39 x^2 + 47 x + 2$$
 L4

Réviser pour l'interrogation écrite

### EXERCICE N°1 On applique

Développer et réduire les expressions suivantes :

1) 
$$(2x+3)^2$$

**2)** 
$$(4+3x)^2$$

3) 
$$(3x+2y)^2$$

À la maison

**4)** 
$$(1,5x-4)^2$$

**5)** 
$$(7-3x)^2$$

6) 
$$(3x-2y)^2$$

7) 
$$(3x-2)(3x+2)$$

8) 
$$(7-3x)(7+3x)$$

9) 
$$(5+4x)(4x-5)$$

On complique EXERCICE N°2

Développer et réduire les expressions suivantes :

1) 
$$(3x+7)^2+(2x-3)^2$$

2) 
$$(3x-5)^2-(6-5x)^2$$

1) 
$$(3x+7)^2+(2x-3)^2$$
 2)  $(3x-5)^2-(6-5x)^2$  3)  $(4x-1)^2-(2x-3)(5+7x)$ 

EXERCICE N°3 On panique (ou pas)

Développer et réduire les expressions suivantes :

1) 
$$(a+b)^3$$

**2)** 
$$(a-b)^3$$

3) 
$$(a+b+c)^2$$

### II Factoriser une expression

### Définition n°2.

Factoriser, c'est transformer une somme (algébrique) en un produit.

#### Méthode n°3. Avec un facteur commun

Factoriser l'expression suivante :

$$H = (2x+1)(3x-5)-(2x+1)^2+(8x+4)(7x-1)$$
 L1

$$H = (2x+1)(3x-5) - (2x+1)(2x+1) + 4(2x+1)(7x-1)$$
 L2

$$H = (2x+1)[(3x-5)-(2x+1)+4(7x-1)]$$
 L3

$$H = (2x+1) | 3x-5-2x-1+28x-4 ]$$
 L4

$$H = (2x+1)(29x-10)$$
 L5

### Exercice n°3.

Factoriser 
$$I = (3x-2)^2 - (2+6x)(3x-2)$$

### EXERCICE N°1 Avec un facteur commun

Factoriser les expressions suivantes :

$$A=9x(x-3)+9x(10+2x)$$
  $B=(2x+1)(8+x)-(3x-1)(2x+1)$ 

$$C = (11x-3)^2 + (11x-3)$$
  $D = 9x(2x+1) + 6x(5+x)$ 

#### Méthode n°4. Avec des identités remarquables

L'idée est de reconnaître les membres de droite des identités remarquables et d'utiliser ces identités de la droite vers la gauche.

En pratique, c'est surtout la 3<sup>e</sup> qui est utile...

#### Exemple n°6. Avec la 1<sup>re</sup> identité remarquable

$$9+4x^2+12x = 4x^2+12x+9 = (2x)^2+12x+3^2 = (2x+3)^2$$

#### Remarque n°6. essentielle

On a repéré les valeurs de a et b et on a pas oublié de vérifier que  $2 \times a \times b = 2 \times 2 \times x \times 3 = 12 \times x$ 

# Exercice n°4.

Factoriser l'expression :  $J = 24 y + 36 + 4 y^2$ 

Exemple n°7. Avec la 2<sup>e</sup> identité remarquable

$$-12x+9+4x^2 = 4x^2-12x+9 = (2x)^2-12x+3^2 = (2x-3)^2$$

Remarque n°7. essentielle

On a repéré les valeurs de a et b et on a pas oublié de vérifier que  $2\times a\times b=2\times 2x\times 3=12x$ 

# Exercice n°5.

Factoriser l'expression :  $J = 81 + 16z^2 - 72z$ 

Exemple n°8. Avec la 3<sup>e</sup> identité remarquable

$$(4x+2)^2 - (3x-7)^2 = [(4x+2) + (3x-7)][(4x+2) - (3x-7)] = (7x-5)(x+9)$$

Remarque n°8.

On oublie pas qu'on repère les membres de droite des identités remarquables.

Ici 
$$a^2 = (4x+2)^2$$
 donc  $a = 4x+2$  et  $b^2 = (3x-7)^2$  donc  $b = 3x-7$ 

Réviser pour l'interrogation écrite

# Exercice n°6.

Factoriser 1'expression:  $L=(5x-2)^2-(6+2x)^2$ 

EXERCICE N°2 Avec une identité remarquable

 $A = 9x^2 + 24x + 16$ 

 $B = 90 x + 81 + 25 x^2$ 

 $C=36 x^2-24x+4$ 

 $D = 0.36 x^2 + 0.25 - 0.6 x$   $E = 49 - 64 x^2$ 

 $F = (2,1 x-5)^2 - (7+4 x)^2$ 

EXERCICE N°3 On mélange

$$A = 9x^2 - 24x + 16 - (3x - 4)(2x + 7)$$
  $B = (1 - 3x)(5x + 2) + (3x - 1)(4x - 2)$ 

$$C = (6 x+2)(4x-1)-(3x+1)(4+3x) D = (2x-1)^2-(2x-1)(3x+4)+(2x-1)^3$$

EXERCICE N°1 Sans la calculatrice!

- 1) Développer et réduire l'expression suivante :  $A = (2x-1)(8x+1) (4x-0.75)^2$
- 2) Calculer la valeur de A pour x = 100 puis pour  $x = \left(\frac{\sqrt{\pi + 3}}{25}\right)^{22}$
- 3) Calculer astucieusement :  $19 \times 81 39,25^2$


#### EXERCICE N°2 Techniques de démonstration

On dit qu'un nombre entier n est pair s'il existe un nombre entier p tel que n=2 p. Par exemple le nombre 18 est pair car  $18=2\times9$  (ici n=18 et p=9, on peut utiliser d'autres lettres si on veut...)

- 1) Démontrer que le cube d'un nombre pair est pair.
- 2) Démontrer que la somme de trois nombres pairs est paire.
- 3) La moitié d'un nombre pair est-elle toujours paire ? Justifier.

### EXERCICE N°3 Un peu de géométrie.

On donne les figures suivantes :




- 1) Déterminer les valeurs possibles pour x.
- 2) Exprimer l'aire de chacune des figures en fonctions de x.
- 3) Exprimer en fonction de x, la différence de ces deux aires.
- 4) Démontrer que cette différence peut aussi s'écrire  $\left(\frac{3}{2}x-6\right)(x+1)$

#### III Le résumé du cours

Dans les expressions qui suivent, a, b, c, d et k sont des nombres qui peuvent aussi prendre la forme d'expression.

Par exemple, il est possible d'avoir a=3x+5 ...

### III.1 Définition



### III.2 Simple distributivité

produit 
$$\begin{array}{c} k\left(a+b\right) = k\,a + k\,b \\ \\ \text{produit} \\ k\left(a-b\right) = k\,a - k\,b \\ \\ \text{produit} \\ k\left(a+b-c\dots\right) = ka+kb-kc\dots \end{array}$$
 somme

#### III.3 double distributivité

produit 
$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd$$
 somme

# III.4 Les identités remarquables

produit	$(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$	somme
produit	$(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$	somme
produit	$(a+b)(a-b)=a^2-b^2$	somme