



REDES NEURONALES 2024

Clase 10 parte 1

Jueves 12 de septiembre 2024

FAMAF, UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

INSTITUTO DE FÍSICA ENRIQUE GAVIOLA (UNC-CONICET)

26/9/23 c10p2

REPASO DE LA ÚLTIMA CLASE

Recuerden que estamos analizando un sistema bidimensional lineal

$$\dot{x} = a x + b y$$

$$\dot{y} = c x + d y$$

$$a = \left. \frac{\partial f}{\partial x} \right|_{x^*, y^*} \quad b = \left. \frac{\partial f}{\partial y} \right|_{x^*, y^*} \quad c = \left. \frac{\partial g}{\partial x} \right|_{x^*, y^*} \quad d = \left. \frac{\partial g}{\partial y} \right|_{x^*, y^*}$$

con

$$\dot{\bar{x}} = A \bar{x} = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

Notemos que $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$$A \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Las soluciones $\bar{x}(t)$ pueden visualizarse como trayectorias que no se cortan en \mathbb{R}^2 .

Consideremos el caso particular:


$$\begin{pmatrix} \dot{x} \\ \dot{y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a x \\ d y \end{pmatrix}$$

$$\dot{x} = a x \quad \Longrightarrow \quad x(t) = x_0 e^{at}$$


$$\dot{y} = d y \quad \Longrightarrow \quad y(t) = y_0 e^{dt}$$

Consideremos el caso particular en el cual $d = -1$, o sea, el sistema es estable en la dirección y .


Miremos ahora como la dinámica depende del valor de a .




(a) $a < -1$




(b) $a = -1$



(c) $-1 < a < 0$



(d) $a = 0$



(e) $a > 0$

Ahora volvemos al caso más general:

$$\dot{\bar{v}} = \begin{pmatrix} \dot{u} \\ \dot{v} \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} \frac{\partial f}{\partial x} & \frac{\partial f}{\partial y} \\ \frac{\partial g}{\partial x} & \frac{\partial g}{\partial y} \end{pmatrix}_{\bar{x}^*} \begin{pmatrix} u \\ v \end{pmatrix} = A \bar{v}$$

Vamos a buscar un sistema de referencia más cómodo. Primero corremos el origen de coordenadas al punto fijo, como ya hicimos, y luego vamos a rotar el sistema de coordenadas con la esperanza de que encontrar un sistema de coordenadas que nos facilite la descripción matemática del problema.

Debemos encontrar dos vectores \bar{v}_1 y \bar{v}_2 , y dos números reales λ_1 y λ_2 , que satisfacen la ecuación:

$$A \bar{v} = \lambda \bar{v} = \lambda I \bar{v}$$

$$(A \bar{v} - \lambda \bar{v}) = (A \bar{v} - \lambda I \bar{v}) = (A - \lambda I) \bar{v} = 0$$

$$(A - \lambda I) \bar{v} = 0$$

$$\det (A - \lambda I) = 0$$

