




Instituto Politécnico Nacional Escuela Superior de Cómputo

Ecuaciones Diferenciales
Profesor: Luis Moctezuma Cervantes
Grupo: 1CM6
Adrian González Pardo
Semestre: 18/02



Ultima fecha modificado: 11 de julio de 2020

Índice

1. Introducción	3
1.1. Presentación	3
1.2. Prerequisitos para la materia	3
1.3. Libros de consulta	3
2. Inicio	3
3. Técnicas de Integración	3
3.1. Por sustitución	4
3.2. Por partes	6
3.3. Integración trigonométrica	11
3.3.1. Tipo I:	11
3.3.2. Tipo II:	12
3.4. Intregación por sustitución trigonométrica	13
3.4.1. Caso I:	13
3.4.2. Caso II:	13
3.4.3. Caso III:	14
4. Ecuaciones Diferenciales	16
4.1. Clasificación por Tipo	16
4.2. Clasificación por Orden	17
4.3. Clasificación por Linealidad	17
5. Solución de una ED	18
6. Solución explícita e implícita	18

1. Introducción

1.1. Presentación

Las ecuaciones diferenciales no son más que un conjunto de sistemas lineales o no lineales que representan modelo de comportamiento matemático, el cual puede ser aplicado en áreas como la ingeniería la cual puede servir para describir el comportamiento físico de un circuito eléctrico mediante las ecuaciones de voltaje de elementos lineales (resistencias, capacitadores e inductores), por otro lado igual puede ser aplicado en modelados matemáticos que puedan representar la medición estadística de una población de bacterias.

Ahora bien con el fin de facilitar el aprendizaje de estos temas se desarrollaran varias notas que se tomaron en el curso así como complemento de propia mano del escritor.

1.2. Prerequisitos para la materia

Si bien las matemáticas guardan una íntima pero fuerte relación entre sus tópicos es importante marcar algunos requisitos para poder dar seguimiento o poder tener un mejor entendimiento con la materia

Principios de Cálculo	Nociones de Álgebra Lineal
Nociones de Análisis Vectorial	Nociones de Física

Si bien podríamos desglosar todos y cada uno de los requisitos de cada asignatura, no es la idea asustar a los pequeños lectores o consultores de este documento, ahora sí continuemos

1.3. Libros de consulta

Si bien las ecuaciones diferenciales pueden ser estudiadas en cursos los cuales no soliciten libro, te puedes apoyar de material que se encuentra de forma gratuita pero quizás poco legal en internet, por ello yo no quiero alentarte a realizar una conducta dañina a los autores, mi mejor recomendación en este aspecto, es quizás consigas los pdf's pero después de ello busca la forma de conseguirlo en físico para tu formación o para el apoyo de tus compañeros o alumnos.

- Dennis Zill, Ecuaciones Diferenciales → Para comenzar desde el inicio y sin complicaciones
- Editorial Trillas Canek, Ecuaciones Diferenciales ordinarias → Para subir el nivel con respecto al Dennis
- Makarenko, Problemas de Ecuaciones Diferenciales ordinarias 1996 → Para ejercicios bastante completos y extensos

2. Inicio

Recordemos que para tener un buen inicio con respecto al curso es necesario tener un ligero repaso a las Técnicas de Integración y a algunas técnicas de identificación de identidades trigonométricas, por lo que durante el desarrollo de este texto se añadieron varios formularios respecto al tema.

3. Técnicas de Integración

Las técnicas de integración son herramientas que nos serán de utilidad como si fuese la frase celebre o la bendición del día a día.

Recordemos que las técnicas más comunes que tenemos son 4:

1. Por sustitución

2. Por partes
3. Por sustitución trigonométrica
4. Por fracciones parciales

Ahora con esto, comencemos.

3.1. Por sustitución

Teorema: Sea $g(x)$ una función derivable y supongase que $F(x)$ es una antiderivada de $f(x)$.

Entonces si $u = g(x)$ tenemos lo siguiente:

$$\int f(g(x))g'(x)dx = \int f(u)du = F(u) + C = F(g(x)) + C: C \in \mathbb{R}$$

Ejemplos:

$$\int \frac{x}{\cos^2(x^2)}dx$$

Solución

Recordemos identidades trigonométrica como lo es: $\frac{1}{\cos(x)} = \sec(x)$, entonces tenemos lo siguiente

$$\int x \sec^2(x^2)dx$$

Ahora por sustitución definimos a $u = x^2 \rightarrow du = 2xdx$ completando la integral tenemos:

$$\frac{1}{2} \int \sec^2(u)du = \frac{1}{2} \tan(u) + C$$

Sustituyendo los valores de u tenemos la integral resuelta:

$$\int \frac{x}{\cos^2(x^2)} = \frac{1}{2} \tan(x^2) + C$$

$$\int \frac{3}{\sqrt{5-9x^2}}dx$$

Solución

Recordemos la forma de las integrales que pasan a la forma inversa de una función trigonométrica (arcos) podemos pensar en el cambio de variable por $u = 3x \rightarrow du = 3dx$, entonces tendremos lo siguiente:

$$\int \frac{1}{\sqrt{5-u^2}}du = \arcsen\left(\frac{u}{5}\right) + C$$

Sustituyendo u por el valor que tenemos en x tenemos:

$$\int \frac{3}{\sqrt{5-9x^2}}dx = \arcsen\left(\frac{3x}{5}\right) + C$$

$$\int \frac{6e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dx$$

Solución

Para este tipo de integral lo que podemos hacer es proponer el siguiente cambio de variable $u = \frac{1}{x} \rightarrow du = -\frac{1}{x^2} dx$

$$-6 \int e^u du = -6e^u + C$$

Sustituyendo u por su valor con respecto a x tenemos:

$$\int \frac{6e^{\frac{1}{x}}}{x^2} dx = -6e^{\frac{1}{x}} + C$$

$$\int \frac{e^x}{4 + 9e^{2x}} dx$$

Solución:

Se propone el siguiente cambio de variable $u = 3e^x \rightarrow du = 3e^x dx$

$$\frac{1}{3} \int \frac{1}{4 + u^2} du = \frac{1}{6} \arctan \frac{u}{2} + C$$

Sustituyendo los valores de u con respecto a x

$$\int \frac{e^x}{4 + 9e^{2x}} dx = \frac{1}{6} \arctan \frac{3e^x}{2} + C$$

Ejercicio propuesto:

1.

$$\int \frac{a^{\tan(t)}}{\cos^2(t)} dt$$

Hint: No te espantes y sustituye ese $\frac{1}{\cos^2(x)}$ por su identidad trigonométrica correspondiente.

3.2. Por partes

Definición: Sea una función dada por el producto de dos funciones cuya función se desea buscar su integral indefinida, la fórmula está dada por:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Algunos tipos a la hora de aplicar la regla de la integración por partes tenemos que tomar en cuenta que la aplicación va acorde a la presencia de sus funciones

- Recordemos la famosa regla ILATE que nos ayuda a definir la prioridad de u
- I es aplicado para las funciones inversas
- L es aplicado para aquellas funciones logarítmicas
- A es aplicado a todas esas funciones algebraicas
- T es aplicado a todas las funciones trigonométricas
- E es aplicado a todas las funciones que sean exponenciales

Dicho esto continuemos

Ejemplos:

$$\int \arcsen(x) dx$$

Solución

Por lo cual aplicamos las reglas y sabemos que hay una función inversa con respecto a la función inversa del $\sen(x)$ por lo que proponemos a $u = \arcsen(x) \rightarrow du = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx$ & $dv = dx \rightarrow v = x$

$$x \arcsen(x) - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

Resolviendo la última integral haciendo cambio de variable $w = 1 - x^2 \rightarrow dw = -2x dx$

$$x \arcsen(x) - \int \frac{1}{\sqrt{w}} dw \Leftrightarrow x \arcsen(x) + \frac{1}{2} \sqrt{w} + C$$

Sustituyendo w con su valor de x tenemos:

$$\int \arcsen(x) dx = x \arcsen(x) + \frac{1}{2} \sqrt{1-x^2} + C$$

$$\int t^6 \ln(t) dt$$

Solución

De acuerdo a lo que tenemos aquí y a las reglas sabemos, tendremos lo siguiente $u = \ln(t) \rightarrow du = \frac{1}{t} dt$ & $dv = t^6 dt \rightarrow v = \frac{t^7}{7}$

$$\frac{t^7}{7} \ln(t) - \frac{1}{7} \int t^6 dt$$

Ahora resolviendo la ultima integral tenemos que la resolución es:

$$\int t^6 \ln(t) dt = \frac{t^7}{7} - \frac{t^7}{49} + C$$

$$\int t^n \ln(t) dt: n \in \mathbb{N}$$

Solución

Aplicando la regla ILATE tenemos lo siguiente: $u = \ln(t) \rightarrow du = \frac{1}{t} dt$ & $dv = t^n dt \rightarrow v = \frac{t^{n+1}}{n+1}$, ahora aplicando la regla tenemos:

$$\frac{t^{n+1}}{n+1} \ln(t) - \frac{1}{n+1} \int t^n dt$$

Ahora solo solucionamos la ultima integral:

$$\int t^n \ln(t) dt = \frac{t^{n+1}}{n+1} \ln(t) - \frac{t^{n+1}}{(n+1)^2} + C: \forall n \in \mathbb{N}$$

$$\int e^x \sin(x) dx$$

De esta integral partiremos de dos soluciones distintas ambas llegando al mismo resultado:

Solución 1:

Tomaremos esta integral de forma directa de tal forma que tendremos lo siguiente $u = \sin(x) \rightarrow du = \cos(x) dx$ & $dv = e^x dx \rightarrow v = e^x$, aunado a esto tenemos:

$$e^x \sin(x) - \int e^x \cos(x) dx$$

Volveremos a aplicar la regla de la integral por parte esta vez modificando las letras para hacerlo un poco más explicito $u = a$ & $v = b$, por lo que tendremos es $a = \cos(x) \rightarrow da = -\sin(x) dx$ & $db = e^x dx \rightarrow b = e^x$, ahora continuando el desarrollo de la integral tendremos:

$$e^x \sin(x) - \{e^x \cos(x) + \int e^x \sin(x) dx\}$$

Ahora aplicando distribución y signos tenemos:

$$e^x \sin(x) - e^x \cos(x) - \int e^x \sin(x) dx$$

Como podemos ver esto se trata de la misma integral a la que tenemos originalmente, lo que nos permite concluir que se trata de una integral ciclica, por lo tanto lo que haremos es lo siguiente:

$$\int e^x \sin(x) dx = e^x \sin(x) - e^x \cos(x) - \int e^x \sin(x) dx$$

Algebraicamente haremos que la integral del lado derecho pase del lado izquierdo:

$$2 \int e^x \sin(x) dx = e^x \sin(x) - e^x \cos(x)$$

Ahora por simple algebra:

$$\int e^x \sin(x) dx = \frac{1}{2} \{e^x \sin(x) - e^x \cos(x)\} + C$$

Solución 2:

Veamos a $\sin(x)$ como su representación en el campo de los números complejos con ayuda de la identidad de Euler:

$$\sin(x) = \frac{1}{2i}(e^{ix} - e^{-ix})$$

Para complementar esto veamos igual al $\cos(x)$ en su forma de Euler:

$$\cos(x) = \frac{1}{2}(e^{ix} + e^{-ix})$$

Entonces tendremos:

$$\frac{1}{2i} \int e^x (e^{ix} - e^{-ix}) dx \Leftrightarrow \frac{1}{2i} \left\{ \int e^{x(1+i)} - \int e^{x(1-i)} \right\}$$

Por lo que propondremos el cambio de variable respectivo u y v donde $u = x(1+i)$ y $v = x(1-i)$, entonces sus derivadas con respecto a x son $du = (1+i)dx$ y $dv = (1-i)dx$, entonces:

$$\frac{1}{2i} \left\{ \frac{1}{1+i} e^{x(1+i)} - \frac{1}{1-i} e^{x(1-i)} \right\} + C$$

Ahora aplicaremos el complemento de cada fracción compleja por lo que en el resultado tendremos:

$$\frac{1}{2i} \left\{ \frac{1+i}{2} e^{x(1+i)} - \frac{1-i}{2} e^{x(1-i)} \right\} + C$$

Ahora separando términos del campo \mathbb{R} y \mathbb{C} tendremos:

$$\frac{1}{4i} \left\{ e^{x(1+i)} - e^{x(1-i)} + i(e^{x(1+i)} + e^{x(1-i)}) \right\} + C$$

Separando términos y reordenando:

$$\frac{1}{4i} \left\{ e^{x(1+i)} - e^{x(1-i)} \right\} + \frac{1}{4} \left\{ (e^{x(1+i)} + e^{x(1-i)}) \right\} + C$$

Factorizando todos los valores de e^x tendremos:

$$\frac{e^x}{4i} \{e^{xi} - e^{-xi}\} + \frac{e^x}{4} \{(e^{xi} + e^{-xi})\} + C$$

Ahora aplicando identidad de Euler:

$$\frac{1}{2} e^x \sin(x) + \frac{1}{2} e^x \cos(x) + C$$

Reordenando todo:

$$\frac{1}{2i} \int e^x (e^{ix} - e^{-ix}) dx \Leftrightarrow \frac{1}{2i} \left\{ \int e^{x(1+i)} - \int e^{x(1-i)} \right\} = \frac{1}{2} e^x \{\sin(x) + \cos(x)\} + C$$

$$\int \sin^n(x) dx: \forall n \in \mathbb{N} \geq 2$$

Solución

Reescribiremos la integral como:

$$\int \sin^{n-1}(x) \sin(x) dx$$

Ahora si podremos aplicar las reglas podemos considerar que $\sin^{n-1}(x)$ como un valor exponencial, por lo que propondremos lo siguiente, $u = \sin^{n-1}(x) \rightarrow du = (n-1) \sin^{n-2}(x) \cos(x) dx$ & $dv = \sin(x) dx \rightarrow v = -\cos(x)$, ahora:

$$-\cos(x) \sin^{n-1}(x) + (n-1) \int \sin^{n-2}(x) \cos^2(x) dx$$

Recordemos las identidades trigonométricas de valores que son iguales a 1:

$$1 = \cos^2(x) + \sin^2(x)$$

$$1 = \sec^2(x) - \tan^2(x)$$

Aplicaremos esta identidad en la integral de tal forma que podremos sustituir la integral a dos partes:

$$-\cos(x) \sin^{n-1}(x) + (n-1) \left\{ \int \sin^{n-2}(x) dx - \int \sin^n(x) dx \right\}$$

Aplicando distributividad:

$$\int \sin^n(x) dx = -\cos(x) \sin^{n-1}(x) + (n-1) \int \sin^{n-2}(x) dx - (n-1) \int \sin^n(x) dx$$

Ahora aplicando algebra:

$$n \int \sin^n(x) dx = -\cos(x) \sin^{n-1}(x) + (n-1) \int \sin^{n-2}(x) dx + C$$

De nuevo aplicando algebra:

$$\int \sin^n(x) dx = \frac{1}{n} \left\{ -\cos(x) \sin^{n-1}(x) + (n-1) \int \sin^{n-2}(x) dx \right\} + C: \forall n \in \mathbb{N} \geq 2$$

$$\int \cos^n(x) dx: \forall n \in \mathbb{N} \geq 2$$

Solución:

Ahora ya que tenemos noción de la integral anterior podemos proceder con lo siguiente:

$$\int \cos^{n-1}(x) \cos(x) dx$$

$$u = \cos^{n-1}(x) \rightarrow du = -\cos^{n-2}(x) \sin(x) dx$$

$$dv = \cos(x) dx \rightarrow v = \sin(x)$$

Esto implica:

$$\cos^{n-1}(x) \sin(x) + (n-1) \int \cos^{n-2} \sin^2(x) dx$$

Aplicando igual identidades trigonométrica directamente:

$$\cos^{n-1}(x) \sin(x) + (n-1) \left\{ \int \cos^{n-2}(x) dx - \int \cos^n(x) dx \right\}$$
$$\int \cos^n(x) dx = \cos^{n-1}(x) \sin(x) + (n-1) \int \cos^{n-2}(x) dx - (n-1) \int \cos^n(x) dx$$

Ahora con algebra:

$$n \int \cos^n(x) dx = \cos^{n-1}(x) \sin(x) + (n-1) \int \cos^{n-2}(x) dx + C$$
$$\int \cos^n(x) dx = \frac{1}{n} \left\{ \cos^{n-1}(x) \sin(x) + (n-1) \int \cos^{n-2}(x) dx \right\} + C: \forall n \in \mathbb{N} \geq 2$$

Ejercicios propuestos:

1.

$$\int \ln(t) dt$$

2.

$$\int \cos^3(x) dx$$

3.

$$\int \sin^5(x) dx$$

3.3. Integración trigonométrica

Si bien ya aplicamos integración con funciones trigonométricas es importante también poder saber un par de técnicas con respecto a propiedades de las mismas para que originen un ahorro de tiempo a la hora de resolver diversos ejercicios y/o resolver ecuaciones diferenciales.

3.3.1. Tipo I:

$$\int \sin^n(x) dx; \int \cos^n(x) dx: \forall n \in \mathbb{Z}^+$$

Podemos aplicar algunas propiedades como la propiedad de 1 o en el caso de ser valores de n impar podemos hacer lo siguiente:

$$\sin^2(x) = \frac{1}{2}(1 - \cos(2x))$$

$$\cos^2(x) = \frac{1}{2}(1 + \cos(2x))$$

$$1 = \cos^2(x) + \sin^2(x)$$

$$1 = \sec^2(x) - \tan^2(x)$$

Ejemplos Si n es impar entonces:

$$\int \sin^5(x) dx$$

Solución

Primero sabemos y debemos separar el valor de $\sin^5(x)$ por $\sin^4(x) \sin(x)$

$$\int \sin^4(x) \sin(x) dx$$

Utilizando propiedades:

$$\int (1 - \cos^2(x))^2 \sin(x) dx \Leftrightarrow \int (1 - 2\cos^2(x) + \cos^4(x)) \sin(x) dx$$

$$\int \sin(x) dx - 2 \int \cos^2(x) \sin(x) dx + \int \cos^4(x) \sin(x) dx$$

Resolveremos la integral de los cosenos elevados a un valor n con cambio de variable, resolviendo directamente tendremos:

$$\int \sin^5(x) dx = -\cos(x) + \frac{2\cos^3(x)}{3} - \frac{\cos^5(x)}{5} + C$$

Si n es par, entonces:

$$\int \sin^2(x) dx$$

Solución

Utilizando identidades de la introducción a este tipo integrales, tenemos:

$$\frac{1}{2} \int (1 - \cos(2x)) dx \Leftrightarrow \frac{1}{2} \left\{ \int dx - \int \cos(2x) dx \right\}$$

Resolviendo las integrales

$$\int \sin^2(x) dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin(2x)}{4} + C$$

Ejercicios propuestos:

1.

$$\int \cos^3(x) dx$$

2.

$$\int \sin^4(x) dx$$

3.3.2. Tipo II:

$$\sin^m(x) \cos^n(x) dx$$

Si m o n son \mathbb{Z}^+ y alguno es impar, y el otro exponente es cualquier número, factorizamos $\sin(x)$ o $\cos(x)$ y utilizamos la identidad de 1, para otros casos a continuación se presentan algunas identidades de producto de funciones trigonométricas con factores m y n distintas pero \mathbb{R} o \mathbb{Z} :

$$\sin(mx) \cos(nx) = \frac{1}{2} \{ \sin[(m+n)x] + \sin[(m-n)x] \}$$

$$\sin(mx) \sin(nx) = \frac{1}{2} \{ \cos[(m-n)x] - \cos[(m+n)x] \}$$

$$\cos(mx) \cos(nx) = \frac{1}{2} \{ \cos[(m+n)x] + \cos[(m-n)x] \}$$

Ejemplo

$$\int \sin^3(x) \cos^{-4}(x) dx \Leftrightarrow \int \sin^2(x) \cos^{-4}(x) \sin(x) dx$$

Solución

$$\int (1 - \cos^2(x)) \cos^{-4}(x) \sin(x) dx \Leftrightarrow \int \cos^{-4}(x) \sin(x) dx - \int \cos^{-2}(x) \sin(x) dx$$

Por cambio de variable $u = \cos(x) \rightarrow du = -\sin(x) dx$ y aplicando directamente a resolver la integral tendremos:

$$\int \sin^3(x) \cos^{-4}(x) dx = \frac{\sec^3(x)}{3} - \sec(x) + C$$

Ejercicio propuesto:


1.

$$\int \sin^2(x) \cos^4(x) dx$$

3.4. Integación por sustitución trigonométrica

Para resolver estas integrales es necesario conocer o tomar como medida de apoyo un triángulo rectángulo, el cual nos facilitará en realizar un cambio de variable al momento de realizar una integral.

3.4.1. Caso I:



Donde:

$$a = a, b = x \text{ y } c = \sqrt{a^2 - x^2}$$


Partiendo de esto obtendremos:

$$\sin(\theta) = \frac{x}{a}, \quad x = a \sin(\theta), \quad dx = a \cos(\theta) d\theta$$

Con ello sustituyendo a x tendremos:

$$\sqrt{a^2 - x^2} \Rightarrow \sqrt{a^2 - a^2 \sin^2(\theta)} \Leftrightarrow \sqrt{a^2[1 - \sin^2(\theta)]} \Leftrightarrow \sqrt{a^2 \cos^2(\theta)} \quad \therefore \sqrt{a^2 - x^2} = a \cos(\theta)$$

3.4.2. Caso II:



Donde:

$$a = \sqrt{a^2 + x^2}, b = x \text{ y } c = a$$


Partiendo de esto obtendremos:

$$\tan(\theta) = \frac{x}{a}, \quad x = a \tan(\theta), \quad dx = a \sec^2(\theta) d\theta$$

Con ello sustituyendo a x tendremos:

$$\sqrt{a^2 + x^2} \Rightarrow \sqrt{a^2 + a^2 \tan^2(\theta)} \Leftrightarrow \sqrt{a^2[1 + \tan^2(\theta)]} \Leftrightarrow \sqrt{a^2 \sec^2(\theta)} \quad \therefore \sqrt{a^2 + x^2} = a \sec(\theta)$$

3.4.3. Caso III:



Donde:

$$a = x, b = \sqrt{x^2 - a^2} \text{ \& } c = a$$

Partiendo de esto obtendremos:

$$\sec(\theta) = \frac{x}{a}, \quad x = a \sec(\theta), \quad dx = a \sec(\theta) \tan(\theta) d\theta$$

Con ello sustituyendo a x tendremos:

$$\sqrt{x^2 - a^2} \Rightarrow \sqrt{a^2 \sec^2(\theta) - a^2} \Leftrightarrow \sqrt{a^2 [\sec^2(\theta) - 1]} \Leftrightarrow \sqrt{a^2 \tan^2(\theta)} \quad \therefore \sqrt{x^2 - a^2} = a \tan(\theta)$$

Aplicado ahora en alguna integral tendremos:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9 + x^2}}$$

Solución

De acuerdo con los casos que tenemos podemos aplicar el Caso II en el problema por lo que sustituyendo directamente tendremos $a = 3$ & $x = 3 \tan(\theta)$:

$$\int \frac{3 \sec^2(\theta)}{3 \sec(\theta)} d\theta \Leftrightarrow \int \sec(\theta) d\theta = \ln |\sec(\theta) + \tan(\theta)| + C$$

Finalmente sustituiremos los valores de las identidades trigonométricas con sus respectivos valores de triángulo:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{9 + x^2}} = \ln \left| \frac{\sqrt{9 + x^2}}{3} + \frac{x}{3} \right| + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 26}}$$

Solución

Para abordar este problema a través de sustitución trigonométrica es necesario reducir el polinomio interno de la raíz cuadrada, por lo primero reescribiremos la integral:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 25 + 1}} \Leftrightarrow \int \frac{dx}{\sqrt{(x+1)^2 + 5^2}}$$

Ahora una vez reduciendo esto haremos un cambio de variable el cual será $u = x + 1$ & $du = dx$, reescribiendo la integral tenemos:

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + 5^2}}$$

Con esto podemos aplicar directamente el Caso II, por lo que saltando todo el cambio de variable hacia θ debido al anterior ejemplo tendremos:

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + 5^2}} = \ln |\sec(\theta) + \tan(\theta)| + C$$

Lo cual es:

$$\int \frac{du}{\sqrt{u^2 + 5^2}} = \ln \left| \frac{\sqrt{u^2 + 25}}{5} + \frac{u}{5} \right| + C$$

Sustituyendo el valor de u por su respectivo valor en x :

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + 2x + 26}} = \ln \left| \frac{\sqrt{(x+1)^2 + 25}}{5} + \frac{x+1}{5} \right| + C$$

Ejercicio propuesto:

1.

$$\int \frac{\sqrt{x^2 - 4}}{x} dx$$

4. Ecuaciones Diferenciales

Definición: Se dice que una Ecuación Diferencial (ED) que contiene las derivadas de una o más variables dependientes, con respecto a una o más variables independientes es conocida como una ED.

Nota: Para referirse a ellas, se clasifican a las ED's por:

- Tipo
- Orden
- Linealidad

4.1. Clasificación por Tipo

Si una ED contiene solo derivadas ordinarias de una o más variables independientes, se dice que es una ED Ordinaria (EDO)

Ejemplos:

$$\frac{dy}{dx} + 5y = e^x \quad \frac{d^2y}{dx^2} - \frac{dy}{dx} + 6y = 0 \quad \frac{dx}{dt} + \frac{dy}{dt} = 2x + y$$

Una ED con derivadas parciales de una o más variables dependientes con respecto de dos o más variables independientes se llaman ED Parcial (EDP)

Ejemplos:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= 0; & u &= u(x, y) \\ \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} &= \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - 2 \frac{\partial u}{\partial t}; & u &= u(x, t) \\ \frac{\partial u}{\partial y} &= \frac{\partial u}{\partial x}; & u &= u(y) \text{ \& } u = u(x) \end{aligned}$$

Nota: En todo o la mayor parte del curso las derivadas ordinarias escribiremos con la notación de Leibniz:

$$\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}, \frac{d^3y}{dx^3}, \dots, \frac{d^ny}{dx^n} \Rightarrow y^l, y^{ll}, y^{lll}, y^n$$

Entonces las EDO de los ejemplos quedan como:

$$y^l + 5y = e^x \quad y^{ll} - y^l + 6y = 0 \quad x^l + y^l = 2x + y$$

4.2. Clasificación por Orden

El orden de una ED ya sea Ordinaria o Parcial, se define de acuerdo a la derivada de mayor orden

Ejemplos:

$$\frac{d^2 y}{dx^2} + 5 \left(\frac{dy}{dx} \right)^3 - 4y = e^x$$

Encontrado los datos tendremos:

- $\frac{d^2 y}{dx^2}$ Es una componente diferencial de Orden 2
- $5 \left(\frac{dy}{dx} \right)^3$ Es una componente diferencial de Orden 1

∴ Esta ED es de Orden 2

Nota: En ocasiones las EDO's de 1^{er} Orden se escriben como:

$$y' = f(x, y) \Rightarrow M(x, y)dx + N(x, y)dy = 0;$$

$$N(x, y)dy = -M(x, y)dx; \quad N(x, y) \frac{dy}{dx} = -M(x, y)$$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{M(x, y)}{N(x, y)}$$

4.3. Clasificación por Linealidad

Una EDO de Orden n-esimo es lineal, si $F(x, y, y', y'', y''', \dots, y^n) = 0$ es lineal o $y, y', y'', y''', \dots, y^n$, es decir, una EDO de Orden n es lineal si la podemos escribir como:

$$a_n(x) \frac{d^n y}{dx^n} + \left(a_{n-1}(x) \frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} + \dots + a_2(x) \frac{d^2 y}{dx^2} + a_1(x) \frac{dy}{dx} + a_0 y \right) = g(x) \dots \dots \dots (*)$$

Si vemos la definición de (*) sabemos que es una combinación lineal.

En la combinación lineal observamos que las propiedades y características de una EDO lineal son como:

1. La variable dependiente (y) y todas sus derivadas $y', y'', y''', \dots, y^n$ son de 1^{er} grado, es decir, la potencia de cada término en que interviene la variable y es 1
2. Los coeficientes ($a_0, a_1, a_2, \dots, a_n$ de y, y', y'', \dots, y^n) dependen unicamente de la variable x

Nota: Una EDO no-lineal es simplemente una que no esta representada en combinación lineal, como:

Ejemplo

$$(1 - y)y' + 2y = e^x \quad \frac{d^2 y}{dx^2} + \sin(y) = 0 \quad \frac{d^4 y}{dx^4} + y^2 = 0$$

5. Soluciones

5.1. Solución de una ED

Uno de los objetivos primordiales del curso es resolver o encontrar soluciones de EDO's.

Definición: Cualquier función $\phi(x)$, definida en un intervalo I y con al menos n -derivadas continuas en dicho intervalo de I , que al sustituirse en una EDO de n -ésimo orden reduce a la ED en una identidad, se considera solución de dicha EDO.

Ejemplos:

$$a) \frac{dy}{dx} = xy^{\frac{1}{2}} ; y = \frac{x^4}{16} \quad | \quad b) y^{ll} - 2y^l + y = 0 ; y = xe^x$$

Solución a, b, la cual derivaremos y sustituiremos los valores en las ecuaciones correspondientes, se procedera directamente:

$$\frac{x^3}{4} = x \left(\frac{x^2}{4} \right) \quad | \quad (x+2)e^x - 2[(x+1)e^x] + xe^x = 0$$

Finalmente resolviendo estas ecuaciones algebraicas podemos probar que la ED es correcta en primer instancia.

Nota: Una solución de una ED que es idénticamente a cero en un intervalo I se llama solución trivial (Si $y \equiv 0$)

5.2. Solución explícita e implícita

Definición solución explícita: Se dice que una solución es explícita, si en dicha solución la variable dependiente se expresa únicamente en términos de la variable independiente y constantes

Ejemplos:

$$y(x) = \frac{x^2}{2} + 4 \quad y(x) = 9x^2 + 5x + e^{5x}$$

Definición solución implícita Una relación $G(x, y) = 0$ es una solución implícita de una EDO en un intervalo I , siempre que exista al menos una función $\phi(x)$ que satisfaga tanto a la relación como a la ED en I

Ejemplo: La relación $x^2 + y^2 = 25$ es una solución implícita de la ED

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \quad \text{en } I = (-5, 5)$$

Solución

Derivamos implícitamente a la relación:

$$2x + 2yy^l = 0 \Rightarrow 2yy^l = -2x \Rightarrow y^l = -\frac{2x}{2y} \Rightarrow y^l = -\frac{x}{y}$$

Por otra parte:

$$|y| = \sqrt{25 - x^2} \Rightarrow \phi_1(x) = \sqrt{25 - x^2} \quad \& \quad \phi_2(x) = -\sqrt{25 - x^2}$$