

## **Solução dos Exercícios 2.11 – 2.12**

**Exercício 2.11:** Encontre os valores máximo e mínimo absolutos de  $f$  no intervalo dado.

a)  $f(x) = 3x^2 - 12x + 5, [0,3]$

$$f'(x) = 6x - 12$$


$$6x - 12 = 0$$

$$6x = 12$$

$$x = \frac{12}{6} = 2$$

$$f'(1) = 6 \cdot 1 - 12 = -6 \text{ (decrecente)}$$


$$f'(3) = 6 \cdot 3 - 12 = 6 \text{ (crescente)}$$



$$f(0) = 3 \cdot 0^2 - 12 \cdot 0 + 5 = 5$$

$$f(2) = 3 \cdot 2^2 - 12 \cdot 2 + 5 = -7$$

$$f(3) = 3 \cdot 3^2 - 12 \cdot 3 + 5 = 27 - 36 + 5 = -4$$



Máximo (0, 5); Mínimo (2, -7)

$$b) f(x) = x^3 - 3x + 1, [0,3]$$

$$f'(x) = 3x^2 - 3$$

$$3x^2 - 3 = 0$$

$$x^2 = \frac{3}{3} = 1$$


$$x = \pm\sqrt{1}$$

$$x' = 1 \text{ e } x'' = -1$$

$$f'(-2) = 3(-2)^2 - 3 = 9 \text{ (crescente)}$$

$$f'(0) = 3(0)^2 - 3 = -3 \text{ (descrescente)}$$


$$f'(2) = 3(2)^2 - 3 = 9 \text{ (crescente)}$$



$$f(0) = 0^3 - 3 \cdot 0 + 1 = 1$$

$$f(1) = 1^3 - 3 \cdot 1 + 1 = -1$$

$$f(3) = 3^3 - 3 \cdot 3 + 1 = 27 - 9 + 1 = 19$$



Máximo (3, 19); Mínimo (1, -1)

$$c) f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 5, [-2,3]$$

$$f'(x) = 6x^2 - 6x - 12$$


$$6x^2 - 6x - 12 = 0$$

$$x' = -1 \text{ e } x'' = 2$$

$$f'(-2) = 6(-2)^2 - 6(-2) - 12 = 24 + 12 - 12 = 24 \text{ (crescente)}$$

$$f'(0) = 6(0)^2 - 6(0) - 12 = 0 + 0 - 12 = -12 \text{ (decrecente)}$$

$$f'(3) = 6(3)^2 - 6(3) - 12 = 54 - 18 - 12 = 24 \text{ (crescente)}$$



$$f(-2) = 2(-2)^3 - 3(-2)^2 - 12(-2) + 5$$

$$= -16 - 12 + 24 + 5 = 1$$

$$f(3) = 2(3)^3 - 3(3)^2 - 12(3) + 5$$


$$= 54 - 27 - 36 + 5 = 59 - 63 = -4$$

$$f(-1) = 2(-1)^3 - 3(-1)^2 - 12(-1) + 5$$

$$= -2 - 3 + 12 + 5 = 12$$

$$f(2) = 2(2)^3 - 3(2)^2 - 12(2) + 5$$

$$= 16 - 12 - 24 + 5 = -15$$



Máximo (-1, 12); Mínimo (2, -15)

d)  $f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 5, [-3,5]$

$$f'(x) = 6x^2 - 12x$$


$$6x^2 - 12x = 0$$

$$x' = 0 \text{ e } x'' = 2$$

$$f'(-1) = 6(-1)^2 - 12(-1) = 6 + 12 = 18 \text{ (crescente)}$$

$$f'(1) = 6(1)^2 - 12(1) = 6 - 12 = -6 \text{ (decrecente)}$$


$$f'(3) = 6(3)^2 - 12(3) = 54 - 36 = 18 \text{ (crescente)}$$



$$f(-3) = 2(-3)^3 - 6(-3)^2 + 5 = -54 - 54 + 5 = -103$$

$$f(0) = 2(0)^3 - 6(0)^2 + 5 = 0 + 0 + 5 = 5$$

$$f(5) = 2(5)^3 - 6(5)^2 + 5 = 250 - 150 + 5 = 105$$



Máximo (5, 105); Mínimo (-3, -103)

e)  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 5, [-2, 3]$

$$f'(x) = 3x^2 - 12x$$


$$3x^2 - 12x = 0$$

$$x' = 0 \text{ e } x'' = 4$$

$$f'(-1) = 3(-1)^2 - 12(-1) = 15 \text{ (crescente)}$$

$$f'(1) = 3(1)^2 - 12(1) = -9 \text{ (decrecente)}$$


$$f'(5) = 3(5)^2 - 12(5) = 75 - 60 = 15 \text{ (crescente)}$$



$$f(-2) = (-2)^3 - 6(-2)^2 + 5 = -8 - 24 + 5 = -27$$

$$f(0) = (0)^3 - 6(0)^2 + 5 = 5$$

$$f(3) = (3)^3 - 6(3)^2 + 5 = 27 - 54 + 5 = -22$$



Máximo (0,5); Mínimo (-2,-27)

$$f) f(t) = (t^2 - 4)^3, [-2, 3]$$

$$\begin{aligned} f'(t) &= 3(t^2 - 4)^2 \cdot (2t) = 6t(t^2 - 4)^2 \\ &= 6t((t^2)^2 - 2t^2 \cdot 4 + 4^2) = 6t(t^4 - 8t^2 + 16) \\ &= 6t^5 - 48t^3 + 96t \\ 6t^5 - 48t^3 + 96t &= 0 \end{aligned}$$


$$t' = -2; \quad t'' = 0; \quad t''' = 2$$

$$f'(-3) = 6(-3)((-3)^2 - 4)^2 = -18(9 - 4)^2 = -18(25) = -450 \text{ (decreciente)}$$

$$f'(-1) = 6(-1)((-1)^2 - 4)^2 = -6(1 - 4)^2 = -6(9) = -54 \text{ (decreciente)}$$

$$f'(1) = 6(1)((1)^2 - 4)^2 = 6(1 - 4)^2 = 6(9) = 54 \text{ (crescente)}$$


$$f'(3) = 6(3)((3)^2 - 4)^2 = 18(9 - 4)^2 = 18(25) = 450 \text{ (crescente)}$$



$$f(-2) = ((-2)^2 - 4)^3 = (4 - 4)^3 = 0$$

$$f(0) = ((0)^2 - 4)^3 = (-4)^3 = -64$$

$$f(3) = ((3)^2 - 4)^3 = (9 - 4)^3 = 125$$



Máximo (3,125); Mínimo (0,-64)

$$g) f(x) = x + \frac{1}{x}, [0, 2, 4]$$

$$f'(x) = 1 - \frac{1}{x^2}$$

$$1 - \frac{1}{x^2} = 0$$


$$1 = \frac{1}{x^2}$$

$$x^2 = \frac{1}{1} = 1$$

$$x = \pm 1$$

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{1}{\left(\frac{1}{2}\right)^2} = 1 - \frac{1}{\frac{1}{4}} = 1 - 4 = -3 \text{ (decreciente)}$$


$$f'(2) = 1 - \frac{1}{(2)^2} = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4} \text{ (crescente)}$$



$$f\left(\frac{2}{10}\right) = \frac{2}{10} + \frac{1}{\frac{2}{10}} = \frac{2}{10} + \frac{10}{2} = \frac{2}{10} + \frac{100}{10} = \frac{102}{10} = \frac{51}{5}$$

$$f(1) = 1 + \frac{1}{1} = 2$$

$$f(4) = 1 + \frac{1}{4} = \frac{5}{4}$$



Máximo  $(0, 2, \frac{26}{5})$ ; Mínimo  $(1, 2)$

$$h) f(x) = \frac{x}{x^2 - x + 1}, [0, 3]$$

$$f'(x) = \frac{(x^2 - x + 1)1 - (2x - 1)x}{(x^2 - x + 1)^2}$$

$$= \frac{x^2 - x + 1 - x(2x - 1)}{(x^2 - x + 1)^2} = \frac{x^2 - x + 1 - 2x^2 + x}{(x^2 - x + 1)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-x^2 + 1}{(x^2 - x + 1)^2}$$

$$f'(x) = 0$$

$$\frac{-x^2 + 1}{(x^2 - x + 1)^2} = 0$$

$$-x^2 + 1 = 0$$


$$-x^2 = -1 \quad (-1)$$

$$x^2 = 1$$

$$x = \pm 1$$

$$f'(0) = \frac{-0^2 + 1}{(0^2 - 0 + 1)^2} = \frac{1}{1} = 1 \text{ (crescente)}$$


$$f'(2) = \frac{-(2^2) + 1}{(2^2 - 2 + 1)^2} = -\frac{3}{3^2} = -\frac{1}{3} \text{ (decescente)}$$



$$f(0) = \frac{0}{0^2 - 0 + 1} = 0$$

$$f(1) = \frac{1}{1^2 - 1 + 1} = \frac{1}{1} = 1$$

$$f(3) = \frac{3}{3^2 - 3 + 1} = \frac{3}{7}$$



Máximo (1, 1); Mínimo (0, 0).

i)  $f(t) = t - \sqrt[3]{t}, [-1, 4]$

$$f(t) = t - \left(t^{\frac{1}{3}}\right)$$

$$f'(t) = 1 - \frac{1}{3}t^{-\frac{2}{3}} = 1 - \frac{1}{3t^{\frac{2}{3}}} = 1 - \frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}}$$

$$1 - \frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}} = 0$$

$$1 = \frac{1}{3\sqrt[3]{t^2}}$$

$$\sqrt[3]{t^2} = \frac{1}{3}$$

$$t^2 = \left(\frac{1}{3}\right)^3 = \frac{1}{27}$$

$$t = \pm \sqrt{\frac{1}{27}} = \pm \frac{1}{\sqrt{27}}$$

$$f'\left(\frac{1}{10}\right) = 1 - \frac{1}{3\sqrt[3]{\left(\frac{1}{10}\right)^2}} = 1 - \frac{1}{3\sqrt[3]{\frac{1}{100}}} =$$

$$1 - \frac{1}{3\sqrt[3]{\frac{1}{100}}} = 1 - \frac{1}{3.0,21} = 1 - \frac{1}{0,64} = \frac{-0,35}{0,64} = -0,55 \text{ (decreciente)}$$


$$f'(1) = 1 - \frac{1}{3\sqrt[3]{1^2}} = 1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3} \text{ (crescente)}$$

$$f'\left(-\frac{1}{10}\right) = 1 - \frac{1}{3\sqrt[3]{\left(-\frac{1}{10}\right)^2}} = 1 - \frac{1}{3\sqrt[3]{\frac{1}{100}}} =$$



$$1 - \frac{1}{\sqrt[3]{\frac{1}{100}}} = 1 - \frac{1}{3.0,21} = 1 - \frac{1}{0,64} = \frac{-0,35}{0,64} = -0,55 \text{ (decreciente)}$$

$$f'(-1) = 1 - \frac{1}{\sqrt[3]{-1^2}} = 1 - \frac{1}{-1} = \frac{2}{3} \text{ (crescente)}$$



$$f(-1) = -1 - \sqrt[3]{-1} = -1 + 1 = 0$$

$$f\left(-\frac{1}{\sqrt{27}}\right) = -\frac{1}{\sqrt{27}} - \left(\sqrt[3]{-\frac{1}{\sqrt{27}}}\right) = -\frac{1}{\sqrt{27}} - \left(\frac{\sqrt[3]{-1}}{\sqrt[3]{\sqrt{27}}}\right) = -\frac{1}{\sqrt{27}} - \left(\frac{-1}{3}\right)$$


$$= -\frac{1}{\sqrt{27}} + \frac{1}{3} = \frac{-3 + \sqrt{27}}{3\sqrt{27}} = \frac{2,2}{15,58} = 0,39$$

$$f\left(\frac{1}{\sqrt{27}}\right) = \frac{1}{\sqrt{27}} - \left(\sqrt[3]{\frac{1}{\sqrt{27}}}\right) = \frac{1}{\sqrt{27}} - \left(\frac{\sqrt[3]{1}}{\sqrt[3]{\sqrt{27}}}\right) = \frac{1}{\sqrt{27}} - \left(\frac{1}{3}\right)$$

$$= -\frac{1}{\sqrt{27}} - \frac{1}{3} = \frac{3 - \sqrt{27}}{3\sqrt{27}} = \frac{-2,2}{15,58} = -0,39$$

$$f(1) = 1 - \sqrt[3]{1} = 1 - 1 = 0$$

$$f(4) = 4 - \sqrt[3]{4} = 4 - 1,58 = 2,41$$



Máximo  $(4, 2,41)$ ; Mínimo  $(\frac{1}{\sqrt{27}}, -0,39)$ .

j)  $f(t) = \frac{\sqrt{t}}{1+t^2}, [0,2]$

$$f'(t) = \frac{(1+t^2)\frac{1}{2\sqrt{t}} - (2t)\sqrt{t}}{(1+t^2)^2} = \frac{\frac{1+t^2}{2\sqrt{t}} - 2t\sqrt{t}}{(1+t^2)^2}$$

$$= \frac{\frac{1+t^2-4t^2}{2\sqrt{t}}}{(1+t^2)^2} = \frac{1-3t^2}{2\sqrt{t}(1+t^2)^2}$$

$$\frac{1-3t^2}{2\sqrt{t}(1+t^2)^2} = 0$$

$$1-3t^2 = 0$$

$$1 = 3t^2$$

$$t^2 = \frac{1}{3}$$


$$t = \pm \frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1-3\left(\frac{1}{2}\right)^2}{2\sqrt{\frac{1}{2}}\left(1+\left(\frac{1}{2}\right)^2\right)^2} = \frac{1-3\frac{1}{4}}{2\frac{1}{\sqrt{2}}\left(1+\frac{1}{4}\right)^2} = \frac{1-\frac{3}{4}}{\frac{2}{\sqrt{2}}\left(\frac{5}{4}\right)^2} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{2}{\sqrt{2}}\frac{25}{16}} =$$


$$= \frac{\frac{1}{4}}{\frac{25}{8\sqrt{2}}} = \frac{1}{4} \frac{8\sqrt{2}}{25} = \frac{2\sqrt{2}}{25} = 0,11 \text{ (crescente)}$$

$$f'(2) = \frac{1-3\cdot(2)^2}{2\sqrt{2}(1+(2)^2)^2} = \frac{1-3\cdot 4}{2\sqrt{2}(1+4)^2} = \frac{1-12}{2\cdot\sqrt{2}\cdot 25} = -\frac{11}{50\sqrt{2}}$$

$$= -\frac{11}{50\sqrt{2}} = -0,15 \text{ (decescente)}$$





$$f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\sqrt{\frac{1}{\sqrt{3}}}}{1+\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^2} = \frac{\frac{1}{\sqrt[4]{3}}}{1+\frac{1}{3}} = \frac{\frac{1}{\sqrt[4]{3}}}{\frac{4}{3}} = \frac{1}{\sqrt[4]{3}} \frac{3}{4} = \frac{3}{4\sqrt[4]{3}} = 0,56$$



Máximo  $(\frac{1}{\sqrt{3}}, 0,56)$ ; Mínimo  $(0, 0)$ .

**Exercício 2.12:** Encontrar as dimensões de um cilindro circular reto de maior volume que pode ser inscrito em um cone circular reto com raio de 5 cm e altura de 12 cm.



Observando as proporcionalidades dos triângulos retângulos, podemos afirmar que

$$\frac{12}{h} = \frac{5}{5-x} \Rightarrow 12(5-x) = 5h$$

$$h = \frac{60-12x}{5} = 12\left(\frac{5-x}{5}\right)$$

$A = \pi \cdot r^2$  - Área do círculo

O volume do cilindro será dado por

$$V = A \cdot h = \pi \cdot x^2 \cdot 12\left(\frac{5-x}{5}\right) = \frac{12\pi}{5} (5x^2 - x^3)$$

$$V = \frac{12\pi}{5}(-x^3 + 5x^2)$$

$$V' = \frac{12\pi}{5}(-3x^2 + 10x)$$

$$\frac{12\pi}{5}(-3x^2 + 10x) = 0$$

$$(-3x^2 + 10x) = \frac{0}{\frac{12\pi}{5}}$$

$$(-3x^2 + 10x) = 0$$

$$x' = 0 \text{ e } x'' = \frac{10}{3}$$

Neste caso, o raio que fornecerá o maior volume é  $r = \frac{10}{3}$ .

$$h = 12 \left( \frac{5 - \frac{10}{3}}{5} \right) = 12 \left( \frac{\frac{5}{3}}{5} \right) = 12 \cdot \frac{5}{3} \cdot \frac{1}{5} = 4 \text{ cm}$$

$$A = \pi \cdot \left( \frac{10}{3} \right)^2 = \pi \cdot \frac{100}{9} = 34,09 \text{ cm}^2$$

### Gabarito:

2.11a) Máximo (0, 5) e mínimo (2, -7).

2.11b) Máximo (3, 19) e mínimo (1, -1).

2.11c) Máximo (-1, 12) e mínimo (2, -15).

2.11d) Máximo (5, 105) e mínimo (-3, -103).

2.11e) Máximo (0, 5) e mínimo (-2, -27).

2.11f) Máximo (3, 125) e mínimo (0, -64).

2.11g) Máximo  $(0, 2, \frac{26}{5})$  e mínimo (1, 2).

2.11h) Máximo (1, 1) e mínimo (0, 0).

2.11i) Máximo (4, 2,41) e mínimo  $(\frac{1}{\sqrt{27}}, -0,39)$

2.11j) Máximo  $(\frac{1}{\sqrt{3}}, 5,6)$  e mínimo (0, 0).

2.12)  $raio = \frac{10}{3}$  cm e altura = 4 cm