

- Les calculatrices ne sont pas autorisées.
- Ce devoir est long, il n'est pas fait pour être terminé, mais vous devez donner le meilleur de vous même dans les parties traitées.
- Je vous conseille de bien lire chaque énoncé entièrement avant de vous lancer, de souligner ou de surligner les points ou notations importants.
- La présentation, la lisibilité et la qualité de la rédaction des copies font l'objet d'une appréciation spécifique. En particulier, les résultats doivent être encadrés à la règle.
- Si vous repérez une erreur d'énoncé, vous l'indiquez sur votre copie et expliquez les raisons des initiatives que vous prenez.
- Les problèmes peuvent être traités dans n'importe quel ordre à condition de mentionner clairement leurs numéros.

Problème 1 : Cercles de Chasles d'une ellipse.

On considère le plan \mathbb{R}^2 muni d'un repère orthonormé (O, \vec{i}, \vec{j}) . Pour tout couple (P, Q) de points du plan, PQ désigne la distance entre P et Q . On se donne deux réels strictement positifs a et b tels que $a > b$. On considère alors la partie

$$\mathcal{E} = \left\{ (x, y) \in \mathbb{R}^2 \left| \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \right. \right\}.$$

On pose de plus $c = \sqrt{a^2 - b^2}$, $F = (c, 0)$ et $F' = (-c, 0)$. On admet le résultat suivant : Pour tout point du plan $M = (x, y)$ du plan, M appartient à \mathcal{E} si et seulement si $MF - MF' = -2cx/a$.

1. Montrer que pour tout point du plan $M = (x, y)$ d'affixe $z = x + iy$, M appartient à \mathcal{E} si et seulement si $MF + MF' = 2a$.
2. Soit $M = (x, y)$ un point de \mathcal{E} d'affixe $z = x + iy$. Expliquer via un théorème du cours pourquoi il existe un point M' d'affixe $z' = x' + iy'$ qui vérifie $z'^2 + z^2 = c^2$.
On fixe M un point de \mathcal{E} et un tel point M' dans ce qui suit jusqu'à la question 8 incluse.
3. Montrer que $OM'^2 = MF \times MF'$.
4. Montrer alors que la bissectrice intérieure des demi-droites $[MF)$ et $[MF')$ est perpendiculaire à la droite (OM') .
5. Montrer que :

$$\begin{aligned} |z - c|^2 + |z + c|^2 &= 2(|z|^2 + |c|^2) \\ (|z - c| + |z + c|)^2 &= 2(|z|^2 + |z'|^2 + |c|^2) \\ MF + MF' &= M'F + M'F'. \end{aligned}$$

En déduire que le point M' appartient à l'ensemble \mathcal{E} .

6. Déduire des deux questions précédentes une construction géométrique du point M' .
7. Soient les points N et N' d'affixes respectifs, $n = z + iz'$ et $n' = z - iz'$. Montrer que

$$nn' = c^2 ; |z - c| + |z + c| = |n| + |n'|.$$

En déduire que : $MF + MF' = ON + ON'$.

8. Démontrer enfin les relations :

$$\begin{aligned}xy + x'y' &= 0 \\x^2 + x'^2 &= a^2 \\y^2 + y'^2 &= b^2.\end{aligned}$$

9. Exprimer alors ON et ON' en fonction de a et b . En déduire que l'ensemble des points décrits par N et N' lorsque M décrit l'ensemble \mathcal{E} forme deux cercles que l'on précisera.
10. La dernière page de l'énoncé comporte une figure avec la partie \mathcal{E} dans le cas $a = 5$ et $b = 4$ ainsi qu'un point M de \mathcal{E} . Compléter cette figure en faisant apparaître les points F, F' , les demi-droites $[MF)$ et $[MF')$ et leur bissectrice intérieure, un point M' , la droite (OM') , les points N, N' ainsi que les deux cercles précédemment déterminés. Joindre cette feuille à votre copie.

Problème 2 : Transformations de Möbius.

On pose $\widehat{\mathbb{C}} = \mathbb{C} \cup \{\omega\}$ avec $\omega \notin \mathbb{C}$, (aucune autre propriété n'est supposée sur l'objet ω). On rappelle qu'un point fixe d'une application $f : \widehat{\mathbb{C}} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ est un élément w de $\widehat{\mathbb{C}}$ tel que $f(w) = w$. Une application $g : \widehat{\mathbb{C}} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ est dite involutive lorsque $g \circ g = \text{Id}_{\widehat{\mathbb{C}}}$ (l'identité de $\widehat{\mathbb{C}}$).

1. Composition d'homographies

- (a) On se donne $\alpha \in \mathbb{C}^*$ et $\beta \in \mathbb{C}$. L'application $s : \widehat{\mathbb{C}} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ définie par

$$s(\omega) = \omega \quad \text{et} \quad \forall z \in \mathbb{C}, s(z) = \alpha z + \beta$$

est appelée encore une similitude. Montrer que s est une bijection. Donner sa réciproque.

- (b) On se donne des complexes a, b, c, d tels que $ad - bc \neq 0$ et $c \neq 0$. L'application $h : \widehat{\mathbb{C}} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ définie par

$$h(\omega) = \frac{a}{c}, \quad h\left(-\frac{d}{c}\right) = \omega, \quad \text{et} \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \left\{-\frac{d}{c}\right\}, h(z) = \frac{az + b}{cz + d}$$

est appelée homographie non dégénérée. Montrer que h est une bijection et donner son application réciproque.

- (c) On appelle homographie une application qui est soit du type s soit du type h . Montrer que la composée de deux homographies est encore une homographie. Donner la formule correspondant à la composée de deux homographies.
- (d) À quelle condition nécessaire et suffisante une homographie est-elle involutive ?
- (e) Montrer qu'une homographie différente de l'identité possède soit un, soit deux points fixes (on ne cherchera pas à déterminer ces points fixes).
- (f) On suppose que h est une homographie non dégénérée et possède deux points fixes distincts w_1 et w_2 . On définit alors l'application $\varphi : \widehat{\mathbb{C}} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ via

$$\varphi(\omega) = 1, \quad \varphi(w_1) = \omega, \quad \text{et} \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{w_1\}, \varphi(z) = \frac{z - w_2}{z - w_1}.$$

Pourquoi φ est-elle bijective ? Que vaut $\psi = \varphi \circ h \circ \varphi^{-1}$? Quels sont ses points fixes ?

- (g) On suppose que h est une homographie non dégénérée et ne possède qu'un seul point fixe w_0 . Dans ce deuxième cas, on définit l'application $\varphi : \widehat{\mathbb{C}} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ via

$$\varphi(\omega) = 0, \quad \varphi(w_0) = \omega \quad \text{et} \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{w_0\}, \varphi(z) = \frac{1}{z - w_0}.$$

Dans ce cas, que vaut $\psi = \varphi \circ h \circ \varphi^{-1}$? Quels sont ses points fixes ?

2. Images de cycles par une homographie. On appelle cycle soit un cercle soit une droite complétée par le point ω . On admet que par trois éléments z_1, z_2, z_3 distincts de $\widehat{\mathbb{C}}$ passe un unique cycle.

- (a) Montrer qu'un point z_4 appartient au cycle déterminé par trois points distincts z_1, z_2, z_3 si et seulement si

$$\Phi = \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1} \div \frac{z_4 - z_2}{z_4 - z_1} \in \mathbb{R} \cup \{\omega\}$$

- (b) Soit f une homographie et $(z_i)_{1 \leq i \leq 4}$ une famille de quatre éléments de $\widehat{\mathbb{C}}$. On pose $Z_i = f(z_i)$ pour tout entier $i \in \llbracket 1, 4 \rrbracket$. Montrer que :

$$\frac{Z_3 - Z_2}{Z_3 - Z_1} \div \frac{Z_4 - Z_2}{Z_4 - Z_1} = \frac{z_3 - z_2}{z_3 - z_1} \div \frac{z_4 - z_2}{z_4 - z_1}$$

En déduire que l'image d'un cycle par une homographie est encore un cycle.

- (c) On considère l'homographie non dégénérée $h : \widehat{\mathbb{C}} \rightarrow \widehat{\mathbb{C}}$ définie par

$$h(\omega) = 3, \quad h(-3) = \omega, \quad \text{et} \quad \forall z \in \mathbb{C} \setminus \{-3\}, h(z) = \frac{3z - 3}{z + 3}$$

ainsi que le cercle \mathcal{C} de centre O et de rayon 1. Quelles sont les images directes successives de \mathcal{C} par h , i.e les parties $h(\mathcal{C}), h(h(\mathcal{C})), h(h(h(\mathcal{C}))), \dots$?

3. Homographies laissant stable une partie du plan

- (a) On note $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C}, |z| = 1\}$ le cercle de centre O et de rayon 1 et on considère une homographie f telle que $f(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$. On note a, b, c, d des complexes tels que $ad - bc \neq 0$ et $\forall z \in \mathbb{C} \setminus \{-d/c\}, f(z) = (az + b)/(cz + d)$.

- i. Montrer que

$$\forall t \in \mathbb{R}, |a|^2 + |b|^2 + 2\Re(\bar{a}be^{-it}) = |c|^2 + |d|^2 + 2\Re(\bar{c}de^{-it})$$

- ii. En déduire que $|a|^2 + |b|^2 = |c|^2 + |d|^2$ et $\bar{a}b = \bar{c}d$.

- iii. Dans le cas $a = 0$, qu'en déduire sur f ?

- iv. Dans le cas a non nul, démontrer que $(|a|^2 - |c|^2)(|a|^2 - |d|^2) = 0$

- v. Toujours dans le cas a non nul, montrer que $|a| = |d|$. Que dire alors de f ?

- (b) A quelle condition nécessaire et suffisante une homographie f vérifie-t-elle $f(\mathbb{U}) = \mathbb{U}$?

★ ★ ★ ★ ★

