

- Les calculatrices ne sont pas autorisées.
- Ce devoir est long, il n'est pas fait pour être terminé, mais vous devez donner le meilleur de vous-mêmes dans les parties traitées.
- Je vous conseille de bien lire chaque énoncé entièrement avant de vous lancer, de souligner ou de surligner les points ou notations importants.
- La présentation, la lisibilité et la qualité de la rédaction des copies font l'objet d'une appréciation spécifique. En particulier, les résultats doivent être encadrés à la règle.
- Si vous repérez une erreur d'énoncé, vous l'indiquez sur votre copie et expliquez les raisons des initiatives que vous prenez.
- Les exercices et le problème peuvent être traités dans l'ordre de votre choix, à condition d'être bien balisés dans votre copie.

Exercice 1 - Une suite récurrente

Soit n un entier naturel non nul. On cherche à déterminer l'ensemble des réels $\lambda \in]0, 4[$ tels qu'il existe un $n+2$ -uplet réel non nul $(x_k)_{0 \leq k \leq n+1}$ vérifiant

$$x_0 = 0, \quad x_{n+1} = 0 \quad \text{et} \quad \forall k \in \llbracket 1, n \rrbracket, x_{k-1} + (\lambda - 2)x_k + x_{k+1} = 0.$$

Dans ce qui suit, on fixe un tel λ .

1. Justifier qu'il existe un unique réel $\theta \in]0, \pi[$ tel que $\lambda = 2(1 - \cos(\theta))$.
2. Soit $(x_k)_{0 \leq k \leq n+1}$ un $n+2$ -uplet réel non nul qui vérifie les conditions ci-dessus. Montrer qu'alors

$$\exists (a, b) \in \mathbb{R}^2, \forall k \in \llbracket 0, n+1 \rrbracket, x_k = a \cos(k\theta) + b \sin(k\theta)$$

3. Démontrer alors l'existence d'un entier j dans $\llbracket 1, n \rrbracket$ tel que $\theta = \frac{j\pi}{n+1}$. Montrer alors

$$\forall k \in \llbracket 0, n+1 \rrbracket, x_k = \sin\left(\frac{jk\pi}{n+1}\right)$$

4. Etablir que l'ensemble des solutions au problème posé est

$$\left\{ 4 \sin^2\left(\frac{j\pi}{2(n+1)}\right) \mid j \in \llbracket 1, n \rrbracket \right\}.$$

Exercice 2 - Suites sous-additives

On considère une suite u de réels positifs qui vérifie la propriété suivante (dite de sous-additivité) :

$$\forall (n, p) \in \mathbb{N}^2, u_{n+p} \leq u_n + u_p$$

L'objectif de cet exercice est de démontrer que la suite $(u_n/n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente.

1. On note $\alpha = \inf_{n \geq 1} \frac{u_n}{n}$. Montrer que α est un réel positif.
2. Soit $\varepsilon > 0$. Justifier qu'il existe un entier naturel non nul p tel que

$$\alpha < \frac{u_p}{p} \leq \alpha + \frac{1}{2}\varepsilon$$

3. Soit n un entier naturel non nul. On note $n = kp + r$ avec $0 \leq r < p$ la division euclidienne de n par p . Montrer que $u_n \leq ku_p + u_r$.
4. En déduire

$$\frac{u_n}{n} \leq \frac{u_p}{p} + \frac{\max(u_0, \dots, u_{p-1})}{n}$$

5. En déduire l'existence d'un rang N non nul tel que

$$\forall n \geq N, \frac{u_n}{n} \leq \alpha + \varepsilon$$

6. Conclure.

7. On considère un jeu équilibré. On y joue autant de fois que l'on veut, chaque tentative étant indépendante des autres. Pour tout entier non nul n , on note X_n le gain à l'étape n . Soit x un réel positif, on étudie la probabilité que le gain moyen au bout de n étapes soit plus grand que x , i.e $p_n = P\left(\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \geq x\right)$. Montrer que la suite $(p_n^{1/n})_{n \in \mathbb{N}^*}$ est convergente.

Problème - Autour de la moyenne arithmético-géométrique

Soit a et b deux réels positifs. On définit $m_a(a, b) = \frac{a+b}{2}$ la moyenne arithmétique de a et b , et $m_g(a, b) = \sqrt{ab}$ la moyenne géométrique de a et b .

Question préliminaire : Comparaison des moyennes arithmétique et géométrique : Montrer que pour tout couple (a, b) de réels positifs, $m_g(a, b) \leq m_a(a, b)$.

Partie I - Définition de la moyenne arithmético-géométrique

Soit $(a, b) \in \mathbb{R}_+^2$. On définit deux suites $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par les relations :

$$\begin{cases} a_0 = a, \\ b_0 = b \end{cases}, \text{ et } \forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} = m_a(a_n, b_n) \\ b_{n+1} = \sqrt{a_n b_n} = m_g(a_n, b_n) \end{cases}$$

1. Montrer que $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ sont convergentes. On note α et β leur limite respective.
2. Montrer que $\alpha = \beta$.

On appelle moyenne arithmético-géométrique de a et b la valeur de cette limite commune, et on la note $M(a, b)$.

3. Comparer $M(a, b)$, $m_a(a, b)$ et $m_g(a, b)$.

Partie II - Expression intégrale de la moyenne arithmético-géométrique

On pose, pour tout $x \in [0, 1[$, et pour tout $(\lambda, \mu) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$:

$$I(x) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\sqrt{1 - x^2 \sin^2 t}} \quad \text{et} \quad J(\lambda, \mu) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dt}{\sqrt{\lambda^2 \cos^2(t) + \mu^2 \sin^2(t)}}.$$

1. Montrer que pour tout $x \in [0, 1[$, $(1+x)I(x) = I\left(\frac{2\sqrt{x}}{1+x}\right)$.

Indication : on pourra effectuer le changement de variable $u = \text{Arcsin}\left(\frac{(1+x)\sin(t)}{1+x\sin^2(t)}\right)$

2. En se ramenant à l'intégrale I , montrer que pour tout $x \in]0, 1]$, $J(1, x) = J\left(\frac{1+x}{2}, \sqrt{x}\right)$.
3. Soit a et b deux réels strictement positifs tels que $a \geq b$, et $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ les suites définies en début de partie I. Montrer que $(J(a_n, b_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est constante.
4. Soit $\varepsilon > 0$ tel que $\varepsilon < M(a, b)$. Justifier l'existence de $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $n \geq N$,

$$\frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{M(a, b) + \varepsilon} \leq J(a_n, b_n) \leq \frac{\pi}{2} \cdot \frac{1}{M(a, b) - \varepsilon}.$$

5. En déduire une expression de $M(a, b)$ en fonction de $J(a, b)$.

Partie III - Une variante de la moyenne arithmético-géométrique

Soit toujours $(a, b) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$. On définit cette fois $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\begin{cases} a_0 = a \\ b_0 = b \end{cases} \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \begin{cases} a_{n+1} = \frac{a_n + b_n}{2} \\ b_{n+1} = \sqrt{a_{n+1} b_n} \end{cases}$$

1. En étudiant leur monotonie, montrer que (a_n) et (b_n) convergent vers une limite commune (on pourra distinguer les cas $a \leq b$ et $b \leq a$)
2. Soit α un réel de $]0, \frac{\pi}{2}[$, et pour tout $n \in \mathbb{N}$

$$B_n = \prod_{k=1}^n \cos\left(\frac{\alpha}{2^k}\right).$$

Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $B_n = \frac{1}{2^n} \frac{\sin(\alpha)}{\sin(\frac{\alpha}{2^n})}$

3. On suppose que $a \leq b$, et $\alpha = \text{Arccos}\left(\frac{a}{b}\right)$. Montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \begin{cases} \frac{b \cdot \sin(\alpha)}{\alpha} & \text{si } \alpha \neq 0 \\ b & \text{si } \alpha = 0 \end{cases}$$

4. On suppose que $a \geq b$. Montrer l'existence d'un unique réel α tel que $a = \text{ch}(\alpha)b$, et montrer que

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = \begin{cases} \frac{b \cdot \text{sh}(\alpha)}{\alpha} & \text{si } \alpha \neq 0 \\ b & \text{si } \alpha = 0 \end{cases}$$