

## Sprawozdanie 3

Pewien student rozwiązując test jednokrotnego wyboru, w którym każdemu pytaniu przyporządkowano pięć odpowiedzi (w tym dokładnie jedną prawidłową), zna poprawne odpowiedzi lub zgaduje. Niech prawdopodobieństwo tego, że zna poprawną odpowiedź na dane pytanie wynosi  $\frac{1}{2}$ . Czyli na połowę pytań odpowiada „strzelając”. Ponieważ jest pięć odpowiedzi do wyboru, szansa, że odgadnie prawidłową odpowiedź wynosi  $\frac{1}{5}$ .

Jakie jest prawdopodobieństwo warunkowe tego, że student znał odpowiedź na dane pytanie, jeśli nie popełnił w tym pytaniu błędu?

Adrian Rupala

19 maja 2018

## Spis treści

1	Teoria	1
2	Rozwiązanie	1
3	Odpowiedź	2

## 1. Teoria

Celem zadania jest obliczenie prawdopodobieństwa warunkowego. Twierdzenie Bayesa jest bezpośrednio związane z obliczaniem prawdopodobieństwa warunkowego i ma ono na celu jego korygowanie na podstawie uzyskanych później informacji o zachodzących zdarzeniach. W tym zadaniu mamy również do czynienia z dwoma zdarzeniami zachodzącymi po sobie. Pierwsze z nich to prawidłowa odpowiedź na pytanie, kolejne to niepełnienie błędu przez ucznia.

W podstawowej formie twierdzenie Bayesa mówi, że:

$$P(A_i|B) = \frac{P(B|A_i)P(A_i)}{P(B)}, \text{ gdzie: } P(B) = \sum_{i \in J} P(B|A_j) \cdot P(A_j)$$

Kiedy  $A$  i  $B$  są zdarzeniami oraz  $P(B) > 0$ , przy czym:

- $P(A|B)$  oznacza prawdopodobieństwo warunkowe (prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia  $A$  o ile zajdzie zdarzenie  $B$ ).
- $P(B|A)$  oznacza prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia  $B$ , o ile zajdzie zdarzenie  $A$ .

## 2. Rozwiązanie

Z treści zadania można odczytać następujące dane:

- $A_1$  - uczeń zna odpowiedź,
- $A_2$  - uczeń nie zna odpowiedzi,
- $B$  - uczeń nie popełnił błędu.

Szukaną przez nas wartością jest prawdopodobieństwo zakładające, że uczeń zna odpowiedź, oraz, że uczeń nie popełnił błędu  $P(A_1|B)$ , następnie podstawiając do wzoru Bayesa otrzymujemy równanie:

$$P(A_1|B) = \frac{P(B|A_1) \cdot P(A_1)}{P(A_1) \cdot P(B|A_1) + P(A_2) \cdot P(B|A_2)}$$

Z treści zadania wynika, że

- $P(A_1) = P(A_2) = \frac{1}{2}$ ,
- $P(B|A_1) = 1$ ,
- $P(B|A_2) = \frac{1}{5}$ .

Następnie podstawiając wartości do wzoru można otrzymać następujące równanie:

$$P(A_1|B) = \frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}}{\frac{1}{2} \cdot 1 + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{5}}$$

Upraszczając równanie:

$$P(A_1|B) = \frac{\frac{1}{4}}{2(\frac{\frac{1}{2}}{2} + \frac{\frac{1}{2}}{5})} \Rightarrow P(A_1|B) = \frac{1}{2(\frac{1}{10} + \frac{1}{2})}$$

Następnie można sprowadzić ułamki w mianowniku do wspólnego mianownika:

$$P(A_1|B) = \frac{\frac{1}{4}}{2 \cdot \frac{5+1}{10}} \Rightarrow P(A_1|B) = \frac{\frac{1}{4}}{2 \cdot \frac{6}{10}}$$

Kolejnym krokiem jest przeniesienie dwójki do licznika oraz uproszczenie postaci ułamka znajdującego się w mianowniku:

$$P(A_1|B) = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{6}{5}}$$

Mnożąc licznik przez odwrotność mianownika, otrzymamy równanie postaci:

$$P(A_1|B) = \frac{5}{2 \cdot 3} \Rightarrow P(A_1|B) = \frac{5}{6}$$

### 3. Odpowiedź

Prawdopodobieństwo warunkowe tego, że student znał odpowiedź na pytanie, jeśli nie popełnił błędu, wynosi  $\frac{5}{6}$ .