

4.2 数学期望的性质

° 设随机向量 $\vec{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ 有: 1) $\vec{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, $d\vec{x} = dx_1 dx_2 \dots dx_n$ 若有,

$$E|g(\vec{x})| = \int_{\mathbb{R}^n} |g(\vec{x})| f(\vec{x}) d\vec{x} < \infty, \text{ 则 } g(\vec{X}) \text{ 有数学期望}$$

$$2) g(\vec{X}) \text{ 数学期望 } E[g(\vec{X})] = \int_{\mathbb{R}^n} g(\vec{x}) f(\vec{x}) d\vec{x}$$

离散型情况: $E|g(\vec{X})| = \sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} |g(X(j_1, j_2, \dots, j_n))| p_{j_1, j_2, \dots, j_n} < \infty$ 时 $Eg(\vec{X})$ 数学期望 $E[g(\vec{X})] = \dots$

— 注意那个 $E|g(\vec{X})|$ 的条件, 和数学分析的内容有关 (暂时不会)

在不引起混淆情况下, $E(X)$ 的括号可省略.

X 的数学期望存在的充要条件是 $E|X| < \infty$

° 设 $E|X_j| < \infty$ ($1 \leq j \leq n$), $C_0 \sim C_n$ 为常数, 则 1) 线性组合 $Y = C_0 + C_1 X_1 + \dots + C_n X_n$ 数学期望存在,

$$EY = C_0 + C_1 EX_1 + \dots + C_n EX_n$$

2) 若 $\{X_j\}$ 相互独立, $Z = X_1 \cdot X_2 \dots X_n$ 数学期望存在

$$EZ = EX_1 \cdot EX_2 \dots EX_n$$

值得关注的是线性组合并不要求互相独立, 乘法组合要求相互独立.

线性组合不要求独立是线性的性质 做题时非常有用

例 4.2.9: 技巧 使用示性函数和数学期望证明概率公式

示性函数避开了乘积分解需要独立性的问题

4.2.10: 使用联合分布函数的右连续更方便

° m 为正整数, 若 $E|X|^m < \infty$, 则称 EX^m 为 X 的 m 阶原点矩, 称 $E(X - EX)^m$ 为 X 的 m 阶中心矩

当 $m \geq 2$ 时 原点矩、中心矩统称为高阶矩

习 4.2.3: 将 $|X|^m$ 视为新的随机变量.

形式上的变量替换有助于看清.

4.3 随机变量的方差

若 X 有数学期望 $\mu = EX$, 则称 $E(X-\mu)^2$ 为 X 的方差, 记作 $\text{Var}(X)$ 或 σ^2

当 $\text{Var}(X) < \infty$ 时, 称 X 的方差有限. 称 $\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)}$ 为 X 的标准差

常见概率分布的方差:

(1) 伯努利分布: $X \sim \text{Bino}(1, p)$, $\text{Var}(X) = p(1-p)$

(2) 二项分布: $X \sim \text{Bino}(n, p)$, $\text{Var}(X) = np(1-p)$

(3) 泊松分布: $X \sim \text{Pois}(\lambda)$, $\text{Var}(X) = \lambda$

(4) 几何分布: $\text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}$

(5) 均匀分布: $X \sim \text{Unif}(a, b)$, $\text{Var}(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

(6) 指数分布: $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, $\text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

(7) 正态分布: $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $\text{Var}(X) = \sigma^2$ (需要用到一个目前还不会的积分)

(8) F 分布: $X \sim F(\alpha, \beta)$, $\text{Var}(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}$

方差的性质:

(1) $\text{Var}(a+bX) = b^2 \text{Var}(X)$

(2) $\text{Var}(X) = E(X-\mu)^2 < E(X-c)^2$ (只要 $c \neq \mu$)

(3) $\text{Var}\left(\sum_{j=1}^n X_j\right) = \sum_{j=1}^n \sum_{j'=1}^n (E(X_j X_{j'}) - \mu_j \mu_{j'})$

(4) 当 X_1, X_2, \dots, X_n 相互独立, $\text{Var}\left(\sum_{j=1}^n X_j\right) = \sum_{j=1}^n \text{Var}(X_j)$ 很好用也很常用的结论.

设 $\sigma^2 = \text{Var}(X) < \infty$ 则称 $Y = \frac{X-EX}{\sigma}$ 为 X 的标准分.

此时有, $EY = 0$, $\text{Var}(Y) = 1$ 当 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 时有 $Y \sim N(0, 1)$

例 4.3.3 设 X_1, X_2, \dots, X_n 相互独立, 有共同的方差 $\sigma^2 < \infty$ 则 $\text{Var}\left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j\right) = \frac{\sigma^2}{n}$

本结论在统计推断时用处极大 (比如多次测量取平均来减小误差)

例 4.3.4, 4.3.5. 一堆项之和的方差只与两两关联有关