

# ACARIZAX® – Willkommen zu Hause

ACARIZAX®



## SICHERHEIT

ACARIZAX® hat ein günstiges Sicherheitsprofil<sup>2,4</sup>.

**Sogar Patienten mit nicht gut kontrolliertem Asthma können jetzt behandelt werden<sup>1</sup>.**



## WIRKSAMKEIT


Nachgewiesene Wirksamkeit im **weltweit größten Studienprogramm** zur Milben AIT – für die oberen und unteren Atemwege<sup>1,2,3,4</sup>.



## EINFACHHEIT

Einfache Anwendung ohne Aufdosierung – **täglich eine Lyo-Tablette**, die für die Einnahme zu Hause geeignet ist. 1. Tablette i.d. Praxis<sup>1</sup>.

## Täglich eine Tablette



Bei Hausstaubmilben-Allergie (gemäß Anwendungsgebieten)



## Einfach in der Anwendung

- Therapiestart **ohne Aufdosierung**
- 1. Tablette in der Praxis, danach **1x täglich zu Hause**
- Für Erwachsene zwischen 18–65 Jahren
- ACARIZAX® auch bei **β-Blocker Therapie** oder **Lactose-Intoleranz**
- **1 Kontakt pro Quartal** bei der 90er Packung

Die Lyo-Tablette  
mit trockenen Fingern  
aus der Verpackung nehmen.

Unter die Zunge legen.  
Dort löst sie sich sekunden-  
schnell auf. Danach 5 Minuten  
nichts essen oder trinken.

Asthmarelevante  
Kontraindikationen<sup>1</sup>:

- Patienten mit einem FEV1 < 70 % des Vorhersagewertes (nach adäquater pharmakologischer Therapie) bei Beginn der Behandlung.
- Patienten, die in den letzten 3 Monaten eine schwere Asthma-Exazerbation hatten.
- Bei Patienten mit Asthma, die eine akute Infektion des Respirationstraktes haben, soll der Beginn der Behandlung mit ACARIZAX® verschoben werden, bis die Infektion abgeklungen ist.

### ACARIZAX®

Packungs- größen	PZN
30er Packung	10946735
90er Packung	10946741

**Referenzen:** 1. Fachinformation ACARIZAX® 12 SQ HDM Lyophilisat zum Einnehmen. ALK Abellö Arzneimittel GmbH, Oktober 2015. 2. Demoly P et al., J Allergy Clin Immunol 2016 Feb;137(2):444–451. 3. Nolte et al., J Allergy Clin Immunol 2015 June;135(6):1494–1501.e6. 4. Virchow et al., JAMA 2016;315(16):1715–1725.

**ACARIZAX®. Zusammensetzung:** Standardisiertes Allergenpräparat aus Hausstaubmilben (Dermatophagoides pteronyssinus und Dermatophagoides farinae) zur Allergie-Immuntherapie (spezifischen Immuntherapie, Allergie-Impfung). Eine Lyo-Tablette (Lyophilisat zum Einnehmen) enthält 12 SQ-HDM. **Sonstige Bestandteile:** Gelatine (aus Fisch gewonnen), Mannitol, Natriumhydroxid. **Anwendungsgebiete:** ACARIZAX® ist indiziert bei erwachsenen Patienten (18–65 Jahre), bei denen auf Basis von Anamnese und Nachweis einer Sensibilisierung (Prick-Test und/oder spezifisches IgE) eine Hausstaubmilbenallergie diagnostiziert wurde, wenn mindestens eine der folgenden Bedingungen besteht: Hausstaubmilbeninduzierte anhaltende mittelschwere bis schwere allergische Rhinitis trotz Verwendung symptomlindernder Medikamente und/oder Hausstaubmilbeninduziertes allergisches Asthma, welches mit inhalativen Kortikosteroiden nicht gut kontrolliert ist und welches mit milder bis schwerer allergischer Rhinitis auf Hausstaubmilben assoziiert ist. **Gegenanzeigen:** Überempfindlichkeit gegen einen der sonstigen Bestandteile. Patienten mit einem FEV1 < 70 % des Vorhersagewertes (nach adäquater pharmakologischer Therapie) bei Beginn der Behandlung. Patienten, die in den letzten 3 Monaten eine schwere Asthma-Exazerbation hatten. Bei Patienten mit Asthma, die eine akute Infektion des Respirationstraktes haben, soll der Beginn der Behandlung verschoben wer-

den, bis die Infektion abgeklungen ist. Patienten mit aktiven oder schlecht kontrollierten Autoimmunerkrankungen, Immundefekten, Immunschwäche, Immunsuppression oder bösartigen Tumorerkrankungen mit aktuellem Krankheitswert. Patienten mit akuter schwerer Entzündung in der Mundhöhle oder Wunden im Mund. **Nebenwirkungen:** Rhinitis, Juckreiz Augen, Bschw. Mund-Rachen (z. B. Schmerzen, Entzündung, Schwellung, Bläschen oder Ulzeration, Missempfindungen, Trockenheit, Juckreiz, Zungenbeschwerden, Störung der Speicheldrüsen), Reizung oder Schwellungsgefühl Hals, Kehlkopfbeschw., Laryngitis, Beschwerden im Brustraum, Infekt. d Atemw., Magen-Darm Beschw., orale Parästhesie, Pruritus, Juckr. Ohren, Unwohlsein, Müdigkeit, Schwindel, Dysgeusie, Fremdkörpergefühl. **Packungsgrößen:** 30 u. 90 Lyo-Tabletten. **Verschreibungspflichtig!** Stand: Oktober 2015. ALK-Abellö Arzneimittel GmbH, Griegstraße 75 (Haus 25), 22763 Hamburg. [www.alk.de](http://www.alk.de)

