
ALK start SQ® -Konventionelles Schema





Bestellinformationen



Flasche A Flasche B 300 SQ-E/ml 10.000 SQ-E/ml

Erhältliche Packungsgrößen

Behandlungsset 1	A+B+B+B
Behandlungsset 2	A+B
Einzel-Flasche	В
Doppel-Flasche	B+B



	1x Flasche A 3,5 ml	Behandlungsset 2 1x Flasche A 3,5 ml 1x Flasche B 3,5 ml		Doppel-Flasche 2x Flasche B 3,5 ml
Birke	PZN 11691645	PZN 12381987	PZN 12381993	PZN 11691674
Frühblüher- mischung	PZN 11691639	PZN 12381964	PZN 12381970	PZN 11691674
Gräsermischung & Roggen	PZN 11691651	PZN 12381941	PZN 12381958	PZN 11691680

ALK start SQ®. Zusammensetzung: ALK start SQ®-Präparate zur subkutanen Injektion enthalten gereinigte Pollenallergene in natürlicher Form gebunden an Aluminiumhydroxid. Der Allergengehalt ist immunchemisch und -biologisch standardisiert und wird in SQ-Einheiten angegeben, die mit dem Gehalt von Majorallergenen und der Gesamtallergenaktivität korrelieren. Die verwendeten Standardisierungsverfahren gewährleisten eine gleichförmige Zusammensetzung von Charge zu Charge. Weitere Bestandteile: Aluminiumhydroxid, Natriumchlorid, Natriumhydrogencarbonat, Phenol, Wasser für Injektionszwecke. **Anwendungsgebiete:** Kausale Behandlung (spezifische Immuntherapie) allergischer Erkrankungen vom Soforttyp (Typ-I-Allergien): Rhinitis/Conjunctivitis allergica, leichtes bis mäßiges allergisches Asthma bronchiale. **Gegenanzeigen:** Unzureichend behandeltes oder schweres (FEV1 <70% trotz Medikation) Asthma bronchiale, irreversible Schädigung der Atemwege, akute Erkrankungen mit Beeinträchtigung des Allgemeinzustandes, schwere chronisch-entzündliche Erkrankungen, schwere Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Beachtung der Adrenalin-Gegenanzeigen), Behandlung mit Betablockern (auch Augentropfen), Autoimmunerkrankungen, Immundefektkrankheiten, Immunsuppressivbehandlung, maligne Tumorerkrankungen, Niereninsuffizienz. Nebenwirkungen: Nach Injektion können lokale oder systemische allergische Reaktionen auftreten. Patienten nach der Injektion mindestens 30 Minuten ärztlich überwachen! Schwere und möglicherweise lebensbedrohliche Reaktionen bedurfen einer schnellen und effektiven Notfallbehandlung. Ein atopisches Ekzem kann unter der Behandlung aktiviert bzw. verstärkt werden. Es wurden Fälle von Gelenkschwellung und -schmerzen sowie Rückenschmerzen beobachtet. Es können Granulome, Schmerzen, Hämatome und Verfärbungen an den Injektionsstellen sowie positive Reaktionen auf Aluminium im Epikutantest auftreten. In seltenen Fällen nach der Injektion leichte Müdigkeit (Verkehrsteilnehmer!). Packungsgröße: Behandlungsset 1 (Flasche A+B+B+B) und 2 (Flasche A+B) (Flasche A und B zu je 3,5ml) Einzel-Flasche B und Doppel-Flasche B (Flasche B zu 3,5 ml). Verschreibungspflichtig! Stand: Juli 2016. ALK-Abelló Arzneimittel GmbH, Griegstraße 75 (Haus 25) 22763 Hamburg. www.alk.net/de



