

[illegible]

Chez les nourrissons nés à partir du 1<sup>er</sup> janvier 2018, les vaccinations contre la diphtérie, la poliomyélite, le tétanos, l'*Haemophilus b*, l'hépatite B, la coqueluche, la rougeole, les oreillons, la rubéole, le pneumocoque et le méningocoque sont **obligatoires**.

### Qu'est-ce que ça veut dire « être à jour » ?

« Être à jour » c'est avoir reçu les vaccins nécessaires en fonction de son âge et avec le bon nombre d'injections pour être protégé.

### Que faire si mes vaccins ne sont pas « à jour » ?

Il n'est pas nécessaire de tout recommencer, il suffit de reprendre la vaccination au stade où elle a été interrompue. On parle de « rattrapage ».



### BCG (Tuberculose)

La vaccination contre la tuberculose est recommandée à partir de 1 mois et jusqu'à l'âge de 15 ans chez certains enfants exposés à un risque élevé de tuberculose.

### Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite

Les rappels de l'adulte sont recommandés à âge fixe soit 25, 45, 65 ans et ensuite tous les dix ans.

### Coqueluche

Le rappel coqueluche se fait à 25 ans. Les futurs parents sont particulièrement concernés, car la vaccination protège les nourrissons de moins de 6 mois dont la vaccination n'est pas complète.

### Hépatite B

Si la vaccination n'a pas été effectuée au cours de la première année de vie, elle peut être réalisée jusqu'à 15 ans inclus. À partir de 16 ans, elle est recommandée uniquement chez les personnes exposées au risque d'hépatite B.

### Pneumocoque

Au-delà de 24 mois, cette vaccination est recommandée dans des situations particulières.

### Méningocoque C

À partir de l'âge de 12 mois et jusqu'à l'âge de 24 ans inclus, une dose unique est recommandée pour ceux qui ne sont pas déjà vaccinés.

### Rougeole-Oreillons-Rubéole

Pour les personnes nées à partir de 1980, être à jour signifie avoir eu deux doses de vaccin.

### Papillomavirus humain (HPV)

La vaccination est recommandée chez les jeunes filles âgées de 11 à 14 ans avec un rattrapage jusqu'à 19 ans inclus. La vaccination est proposée aux hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes (HSH) jusqu'à l'âge de 26 ans.

### Grippe

La vaccination est recommandée, chaque année, notamment pour les personnes à risque de complications : les personnes âgées de 65 ans et plus, celles atteintes de certaines maladies chroniques, dont les enfants à partir de 6 mois, les femmes enceintes et les personnes obèses.

### Zona

La vaccination est recommandée chez les personnes âgées de 65 à 74 ans inclus.

**FREE Compétences :**  
**Les métiers du Sanitaire et Social**

Répondez aux questions posées sur la page suivante...





## Répondez aux questions suivantes :

1. A quoi sert le carnet de vaccination ?

.....

.....

.....

.....

.....

2. Le carnet de vaccination est-il parfois obligatoire ? Si oui, dans quels cas.

.....

.....

.....

.....

.....

|   |     |     |                |
|---|-----|-----|----------------|
| 3. Faire vacciner son enfant est-il obligatoire en France ? | Oui | Non | Je ne sais pas |
|---|-----|-----|----------------|

|  |     |     |                |
|--|-----|-----|----------------|
| 4. Faire vacciner son enfant est-il obligatoire dans tous les pays ? | Oui | Non | Je ne sais pas |
|--|-----|-----|----------------|

|  |     |     |                |
|--|-----|-----|----------------|
| 5. Le BCG est-il un vaccin obligatoire ? | Oui | Non | Je ne sais pas |
|--|-----|-----|----------------|

6. Le cas échéant, à quel âge mon enfant doit-il recevoir le BCG ?

.....

.....



7. Le BCG nécessite-t-il un rappel ? Si oui, à quel âge ?

.....

.....

8. Quels sont les vaccins obligatoires en France ?

.....

.....

.....

.....

9. A quoi sert la vaccination ?

.....

.....

.....

.....

10. Existe-t-il des vaccinations obligatoires en France pour les adultes ?

Oui

Non

Je ne sais pas

11. Quelle est la différence entre une vaccination « obligatoire » et une vaccination « recommandée » ?

.....

.....

.....

.....