

# Servizio Sanitario Nazionale - Regione Veneto

## **AZIENDA ULSS N. 8 BERICA**

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA

COD. REGIONE 050–COD. U.L.SS.508 COD.FISC. E P.IVA 02441500242–Cod. iPA AUV
Tel. 0444 753111 - Fax 0444 753809 Mail protocollo@aulss8.veneto.it
PEC protocollo.centrale.aulss8@pecveneto.it

www.aulss8.veneto.it

Unitá Operativa di Oculistica

**Direttore Dott. Roberto Cian** 

Identificativo documento: SIGLDO20240681600

### Dati del paziente

Ospedale: 01 - P.O. DI VICENZA Reparto: 34010 - OCULISTICA

Numero Ricovero: 20240681600

Data ricovero: 12/02/2024 Data dimissione: 14/02/2024

Cognome Nome: TEST MEDARCHIVER UNO

Data di nascita: 01/10/1980

Codice fiscale TSTMRC80R01A008L



Gentile collega medico di famiglia,

dimetto oggi 14/02/2024 il suo assistito TEST MEDARCHIVER UNO, ricoverato dallo scorso 12/02/2024 per diagnosi di cataratta occhio dx

## Inquadramento clinico iniziale

Ricovero programmato, paziente giunge in buone condizioni, a digiuno. Accolto in reparto be disposto verso l'intervento.

## Motivo del ricovero

cataratta o.dx

## Valutazione e decorso clinico

Decorso clinico posrt operazione avvenuto regolarmente. Presente familiare che è stato aggiornato sulle condizioni del paziente.

## Procedure eseguite durante il ricovero

Intervento di cataratta occhio dx.

### Terapia farmacologica effettuata durante il ricovero

Nevanac collirio (FANS): 1 gtt x 3 volte al giorno per i 3 giorni precedenti e la mattina dell'intervento Ozodrop collirio (antisettico): 1 gtt x 3 volte al giorno per i 3 giorni precedenti e la mattina dell'intervento

## Condizioni del paziente e diagnosi alla dimissione

Paziente dimesso in buone condizioni, non sofferente.

Porterà benda per 1gg, poi togliere la benda e detergere l'occhio giornalmente.

Diagnosi alla dimissione : cataratta occhio dx

## Terapia farmacologica alla dimissione

Nevanac collirio (FANS): 1 gtt x 3 volte al giorno per 20 giorni

Oftacilox collirio (antibiotico fluorochinolonico): 1 gtt x 4 volte al giorno per 10 giorni

Flarex collirio (steroide): 1 gtt x 4 volte al giorno per 10 giorni, poi x 2 volte per i successivi 10 giorni

Trimix collirio (lubrificante): x 2 volte al dì x 1 mese o anche più, se di beneficio

Detersione palpebrale con salviette disinfettanti sterili (Leniva bio, Sterilwet, Iridium o Blefarette) al mattino e/o al bisogno

Si raccomanda di contattare al più presto il Medico di Medicina Generale per informarlo della terapia prescritta, al fine di integrare la prescrizione dei farmaci non consegnati in dimissione.

La Farmacia dell'Ospedale fornisce ai pazienti in dimissione farmaci equivalenti come principio attivo a quelli prescritti dai reparti, di conseguenza il nome commerciale presente sulla confezione può non corrispondere a quello indicato nella lettera di dimissione.

Istruzioni di Follow-up e, solo per Ricoveri ordinari / week surgery, richiesta di visite e prestazioni post ricovero da effettuare entro i 30 giorni

### E' fondamentale:

Evitare il contatto con sostanze esterne come lo shampoo; Prestare attenzione a non sfregare o comprimere l'occhio operato; Astenersi dal bagno al mare o in piscina per qualche settimana; Effettuare scrupolosamente la terapia indicata dall'oculista.

**INFORMAZIONE**: Gentile Signore, desideriamo renderLa partecipe che per il Suo percorso di cura μ stato stimato, in termini di media, un impiego di risorse economiche da parte del Servizio Sanitario Regionale pari ad euro 2.500.

Cordiali Saluti

Dott. DANIELE MARCATO