

**Data** 07/10/2024

Paziente Barducci Luciana (09/05/1948)

Medico Richiedente Dr.ssa Piscolla Elisa

**Tipo Esame** Visita Gastroenterologica

## REFERTO \* n. 42419

Stipsi cronica per la quale ha utilizzato nel corso del tempo lassativi di ogni genere.

Paz . in politerapia , in particolare uas ossicodone , che in quanto oppiaceo , è in grado di accentuare la stipsi . Inoltre al riduzione dell'apporto idrico consigliata in sede urologica , non consente del tutto una corretta funzione intestinale .

Se non controindicata per motivi urologici si consiglia quindi aumento della quotaoidrica ( almeno 2,5 lt) e rivalutazione della terapia a base di oppiacei se le condizoni ddel dolore al rachide che viene riferito lo consentono .

Per quanto rguarada la terapia specifica per la stipsi siconsiglia di continuare con macrogol una o due buste al girno sciolte in acqua tepida abbondante aggiungere Entonorm 2 misurini al giorno per un periodo di 10 gg ( ciclo da ripetere al bisogno ) e di usare ogni due o tregg clismi di glicerina

Dr. Fabrizio Muscas

.

Siamo a Vostra disposizione al seguente indirizzo email: info@milssrl.it

01862650973