Insetos-Praga da Soja e seus Impactos por Estádio Fenológico

Introdução

A cultura da soja é hospedeira de uma grande diversidade de insetos, que podem ser classificados como pragas desfolhadoras, sugadoras, brocas ou pragas de solo. O impacto econômico de cada espécie varia drasticamente de acordo com o estádio fenológico da planta. Enquanto algumas pragas atacam as plântulas logo após a emergência, outras concentram seus danos nas estruturas reprodutivas, como flores e vagens, afetando diretamente a produtividade final.

Principais Insetos-Praga por Estádio Fenológico

Estádio	Grupo de Pragas	Principais Espécies	Tipo de Dano / Incidência (%)
VE - VC	Pragas de Solo e Iniciais	Elasmo (*E. lignosellus*), Corós, Lagarta-rosca	Morte de plântulas, redução de estande (10-30%) 1
V1 - V3	Iniciais e Desfolhadoras	Tamanduá-da-soja, Lagarta-da-soja	Raspagem de caule, desfolha inicial (5-15%) 1
V4 - Vn	Desfolhadoras e Sugadoras	Lagarta-da-soja, Falsa-medideira, Mosca-branca	Redução da área fotossintética, sucção de seiva (20-40%) 2
R1 - R2	Desfolhadoras e Início de Sugadoras	Lagartas (*Anticarsia*, *Chrysodeixis*), Percevejos	Queda de flores, desfolha intensa (30-50%) 2
R3 - R4	Sugadoras de Vagem e Brocas	Percevejo-marrom, Percevejo-verde, Broca-da-vagem	Abortamento de vagens, deformação de grãos (40-60%) 3
R5 - R6	Sugadoras de Grãos	Percevejo-marrom, Percevejo-verde-pequeno	Redução do peso e qualidade dos grãos (60-80%) 3

R7 - R8	Pragas de Final de Ciclo	Percevejos (persistentes), Ácaros	Retenção foliar (soja louca), perda de vigor das sementes (> 80%) [1]

Detalhamento das Principais Pragas

1. Percevejos Sugadores (Complexo de Percevejos)

Considerados as pragas mais danosas na fase reprodutiva. O **Percevejo-marrom** (*Euschistus heros*) e o **Percevejo-verde-pequeno** (*Piezodorus guildinii*) perfuram as vagens para sugar os grãos em formação, injetando toxinas que causam a "retenção foliar" ou "soja louca", impedindo a maturação fisiológica normal.

2. Lagartas Desfolhadoras

A **Lagarta-da-soja** (*Anticarsia gemmatalis*) e a **Falsa-medideira** (*Chrysodeixis includens*) são as principais responsáveis pela redução da área foliar. A tolerância à desfolha é maior na fase vegetativa (até 30%) e reduz significativamente na fase reprodutiva (15%).

3. Pragas Iniciais

A **Lagarta-elasmo** (*Elasmopalpus lignosellus*) é crítica em períodos de seca logo após a emergência, pois penetra no colo da planta, causando o sintoma de "coração morto" e morte da plântula.

Conclusão

O manejo integrado de pragas (MIP-Soja) deve ser baseado no monitoramento constante através do pano-de-batida. A tomada de decisão para o controle químico ou biológico deve respeitar os níveis de ação estabelecidos para cada estádio fenológico, visando a preservação dos inimigos naturais e a sustentabilidade econômica da lavoura.

Referências

[1] Embrapa Soja. Pragas da soja no Brasil e seu manejo integrado. Circular Técnica 30, 2000. Disponível em: <

[2] Climate FieldView. Como fazer o controle de pragas da soja corretamente. Disponível em: <

[3] Bayer Agro. Lagartas da soja: tipos, danos e manejo. Disponível em: <