Data Science

Project

Final Documentation

Members of the team
Names and surnames: Rubén Guaita Daviu, Raúl Hoyos Zulla y Andrés Felipe Silva Guzmán
Asignatura: Data Science (DAS)
Docente: pendiente de completar
Fecha de entrega: pendiente de completar

1. Scope of the project

Análisis del riesgo cardiovascular en adultos NHANES 2013–2014

Delimitación del estudio

NHANES es una encuesta transversal y las respuestas cardiovasculares analizadas describen diagnósticos declarados con anterioridad. Por tanto, este trabajo clasifica antecedentes registrados en la encuesta; no predice la aparición futura de un infarto ni constituye una herramienta clínica.

Resumen

Este proyecto compara el rendimiento de modelos que incorporan, de forma progresiva, información demográfica, mediciones clínicas y variables de estilo de vida para clasificar un evento cardiovascular compuesto. Se utilizaron participantes adultos de NHANES 2013–2014 y se analizaron tres ficheros unidos por el identificador `SEQN`.

La cohorte final de casos completos contiene **4.597 participantes**. La prevalencia observada fue del **3,85 %** para el antecedente aislado de infarto y del **6,63 %** para el evento compuesto definido por el proyecto (MACE). En el conjunto de prueba independiente (N = 1.379), el AUC fue **0,804** para M0 (demográfico), **0,815** para M1 (clínico) y **0,829** para M2 (integral con hábitos). La comparación DeLong M0–M2 fue estadísticamente significativa (p = 0,0212), mientras que la ganancia incremental estricta de hábitos sobre clínica (M1–M2) mostró una tendencia cercana a la significancia estadística (p = 0,0687; con $\Delta\text{Devianza} = 40,704$, p < 0,001 en el ANOVA de devianza).

Objective of the project

Problema y alcance

El proyecto aborda la pregunta de cuánto añade conocer hábitos de vida —sedentarismo, actividad física, tabaquismo y sueño — a la información demográfica y a las mediciones clínicas habituales al clasificar antecedentes cardiovasculares declarados.

Para responderla, se comparan tres modelos anidados: un perfil demográfico y socioeconómico (M0), ese perfil ampliado con mediciones clínicas (M1) y un modelo integral que añade variables de estilo de vida y antecedentes familiares (M2). El objetivo principal del código es `mace_target`, un evento compuesto definido a partir de infarto de miocardio, enfermedad coronaria o angina. También se analiza el antecedente aislado de infarto mediante `ami_target`.

La denominación MACE se utiliza aquí para el compuesto particular del proyecto. No se afirma que coincida con una definición clínica universal de MACE.

Objetivo general

Determinar en qué medida las variables de estilo de vida aportan información adicional sobre la clasificación del antecedente cardiovascular compuesto, frente a la información demográfica y clínica, en participantes adultos de NHANES 2013–2014.

Objetivos específicos

1. Comparar M0, M1 y M2 con curvas ROC, AUC y métricas de clasificación en un conjunto de prueba independiente con umbrales fijados exclusivamente en entrenamiento.
2. Analizar un evento compuesto (MACE) además del antecedente aislado de infarto.
3. Examinar predictores mediante odds ratios, importancia por permutación de Random Forest focalizada en la clase positiva y una curva de dependencia parcial del sedentarismo.
4. Describir diferencias de rendimiento y equidad por sexo (fairness).
5. Explorar un umbral de clasificación sensible al coste que penalice los falsos negativos frente a los falsos positivos mediante tangencia de iso-coste.

Preguntas de investigación

Las preguntas de trabajo incluyen cuánto añaden los hábitos frente a las mediciones clínicas, si se observa un patrón de sedentarismo asociado a mayor salida del modelo, el impacto del hábito tabáquico discriminando fumadores activos de exfumadores (*sick quitter effect*), si el rendimiento difiere por sexo y cómo estratificar clínicamente a los pacientes según su nivel de riesgo.

Study utility

La metodología y los resultados del proyecto ofrecen utilidad en tres ámbitos:

- **Utilidad metodológica.** Comparar progresivamente M0 (demográfico), M1 (clínico) y M2 (integral) permite valorar cuánto aporta cada bloque al rendimiento clasificatorio. El análisis de AUC, devianza y relevancia de las variables ayuda a identificar información predictiva, sin atribuir causalidad a los resultados transversales.
- **Planificación sanitaria (potencial y no validada).** La estratificación de riesgo ilustra cómo los modelos podrían servir para explorar criterios de priorización de evaluaciones en estudios futuros. Sin validación externa y evaluación clínica, los estratos no deben usarse para decidir la atención de personas ni permiten afirmar que reducirían listas de espera, ingresos urgentes o costes.
- **Comunicación y concienciación.** Las tablas y figuras permiten comunicar de forma accesible las asociaciones observadas en la muestra —por ejemplo, entre tabaquismo activo, sedentarismo y antecedentes cardiovasculares—. No representan efectos causales ni recomendaciones médicas.

Innovation

En una revisión exploratoria de ejemplos sobre NHANES consultados en Kaggle, encontramos algunos enfoques centrados en clasificar el antecedente aislado de infarto. Esta observación se limita a los ejemplos revisados y no constituye una revisión sistemática. Como complemento, este proyecto analiza también un evento compuesto definido para el estudio, que incluye infarto, enfermedad coronaria y angina, además del antecedente aislado de infarto. Esta definición de MACE es específica del proyecto y no pretende representar una definición clínica universal.

La aportación del proyecto consiste en comparar progresivamente esos bloques mediante M0, M1 y M2, y complementar la evaluación con análisis de odds ratios, importancia por permutación, dependencia parcial, diferencias descriptivas por sexo y un umbral con una penalización de errores definida para el estudio. También se documentan la procedencia y la preparación de los datos. Estos análisis son exploratorios: no demuestran causalidad, superioridad frente a los modelos citados ni ausencia de sesgo, y no validan el uso del modelo para decisiones clínicas.

2. Project Configuration

2.1. Data sources

La fuente indicada en los objetivos es NHANES 2013–2014, encuesta de salud y nutrición de Estados Unidos. Los datos se obtuvieron del conjunto disponible en Kaggle: National Health and Nutrition Examination Survey.

Fichero	Variables principales utilizadas
`demographic.csv`	Identificador, edad, sexo, etnia/raza, ratio ingresos/pobreza y nivel educativo.
`examination.csv`	Presión arterial sistólica y diastólica, pulso en reposo, IMC y perímetro de cintura.
`questionnaire.csv`	Diagnósticos cardiovasculares declarados, tabaquismo (acumulado y frecuencia actual), actividad física, sedentarismo, sueño e historia familiar.

Los ficheros se unen por `SEQN` mediante uniones internas. El análisis incluye personas de 20 años o más.

2.2. Data exploration and data preparation

Preparación de los datos

El flujo de preparación en `preparacion_datos.R` realiza las siguientes operaciones:

1. Selecciona las variables de los tres CSV y las combina por `SEQN`.
2. Filtra la población adulta, con edad igual o superior a 20 años (`RIDAGEYR >= 20`), resolviendo de partida los *skip patterns* protocolarios del CDC.
3. Recodifica sexo y etnia/raza a etiquetas legibles. El nivel educativo (`DMDEDUC2`) se preprocesa inicialmente, pero se excluye por parsimonia estadística de las fórmulas predictivas dado que el nivel socioeconómico queda sólidamente capturado de forma continua por el ratio ingresos/pobreza (`income_poverty_ratio`), evitando añadir 4 variables dummy innecesarias.
4. En las variables binarias seleccionadas, recodifica `1` como sí y `2` como no; los códigos especiales `7` (*Refused*) y `9` (*Don't know*) se convierten en `NA`.
5. Construye el estatus tabáquico en tres niveles (`smoking_status`): *Nunca fumador* (<100 cigarrillos), *Exfumador* ($\ge$100 cigarrillos pero no fuma actualmente) y *Fumador activo* ($\ge$100 cigarrillos y fuma diaria u ocasionalmente), permitiendo aislar el efecto del abandono por enfermedad (*sick quitter effect*).
6. Calcula el promedio de las dos lecturas sistólicas y las dos diastólicas.
7. Convierte a `NA` los valores de sedentarismo mayores de 1440 minutos y expresa los restantes en horas.
8. Construye las variables objetivo y elimina registros incompletos en las variables incluidas en `vars_modelo`.
9. Divide la cohorte en entrenamiento (70 %) y prueba (30 %), estratificada por `mace_target` y con semilla reproducible `654`.

La ejecución consolidó 4.597 casos completos para modelado.

Exploración de datos

En el gráfico de datos ausentes, los cuestionarios cardiovasculares presentan alrededor del 43 % de valores ausentes o códigos 7/9 en la cohorte bruta y caen a entre 0,0 % y 0,3 % en la cohorte adulta. El patrón demuestra formalmente la existencia de *skip patterns* protocolarios del CDC para menores de 20 años, justificando el filtrado poblacional.




Figura 1. Porcentajes de valores ausentes antes y después del filtro de edad ($\geq$ 20 años).

La matriz de correlación evidencia una colinealidad masiva entre IMC y perímetro de cintura (**r = 0,91**), moderada entre edad y presión sistólica (**r = 0,44**) y entre presiones sistólica y diastólica (**r = 0,34**). Por el contrario, las horas de sedentarismo presentan correlaciones lineales prácticamente nulas con las variables biométricas ($|r| \leq 0,09$), sugiriendo la necesidad de explorar relaciones no lineales.




Figura 2. Matriz de correlación lineal de Pearson entre variables cuantitativas.

La pirámide demográfica muestra un marcado gradiente etario y una clara brecha de género: por debajo de los 40 años el evento es excepcional (<1,9 %), mientras que a partir de los 50 años la prevalencia masculina duplica a la femenina (7,4 % vs. 3,6 % en 50–59 años; 15,9 % vs. 9,0 % en 60–69 años; y 25,4 % vs. 15,7 % en ≥ 70 años).

Grupo de edad	Hombres con MACE	Mujeres con MACE
20–29	0,3 %	0,0 %
30–39	1,8 %	1,9 %
40–49	2,9 %	2,5 %
50–59	7,4 %	3,6 %
60–69	15,9 %	9,0 %
≥ 70	25,4 %	15,7 %




Figura 3. Pirámide poblacional y prevalencia de MACE observada por grupo etario y sexo.

2.3. Technical development

Variables objetivo

- `ami_target`**:** antecedente declarado de infarto agudo de miocardio (`MCQ160E`).
- `mace_target`**:** diana compuesta. Vale 1 si el paciente responde afirmativamente a infarto (`MCQ160E`), enfermedad coronaria (`MCQ160C`) o angina (`MCQ160D`); vale `NA` si las tres respuestas son desconocidas; en los demás casos vale 0.
- `tipo_evento`**:** categoría exclusiva asignada por jerarquía clínica: infarto, enfermedad coronaria (sin infarto), angina aislada y, finalmente, sin evento.

Modelos

Los modelos M0–M2 son regresiones logísticas binomiales para `mace_target`.

Modelo	Predictores incluidos en el código
M0 — Demográfico	Edad, sexo, etnia/raza y ratio ingresos/pobreza.
M1 — Clínico	M0 más presión sistólica y diastólica medias, pulso en reposo, IMC y perímetro de cintura.
M2 — Integral	M1 más estatus tabáquico (3 niveles), actividad física vigorosa semanal, horas de sedentarismo diario, trastorno del sueño/insomnio e historial familiar de infarto prematuro (<50 años).

Además, el proyecto ajusta una regresión logística para `ami_target` con las variables de M2, un Random Forest de 300 árboles para MACE con submuestreo balanceado por clase en entrenamiento (`sampsize = c(214, 214)`) e importancia por permutación, y un modelo multinomial para distinguir el tipo de patología entre participantes con MACE.

Evaluación

En el conjunto de prueba se calculan curvas ROC y AUC. **Los umbrales de decisión se seleccionan estrictamente con datos de entrenamiento** (criterio `closest.topleft` para regresiones y votos OOB para Random Forest), evitando fuga de información (*data leakage*). La tabla de rendimiento incluye sensibilidad, especificidad, precisión, F1, falsos negativos, falsos positivos y coste asistencial ponderado.

El código también evalúa el ANOVA de devianza en entrenamiento y pruebas de DeLong en test: M0 frente a M2, M1 frente a M2 y Random Forest frente a M2.

Implementación y ejecución

El proyecto R se encuentra en `heart-attack-prediction/`. Se abre `Proyecto predicción de Infarto.Rproj` en RStudio y se ejecuta desde la carpeta del proyecto:

```
source("R script prediccion infarto.R")
```

El flujo verifica e instala dependencias (`dplyr`, `pROC`, `randomForest`, `ggplot2`, `tidyr`, `nnet`), y ejecuta secuencialmente preparación, EDA, modelos e interpretación gráfica.

Decisiones de diseño

1. **Nivel educativo:** Se procesó en la fase exploratoria pero se excluyó deliberadamente de las fórmulas predictivas por parsimonia, dado que el ratio ingresos/pobreza resume cuantitativamente el nivel socioeconómico sin añadir 4 variables dummy.
2. **Umbrales calculados estrictamente en entrenamiento:** Tanto el umbral de coste ($0,0522$) como el de Youden/closest-topleft ($0,066$) se calibraron exclusivamente en `train_data`, garantizando una evaluación independiente y sin *data leakage* en `test_data`.
3. **Calibración de Random Forest:** Se utilizó muestreo estratificado balanceado por árbol (`sampsize = c(214, 214)`), lo que corrigió la ceguera algorítmica hacia los enfermos y permitió calcular una importancia por permutación focalizada en la clase positiva.

3. Results

3.1 Cohorte analítica

Conjunto	Participantes	MACE positivos	Prevalencia MACE	Infartos aislados	Prevalencia infarto
Entrenamiento (Train)	3.218	214	6,65 %	118	3,67 %
Prueba (Test)	1.379	91	6,60 %	59	4,28 %
Total cohorte analítica	**4.597**	**305**	**6,63 %**	**177**	**3,85 %**

La prevalencia del evento compuesto MACE (6,63 %) prácticamente duplica a la del infarto agudo aislado (3,85 %), otorgando mayor masa estadística y relevancia clínica al estudio.

3.2 Comparación de modelos

Los umbrales de decisión se fijaron en entrenamiento mediante `closest.topleft` (probabilidades ajustadas en regresión logística y votos OOB en Random Forest) y se evaluaron en el conjunto de prueba independiente (1.379 individuos, 91 positivos):

Modelo	AIC (Train)	AUC (Test)	Umbral (Train)	Sensibilidad	Especificidad	Precisión	F1-Score	Falsos neg.	Falsos pos.	Coste 15:1
M0: Demográfico	1306,1	0,804	0,078	65,9 %	75,2 %	15,8 %	0,255	31	320	785
M1: M0 + Clínicos	1285,5	0,815	0,076	68,1 %	76,1 %	16,8 %	0,269	29	308	743
M2: M1 + Hábitos (Integral)	**1256,8**	**0,829**	**0,066**	**73,6 %**	74,2 %	**16,8 %**	**0,273**	**24**	332	**692**
Random Forest (Balanceado)	—	0,815	0,416	68,1 %	74,5 %	15,9 %	0,258	29	328	763

El modelo integral M2 presenta el mayor AUC (0,829), el menor AIC (1256,8), la mayor sensibilidad (73,6 %, capturando 67 de los 91 enfermos) y el menor coste total asistencial ponderado (692 penalizando 15:1). Random Forest alcanza un AUC equivalente a M1 (0,815).




Figura 4. Comparativa de curvas ROC en test para los modelos jerárquicos M0 (0,804), M1 (0,815) y M2 (0,829).

Comparación descriptiva: infarto aislado y evento compuesto

Para el objetivo de infarto agudo aislado, `m2_ami` obtuvo un AUC de 0,817, frente al 0,829 del modelo M2 para MACE. Esta comparación es descriptiva; no se presenta una prueba estadística específica para evaluar la diferencia entre ambos AUC.




Figura 5. Curvas ROC comparativas para infarto aislado (`ami_target`, AUC = 0,817) frente a diana compuesta (`mace_target`, AUC = 0,829).

3.3 Contrastes estadísticos

Para evaluar la incorporación progresiva de variables, se analizaron por separado el ajuste de los modelos anidados en entrenamiento y su capacidad de discriminación en prueba. El ANOVA de devianza se aplicó en entrenamiento y la prueba de DeLong comparó los AUC en test; por tanto, sus resultados aportan evidencias distintas y conviene interpretarlos por separado.

Ajuste de los modelos en entrenamiento

El ANOVA de devianza muestra una reducción estadísticamente significativa al pasar de M0 a M1 ($\Delta\text{Devianza} = 30,613$; 5 gl; $p = 1,117 \times 10^{-5}$) y de M1 a M2 ($\Delta\text{Devianza} = 40,704$; 6 gl; $p = 3,312 \times 10^{-7}$). Ambos cambios indican una mejora del ajuste en los datos de entrenamiento.

Comparación de AUC en el conjunto de prueba

La prueba de DeLong compara la discriminación de los modelos en el conjunto de prueba independiente:

Comparación en test	AUC modelo 1	AUC modelo 2	Diferencia de AUC (Δ)	*p*-valor DeLong	IC 95 % de la diferencia
M0 vs. M2	0,8044	0,8294	+0,0250	**0,0212**	[−0,0462; −0,0037]
M1 vs. M2	0,8151	0,8294	+0,0142	**0,0687**	[−0,0296; +0,0011]
Random Forest vs. M2	0,8147	0,8294	+0,0147	0,2190	[−0,0381; +0,0087]

La diferencia de AUC entre M0 y M2 es estadísticamente significativa (p = 0,0212). En cambio, la comparación M1–M2 no alcanza el umbral convencional de significancia de 0,05 (p = 0,0687), aunque apunta a una posible mejora; por tanto, el aumento incremental del AUC al añadir hábitos no queda demostrado estadísticamente en test. La comparación entre Random Forest y M2 tampoco es significativa (p = 0,219).

En conjunto, el ANOVA y la reducción de 28,7 puntos de AIC respaldan una mejora del ajuste de M2 en entrenamiento. Sin embargo, esa evidencia debe distinguirse de la comparación de AUC en test: los resultados apoyan una mejora de M2 frente a M0, pero la ganancia de AUC de M2 frente a M1 sigue siendo inconclusa.

3.4 Predictores e interpretabilidad

Odds Ratios ajustados e intervalos de confianza al 95 % obtenidos del modelo M2:

Variable	Odds Ratio (OR)	IC 95 %	Interpretación clínica
Sexo masculino (vs. mujer)	**2,051**	[1,414; 2,975]	Factor de riesgo significativo ($p < 0,001$).
Fumador activo (vs. nunca)	**1,705**	[1,120; 2,597]	Factor de riesgo significativo ($p = 0,013$).
Historial familiar infarto (<50 años)	**1,647**	[1,203; 2,256]	Factor de riesgo significativo ($p = 0,002$).
Trastorno del sueño / Insomnio	**1,605**	[1,164; 2,213]	Factor de riesgo significativo ($p = 0,004$).
Edad (por año)	**1,082**	[1,067; 1,097]	Incremento de riesgo del 8,2 % anual ($p < 0,001$).
Horas de sedentarismo diario	**1,064**	[1,012; 1,118]	Incremento del 6,4 % por hora sentado al día ($p = 0,015$).
Ratio ingresos / pobreza	**0,824**	[0,740; 0,917]	Factor protector socioeconómico ($p < 0,001$).
Tensión sistólica media	**0,988**	[0,979; 0,997]	Asociación inversa por causalidad farmacológica ($p = 0,009$).
Pulso en reposo	**0,985**	[0,972; 0,998]	Asociación inversa por medicación cronotrópica ($p = 0,024$).
Tabaco: Exfumador (vs. nunca)	0,788	[0,549; 1,133]	No significativo tras ajustar por edad (*sick quitter*).
Perímetro de cintura (cm)	1,018	[0,992; 1,045]	No significativo por colinealidad con IMC.
Índice de masa corporal (IMC)	0,998	[0,939; 1,060]	No significativo por colinealidad con cintura.

Variable	Odds Ratio (OR)	IC 95 %	Interpretación clínica
Tensión diastólica media	0,992	[0,981; 1,004]	No significativo.
Actividad física vigorosa semanal	0,907	[0,543; 1,515]	Intervalo incluye el 1.0.
Categorías de etnia/raza	—	—	Intervalos cruzan el 1.0 respecto a México-Americano.

La distinción en 3 niveles de tabaquismo demostró que el tabaquismo activo casi duplica el riesgo ($\mathrm{OR} = 1,705$), mientras que los exfumadores presentan un OR neutro/atenuado ($\mathrm{OR} = 0,788$), explicando por qué en los análisis planos de Kaggle el tabaco parecía no influir. La aparente protección de la tensión sistólica y el pulso refleja causalidad inversa por tratamiento farmacológico intensivo en pacientes crónicos (antihipertensivos y betabloqueantes).




Figura 6. Odds Ratios e intervalos de confianza del 95 % para los predictores del modelo M2.

En el ranking de importancia por permutación de Random Forest (clase positiva MACE), la edad lidera ampliamente (43,2), seguida del perímetro de cintura (10,2), sexo (7,6), ratio ingresos/pobreza (6,6), tensión diastólica (6,5) y etnia/raza (6,2). La importancia por permutación focalizada en la clase positiva evita el sesgo de Gini hacia variables continuas y rescata el peso de factores clínicos y demográficos.




Figura 7. Importancia por permutación en Random Forest para la detección de la clase MACE positivo.

La curva de dependencia parcial (*partial plot*) de Random Forest para el sedentarismo confirma una relación no lineal: tras una meseta en valores bajos, el riesgo relativo se incrementa de forma continuada a partir de aproximadamente 5 horas diarias de sedentarismo.




Figura 8. Efecto marginal centrado (1/2 log-odds) del sedentarismo diario estimado por Random Forest.

3.5 Rendimiento por sexo y evaluación sensible al coste

Evaluación en el conjunto de prueba con el umbral clínico balanceado fijado en entrenamiento (`th = 0,066`):

Grupo	N total	Eventos MACE	Prevalencia	AUC (Test)	Sensibilidad	Especificidad	Tasa falsos negativos
Mujeres	731	39	5,34 %	**0,831**	71,8 %	78,8 %	28,2 %
Hombres	648	52	8,02 %	**0,821**	75,0 %	69,0 %	25,0 %

La capacidad discriminativa global es alta y homogénea en ambos sexos (AUC 0,831 en mujeres y 0,821 en hombres). Con un umbral asistencial común, las mujeres presentan una especificidad superior pero una sensibilidad inferior (71,8 % vs. 75,0 %), resultando en una mayor tasa de falsos negativos (28,2 % vs. 25,0 %). Esto refleja la necesidad de calibrar umbrales más sensibles en mujeres para contrarrestar el infradiagnóstico clínico.




Figura 9. Auditoría de equidad algorítmica: curvas ROC de M2 para mujeres (0,831) y hombres (0,821).

En la evaluación sensible al coste, dado que en la cohorte existen aproximadamente 14 personas sanas por cada paciente enfermo ($[1-p]/p \approx 14,04$), se definió una matriz de costes penalizando el falso negativo 15 veces más que la falsa alarma ($C(\mathrm{FN})/C(\mathrm{FP}) = 15$, pendiente $m = 0,94$). Calibrando el punto óptimo **estrictamente en entrenamiento** se obtuvo un umbral asistencial de `th = 0,0522`.

Al evaluar este umbral en test, la **sensibilidad se incrementa al 84,6 %** (capturando a 77 de los 91 enfermos; solo 14 falsos negativos frente a los 89 del umbral convencional al 0,50), con una especificidad del 68,6 %. La recta de iso-coste resulta tangente exterior a la envolvente convexa de la curva ROC.




Figura 10. Optimización de umbral asistencial sensible al coste ($C(\mathrm{FN})/C(\mathrm{FP}) = 15$) y recta de iso-coste tangente.

3.6 Estratificación y tipo de evento

Estratificación en el conjunto de prueba dividiendo las probabilidades predichas por M2 en cortes fijados a priori:

Nivel de riesgo asignado	Participantes	% de test	Riesgo predicho	Eventos reales	Riesgo observado	% de enfermos de test	Infarto / Coronaria / Angina	Acción recomendada
Bajo (< 5 %)	886	64,2 %	1,6 %	14	**1,6 %**	15,4 %	11 / 2 / 1	Consejo general sobre hábitos de vida
Moderado (5–10 %)	225	16,3 %	7,1 %	25	**11,1 %**	27,5 %	13 / 4 / 8	Revisión en atención primaria
Alto (10–20 %)	156	11,3 %	14,2 %	20	**12,8 %**	22,0 %	15 / 3 / 2	Estudio cardiológico (ECG y esfuerzo)

Nivel de riesgo asignado	Participantes	% de test	Riesgo predicho	Eventos reales	Riesgo observado	% de enfermos de test	Infarto / Coronaria / Angina	Acción recomendada
Muy alto ($\geq$ 20 %)	112	8,1 %	31,4 %	32	**28,6 %**	35,2 %	20 / 10 / 2	Derivación prioritaria a cardiología

La tasa observada de eventos cardiovasculares crece de forma monótona y consistente a través de los estratos (de 1,6 % en nivel bajo a 28,6 % en muy alto). Concentrando la atención médica en los grupos de riesgo moderado, alto y muy alto (el 35,8 % de la población), el sistema cubre al **84,6 % de todos los pacientes que desarrollaron eventos cardiovasculares**.




Figura 11. Estratificación de riesgo en test y distribución de patologías reales observadas.

Para la segunda etapa (especificación del tipo de patología mediante regresión logística multinomial entre enfermos), el modelo parsimonioso de edad y sexo obtuvo menor AIC (408,9 frente a 443,8 del modelo completo). Su capacidad de discriminación multiclase fue moderada (AUC multiclase = 0,590; AUC one-vs-rest: 0,544 infarto, 0,546 coronaria y 0,658 angina), lo cual evidencia que las variables epidemiológicas generales bastan para predecir si un paciente sufrirá un evento isquémico grave, pero se requieren biomarcadores sanguíneos específicos (p. ej., troponinas) para determinar el subtipo exacto. La probabilidad específica $P(\text{Infarto})$ en toda la cohorte alcanzó un AUC de **0,813** detectando infartos en test.

4. Conclusions

Discusión y limitaciones del estudio

La progresión de modelos demuestra una mejora continuada al incorporar capas de información: el AUC en test se incrementa de 0,804 (M0) a 0,815 (M1) y culmina en **0,829** (M2). El contraste global M0 frente a M2 es estadísticamente significativo en

DeLong (p = 0,0212), y la aportación incremental de hábitos sobre constantes clínicas (M1 vs. M2) muestra una reducción de devianza altamente significativa en entrenamiento ($p = 3,312 \times 10^{-7}$, $\Delta\text{AIC} = -28,7$) y roza la significancia en el conservador test de DeLong en prueba (p = 0,0687).

La modelización del hábito tabáquico en 3 niveles resolvió una paradoja metodológica: al distinguir el abandono por enfermedad (*sick quitter effect*), el tabaco activo se reveló como uno de los principales factores de riesgo ajustados ($\text{OR} = 1,705$). Asimismo, el modelado del sedentarismo mediante Random Forest evidenció un umbral de riesgo creciente a partir de las 5 horas diarias. En el plano ético y asistencial, la auditoría de equidad identificó un mayor riesgo de infradiagnóstico en mujeres con cortes genéricos, justificando la optimización sensible al coste, que reduce drásticamente los falsos negativos de 89 a 14.

Las limitaciones metodológicas que condicionan la interpretación de estos resultados son:

- **Diseño transversal:** NHANES es una encuesta transversal; los diagnósticos reflejan antecedentes declarados. No es posible inferir causalidad estricta ni temporalidad longitudinal.
- **Causalidad inversa por medicación:** La aparente asociación protectora de la tensión arterial y el pulso se explica porque los pacientes con antecedentes coronarios se encuentran bajo tratamiento intensivo con antihipertensivos y betabloqueantes.
- **Autodeclaración:** Las variables de estilo de vida provienen de cuestionarios estructurados, susceptibles a sesgo de recuerdo o deseabilidad social.
- **Multicolinealidad biométrica:** El IMC y el perímetro de cintura presentan una correlación de $r = 0,91$, lo que infla los errores estándar al coexistir en el modelo e impide que alcancen significancia individual a pesar de su relevancia biológica.
- **Uso no clínico:** Los estratos y recomendaciones son demostrativos para auditoría de ciencia de datos y no constituyen pautas de prescripción médica.

En conjunto, las conclusiones principales son:

1. Los hábitos de vida modificables aportan información cuantitativa y predictiva relevante: el modelo M2 alcanza un **AUC de 0,829** en test, superando a M0 (p = 0,0212) y mejorando el ajuste clínico de M1 ($\Delta\text{AIC} = -28,7$; ANOVA $p < 0,001$; DeLong $p = 0,0687$).
2. La definición de la diana compuesta MACE atenúa el desbalanceo severo (prevalencia 6,63 % frente a 3,85 % del infarto aislado) y refleja con mayor fidelidad el sustrato aterosclerótico global.
3. El tabaquismo activo ($\text{OR} = 1,705$), el historial familiar ($\text{OR} = 1,647$), el insomnio ($\text{OR} = 1,605$) y el sedentarismo diario ($\text{OR} = 1,064$ por hora) constituyen los predictores modificables clave.
4. El sedentarismo presenta un impacto no lineal, con un riesgo creciente a partir de aproximadamente 5 horas diarias de inactividad.
5. Los modelos exhiben paridad discriminativa global por sexo (AUC 0,831 en mujeres vs. 0,821 en hombres), pero aplicar un corte único sin calibrar provoca una mayor tasa de falsos negativos en mujeres (28,2 % vs. 25,0 %).
6. La evaluación sensible al coste ($C(\text{FN})/C(\text{FP}) = 15$) determina un umbral óptimo de 0,052 que incrementa la sensibilidad al **84,6 %**, reduciendo los falsos negativos a solo 14 casos.
7. La estratificación en cuatro niveles de riesgo concentra al 84,6 % de los enfermos en el tercio superior de riesgo de la población, demostrando la aplicabilidad de los modelos jerárquicos para priorizar el cribado preventivo.

Fuentes y documentación

1. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). **National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), 2013–2014.** Conjunto de datos utilizado mediante Kaggle.
2. Scripts del proyecto en el repositorio: `preparacion_datos.R`, `analisis_exploratorio_eda.R`, `modelos.R`, `interpretacion_graficas.R` y `R script prediccion infarto.R`.
3. Flach, P. (2012). *Machine Learning: The Art and Science of Algorithms that Make Sense of Data*. Cambridge University Press (Análisis ROC y rectas de iso-coste).