

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării
al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Departamentul Ingineria Software și Automatică

RAPORT

la lucrarea de laborator nr.3

Tema: „ Variabile aleatoare ”

Disciplina: „Teoria Probabilităților și a Informației”

Varianta 12

A efectuat :

gr. SI – 201 , Ivanova Evghenia

A verificat :

asis. univ. Popovici Nadejda

Chișinău – 2021

1. Este dată repartiția v.a. de tip discret : $\xi: \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ p_1 & p_2 & p_3 & p_4 \end{pmatrix}$

Se cere: 1) să se introducă în Sistemul Mathematica repartiția v.a.d. ξ ; 2) funcția de repartiție și graficul ei; 3) probabilitatea ca ξ va lua valori din intervalul $[1; 4)$; 4) valoarea medie; 5) dispersia; 6) abaterea medie pătratică; 7) momentele inițiale de ordine până la 4 inclusiv; 8) momentele centrate de ordine până la 4 inclusiv; 9) asimetria; 10) excesul.
12) $x_1=2, x_2=3, x_3=5, x_4=7, p_1=0,1, p_2=0,4, p_3=0,3, p_4=0,2$;


Rezolvare : 1) Introducem repartiția v.a.d. ξ sub formă de listă cu două linii, elementele căreia sunt elementele liniilor matricei . **In[1]:=p={{2, 3, 5, 7},{0.1, 0.4, 0.3, 0.2}}** Scriem **p** în forma matriceală cu ajutorul funcției **MatrixForm**.

$$\text{In[11]:=MatrixForm[p] \quad \text{Out[11]}=\begin{pmatrix} 2 & 3 & 5 & 7 \\ 0.1 & 0.4 & 0.3 & 0.2 \end{pmatrix}$$

2) Aplicând formula $F(x) = \sum_{x_j < x} p_j$, găsim funcția de repartiție

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 2 \\ 0.1, & 2 < x \leq 3 \\ 0.5, & 3 < x \leq 5 \\ 0.8, & 5 < x \leq 7 \\ 1, & x > 7 \end{cases}$$

Construim graficul funcției de repartiție .



3) Probabilitatea ca ξ va lua valori din intervalul $[1; 4)$; Folosim formula $\{a \leq \xi < b\}$
In[3]: $=P(1 \leq \xi < 4)=F[4]-F[1]$ **Out[3]=0.5**

4) Calculăm valoarea medie cu ajutorul formulei $M_{\xi} = \sum_{i \geq 1} x_i p_i$.

In[4]: $=m_{\xi} = \sum_{j=1}^4 p[[1, j]]p[[2, j]]$ **Out[4]=4.3**

Am obținut $m_{\xi} = 4.3$. Aici **p[i,j]** este notația elementului p_{ij} al matricei **p**.

5) Determinăm dispersia conform formulei $\sigma[\xi] = \sqrt{D\xi}$

In[5]: $=D_{\xi} = \sum_{j=1}^4 ((p[[1, j]] - m_{\xi})^2) p[[2, j]]$ **Out[5]= 2.81** **Am obținut $D\xi=2.81$.**

6) Aplicăm formula $\sigma[\xi] = \sqrt{D\xi}$ pentru a determina abaterea medie pătratică

In[6]: $=\sigma_{\xi} = \sqrt{D\xi}$ **Out[6]= 1,67631** . **Am obținut $\sigma_{\xi}= 1.67631$.**

7) Pentru calculul momentelor inițiale folosim formulele $\alpha_s[\xi] = \sum_{j \geq 1} x_j^s p_j, s=1, 2, \dots$

In[71]: $=\alpha_1 = \sum_{j=1}^4 ((p[[1, j]])^1) p[[2, j]]$ **Out[71]= 4.3**

In[72]: $=\alpha_2 = \sum_{j=1}^4 ((p[[1, j]])^2) p[[2, j]]$ **Out[72]= 21.3**

In[73]: $=\alpha_3 = \sum_{j=1}^4 ((p[[1, j]])^3) p[[2, j]]$ **Out[73]= 117.7**

In[74]: $=\alpha_4 = \sum_{j=1}^4 ((p[[1, j]])^4) p[[2, j]]$ **Out[74]= 701.7**

Am obținut $\alpha_1=4.3$; $\alpha_2=21.3$; $\alpha_3=117.7$; $\alpha_4=701.7$.

8) Calculăm momentele centrate conform formulelor $\mu_s[\xi] = \sum_{j \geq 1} (x_j - m_{\xi})^s p_j, s = 1, 2, \dots$

In[81]: $=\mu_1 = \sum_{j=1}^4 ((p[[1, j]] - m_{\xi})^1) p[[2, j]]$ **Out[81]=2*10^(-16)**

Se știe că $\mu_1 = 0$. Aici am obținut un număr foarte aproape, dar totuși diferit de zero. Aceasta se întâmplă uneori când se operează cu numere aproximative. După rotunjire se obține aceeași valoare 0.

In[82]: $=\mu_2 = \sum_{j=1}^4 ((p[[1, j]] - m_{\xi})^2) p[[2, j]]$ **Out[82]=2.81**

In[83]: $=\mu_3 = \sum_{j=1}^4 ((p[[1, j]] - m_{\xi})^3) p[[2, j]]$ **Out[83]=1.944**

In[84]: $=\mu_4 = \sum_{j=1}^4 ((p[[1, j]] - m_{\xi})^4) p[[2, j]]$ **Out[21]=14.6417**

Am obținut $\mu_1=0$; $\mu_2=2.81$; $\mu_3=1.944$; $\mu_4=14.6417$.

9) Calculăm asimetria conform formulei $S_k[\xi] = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$.

In[9]:Sk[ξ]=μ₃/σ³ **Out[9]=0.412699**

10) Calculăm excesul conform formulei $Ex[\xi] = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3$.

In[10]:Ex[ξ]=μ₄/σ⁴ -3 **Out[10]= -1.1457**

Rezolvarea exercițiului s-a terminat. Eliberăm parametrii de valorile atribuite în acest exercițiu. **In[11]:**Clear[p,m_ξ,D_ξ,σ_ξ,α₁,α₂,α₄, μ₁,μ₂,μ₃,μ₄,Sk[ξ],Ex[ξ]].

2. Presupunem că probabilitatea statistică că un copil nou născut să fie băiat este egală cu 0.51. Se cere: 1) să se determine repartiția v.a. ξ care reprezintă numărul de băieți printre 1000 de copii noi născuți; 2) să se calculeze probabilitatea că printre 1000 de copii noi născuți numărul băieților va fi cuprins între 300+k și 500+k, unde k este numărul variantei. k=12

Rezolvare: 1) Variabila aleatoare ξ poate primi valorile: 0, 1, 2,..., 1000. Probabilitățile acestor valori se calculează conform formulei Bernoulli. Deci variabila aleatoare ξ are seria de repartiție $p_k = P(\xi = k) = P_{1000}(k) = C_{1000}^k (0.51)^k (0.49)^{1000-k}$, $k = 0, 1, 2, \dots, 1000$.

2) Calculăm probabilitatea cerută: $P(312 \leq \xi \leq 512) = \sum_{k=312}^{512} C_{1000}^k (0.51)^k (0.49)^{1000-k}$

In[2]: N $\left[\sum_{k=312}^{512} \frac{(1000!) * 0.51^k * 0.49^{1000-k}}{(k!) * (1000-k)!} \right]$ **Out[2]= 0.562743**

3. Numărul ξ de particule alfa emise de un gram de substanță radioactivă într-o secundă este o v.a.d. cu repartiția Poisson cu parametrul a, unde a este numărul mediu de particule alfa emise într-o secundă. 1) Să se determine seria de repartiție a v.a.d. ξ. 2) Să se calculeze probabilitățile evenimentelor: $A = \{ \text{într-o secundă vor fi emise nu mai mult de două particule alfa} \}$ și $B = \{ \text{într-o secundă vor fi emise cinci particule alfa} \}$, $C = \{ \text{într-o secundă vor fi emise mai mult de zece particule alfa} \}$. Care este numărul de particule alfa care corespunde celei mai mari probabilități? Să se considere că $a=1+0,25n$, unde n este numărul variantei. $a = 4$;

Rezolvare: 1) Variabila aleatoare ξ care reprezintă numărul de particule alfa emise într-o secundă are repartiția Poisson de parametru $a = 4$. Această variabilă aleatoare are seria de repartiție: $p_k = P(\xi = k) = \frac{4^k}{k!} e^{-4}$, $k = 0, 1, 2, 3, \dots$

2) Evenimentului $A = \{ \text{într-o secundă vor fi emise nu mai mult de două particule alfa} \}$ îi corespunde că vor fi emise zero, una sau două α -particule. Formula va fi următoarea: $P(A) = \sum_{k=0}^2 \frac{4^k}{k!} e^{-4}$ **In[31]:=** $N \left[\sum_{k=0}^2 \frac{4^k}{k!} * e^{-4} \right]$ **Out[31]= 0.2381**

Pentru evenimentul $B = \{ \text{într-o secundă vor fi emise cinci particule alfa} \}$,
 $P(B) = \frac{4^5}{5!} * e^{-4}$ **In[32]:=** $N \left[\frac{4^5}{5!} * e^{-4} \right]$ **Out[32]= 0.15629**

Pentru cazul $C = \{ \text{într-o secundă vor fi emise mai mult de zece particule alfa} \}$, nu se poate calcula suma în mod direct (avem o infinitate de termeni); putem însă aplica formula $P(C) = 1 - P(\bar{C})$; cum evenimentul opus lui $\bar{C} = \{ \text{nu mai mult de 10 } \alpha\text{-particule vor fi emise} \}$,
 avem: $P(C) = 1 - \sum_{k=0}^{10} \frac{4^k}{k!} e^{-4}$

In[33]:= $1 - N \left[\sum_{k=0}^{10} \frac{4^k}{k!} * e^{-4} \right]$ **Out[33]= 0.00283977**

4. Să se scrie legea de repartiție a variabilei aleatoare ξ care reprezintă numărul de aruncări nereușite ale unui zar până la prima apariție a numărului 4. Să se calculeze probabilitatea că numărul aruncărilor nereușite va varia între $5+k$ și $15+k$, unde k este numărul variantei.

Rezolvare: Pentru rezolvarea aceste probleme folosim schema de repartiție Pascal (geometrică) clasică: $\xi = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & \dots & k & \dots \\ p & pq & pq^2 & \dots & pq^k & \dots \end{pmatrix}$, unde $p=1/6$, $q=5/6$. Condiția este că la aruncările de ordinele cuprinse între 17 și 27 (inclusiv) nu va apărea numărul 4. Nu ne interesează ce se întâmplă la celelalte – nici după, nici înainte; așadar, vom scădea suma probabilităților că numărul apare la aruncările de la 1 la 17 (cu valoarea ξ , respectiv, luând valori întregi de la 0 la 16) din suma probabilităților că numărul apare la aruncările de la 1 la 27 și rezultatul îl vom scădea din 1.

In[4]:= $N \left[1 - \left(\left(\sum_{k=0}^{26} \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6} \right)^k \right) - \sum_{k=0}^{16} \frac{1}{6} \left(\frac{5}{6} \right)^k \right) \right]$ **Out[4]= 0.962206**

5. V.a.c. ξ este definită de densitatea sa de repartiție $f(x)$. Să se determine: 1) reprezentarea v.a.c. ξ în Sistemul Mathematica; 2) linia de repartiție; 3) funcția de repartiție $F(x)$ și graficul ei, 4) valoarea ei medie; 5) dispersia; 6) abaterea medie pătratică; 7)

coeficientul de variație; 8) momentele inițiale de ordinele până la 4 inclusiv, 9) momentele centrale de ordinele până la 4 inclusiv; 10) asimetria; 11) excesul; 12) probabilitatea ca ξ va lua valori din prima jumătate a intervalului de valori posibile. Funcția $f(x)$ este dată pe variante.

$$12) f(x) = \begin{cases} 2(x-2)/25, & x \in [2,7], \\ 0, & x \notin [2,7]; \end{cases}$$

Rezolvare: 1) reprezentarea v.a.c. ξ în Sistemul Mathematica


Introducem densitatea de repartiție în Sistemul Mathematica

In[51]: $F[x_]:=0;/; x < 2;$

$F[x_]:=2(x-2)/25 /; 2 \leq x \leq 7;$

$F[x_]:=0;/; x > 7;$

2) Construim linia de repartiție:



3) Funcția de repartiție se determină prin integrare pe segmentul, pe care funcția de dispersie ia valori nenule: $F(x) = \int_2^x \frac{2(t-2)}{25} dt$


In[52]: $\int_2^x \frac{2(t-2)}{25} dt$ **Out[52]:** $\frac{1}{25} x^2 - \frac{4}{25} x + \frac{4}{25} = 0.04(x-2)^2$

Deci funcția de repartiție este:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 2 \\ 0.04(x-2)^2, & 2 \leq x \leq 7 \\ 1, & x > 7 \end{cases}$$

In[53]: $F[x_]:=0;/; x < 2;$ $F[x_]:=0.04(x-2)^2 /; 2 \leq x \leq 7;$ $F[x_]:=1 /; x > 7;$

Construim graficul :



4) Speranța matematică se calculează după formula: $M[\xi] = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x) dx$

In[34]: NIntegrate[x * f [x] , { x , 2 , 7 }] **Out[34]= 9.583334**

5) Dispersia se calculează după formula: $D[\xi] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_{\xi})^2 f(x) dx$

In[35]: d [ξ] = N [∫₂⁷ ((x - m ξ) ^ 2 f [x]) dx **Out[35]= 26.05325**

6) Abaterea patrată medie este rădăcina patrată din Dispersie:

In[36]: σ = √d [ξ] **Out[36]= 5.10424**

7) Coeficientul de variație se calculează după formula: $v = \frac{\sigma_{\xi}}{m_{\xi}}$.

In[37]: v = $\frac{\sigma_{\xi}}{m_{\xi}}$. **Out[37]= 0.532616**

8) Momentele inițiale se determină după formula: $\alpha_s[\xi] = \int_{-\infty}^{\infty} x^s f(x) dx$, $s = 1, 2, \dots$

In[381]: α₁=NIntegrate[x * f [x] , { x , 2 , 7 }] **Out[381]= 9.583334**

In[382]: α₂=NIntegrate[x² * f [x] , { x , 2 , 7 }] **Out[382]= 56.6667**

In[383]: α₃=NIntegrate[x³ * f [x] , { x , 2 , 7 }] **Out[383]= 342.5**

In[384]: α₄=NIntegrate[x⁴ * f [x] , { x , 2 , 7 }] **Out[384]= 2106.42857**

9) Momentul centrat de ordinul 1 este egal cu zero pentru orice variabilă aleatoare:

$\mu_1 = 0$. Momentul centrat de ordinul doi coincide cu dispersia și deci $\mu_2 = D_\xi = 26.05325$.

Calculăm momentele μ_3 și μ_4 folosind formula: $\mu_s[\xi] = \int_{-\infty}^{\infty} (x - m_\xi)^s f(x) dx$, $s = 1, 2, \dots$

In[391]: $\mu_3 = N \left[\int_2^7 ((x - m_\xi)^3 f[x]) dx \right]$ **Out[391]= -113.152**

In[392]: $\mu_4 = N \left[\int_2^7 ((x - m_\xi)^4 f[x]) dx \right]$ **Out[392]= 522.138**

10) Asimetria se calculează conform formulei: $Sk[\xi] = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$

In[310]: $Sk[\xi] = \frac{\mu_3}{\sigma^3}$ **Out[310]= -0.85088**

11) Excesul se calculează din formula: $Ex[\xi] = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3$

In[311]: $Ex[\xi] = \frac{\mu_4}{\sigma^4} - 3$ **Out[311]= -2.3076**

12) Probabilitatea că ξ va lua valori din prima jumătate a intervalului se calculează după formula: $P(a \leq \xi \leq b) = \int_a^b f(x) dx$

In[312]: $N \left[\int_2^{4.5} f[x] dx \right]$ **Out[312]= 0.2083**

6.V.a. ξ are repartiția normală cu valoarea medie m și cu abaterea medie pătratică σ .

1) să se instaleze pachetul de programe **Statistics`NormalDistribution`**; 2) să se definească (introducă) v.a.c. dată; 3) să se definească (determine) densitatea de repartiție; 4) să se construiască linia de repartiție; 5) să se definească (determine) funcția de repartiție; 6) să se construiască graficul funcției de repartiție; 7) să se construiască pe același desen graficele densității de repartiție și al funcției de repartiție; 8) să se construiască pe același desen graficele densității de repartiție și al funcției de repartiție astfel, ca grosimea graficului densității de repartiție să fie egală cu 0,5 din grosimea standard, iar grosimea graficului funcției de repartiție să fie egală cu 0,9 din grosimea standard; 9) Să se calculeze probabilitatea ca ξ să ia valori din intervalul $[\alpha, \beta]$. Valorile lui m , σ , α și β sunt date pe variante. 12) $m=7$, $\sigma=3$, $\alpha=6$, $\beta=9$;

Rezolvare: 1) Instalăm pachetul cerut de programe **Statistics`NormalDistribution`**

2) Introducem v.a.c. în Mathematica și îi dăm numele **rn** :

In[62]:rn=NormalDistribution[7 , 3] **Out[62]=** NormalDistribution[7 , 3]

3) Definim densitatea de repartiție: Pentru o v.a.c. cu repartiție normală, densitatea de repartiție este: $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$ În cazul nostru avem, $f(x) = \frac{1}{3\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-7)^2}{18}}$


In[63]:drn=PDF [rn , x] **Out[63]=** $\frac{e^{-\frac{1}{18}(-7+x)^2}}{3\sqrt{2\pi}}$

4) Construim graficul liniei de repartiție: **In[64]:**plot[drn , { x, -2 , 15 }]

Input interpretation:

plot	$\frac{e^{-1/18(-7+x)^2}}{3\sqrt{2\pi}}$	x = -2 to 15
------	--	--------------

Plot:



5) Determinăm funcția de repartiție și îi dăm numele **frn** :


In[65]:frn=CDF [rn , x] **Out[65]=** $\frac{1}{2} \operatorname{Erfc} \left[\frac{7-x}{3\sqrt{2}} \right]$

6) Construim graficul funcției de repartiție: `In[66]:=plot[frn , { x , 0 , 7 }]`

Input interpretation:

plot	$\frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{7-x}{3\sqrt{2}}\right)$	$x = 0 \text{ to } 7$
------	---	-----------------------


Plot:



7) Construim graficul funcției de repartiție și graficul densității de repartiție pe același desen: `In[67]:=plot [{ frn , drn } , { x , -2 , 10 }]`

plot	$\frac{e^{-1/18(-7+x)^2}}{3\sqrt{2\pi}}$	$x = -2 \text{ to } 10$
	$\frac{1}{2} \operatorname{erfc}\left(\frac{7-x}{3\sqrt{2}}\right)$	

Plot:



8) Probabilitatea se calculează după formula utilizată mai sus: $P(a \leq \xi \leq b) = \int_a^b f(x)dx$

$$\text{In}[68] := N \left[\int_6^9 \frac{e^{-\frac{1}{18}(-7+x)^2}}{3\sqrt{2\pi}} dx \right] \quad \text{Out}[65] = 0.378066$$

7. Înălțimea unui bărbat este o v.a. cu repartiția normală. Presupunem că această repartiție are parametrii $m=175+(-1)^n/n$ cm și $\sigma=6-(-1)^n/n$ cm. Să se formeze programul de confecționate a costumelor bărbățești pentru o fabrică de confecții care se referă la asigurarea cu costume a bărbaților, înălțimile cărora aparțin intervalelor: [150, 155), [155, 160), [160, 165), [165, 170), [170, 175), [175, 180), [180, 185), [185, 190), [190, 195), [195, 200], n fiind numărul variantei, $n=1, 2, \dots, 30$.

Rezolvare: Pentru a rezolva această problemă vom folosi următoarea formulă pentru

calculul densității de repartiție a v.a.c.: $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$

$$\text{In}[71] := N \left[\int_{150}^{155} \frac{1}{5.916\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-175.083)^2}{2*5.916^2}} dx \right] \quad \text{Out}[71] = 0.0003323457$$

$$\text{In}[72] := N \left[\int_{155}^{160} \frac{1}{5.916\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-175.083)^2}{2*5.916^2}} dx \right] \quad \text{Out}[72] = 0.0050499$$

$$\text{In}[73] := N \left[\int_{160}^{165} \frac{1}{5.916\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-175.083)^2}{2*5.916^2}} dx \right] \quad \text{Out}[73] = 0.038763365$$

$$\text{In}[74] := N \left[\int_{165}^{170} \frac{1}{5.916\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-175.083)^2}{2*5.916^2}} dx \right] \quad \text{Out}[74] = 0.1509595$$

$$\text{In}[75] := N \left[\int_{170}^{175} \frac{1}{5.916\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-175.083)^2}{2*5.916^2}} dx \right] \quad \text{Out}[75] = 0.29928676$$

$$\text{In}[76] := N \left[\int_{175}^{180} \frac{1}{5.916\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-175.083)^2}{2*5.916^2}} dx \right] \quad \text{Out}[76] = 0.302648446$$

$$\text{In}[77] := N \left[\int_{180}^{185} \frac{1}{5.916\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-175.083)^2}{2*5.916^2}} dx \right] \quad \text{Out}[77] = 0.156108859$$

$$\text{In}[78] := N \left[\int_{185}^{190} \frac{1}{5.916\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-175.083)^2}{2*5.916^2}} dx \right] \quad \text{Out}[78] = 0.0409962$$

$$\text{In}[79] := N \left[\int_{190}^{195} \frac{1}{5.916\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-175.083)^2}{2*5.916^2}} dx \right] \quad \text{Out}[79] = 0.005462868$$

$$\text{In}[80] := N \left[\int_{195}^{200} \frac{1}{5.916\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-175.083)^2}{2*5.916^2}} dx \right] \quad \text{Out}[80] = 0.0003677923$$

Așadar, programul trebuie să fie următorul:

Pentru bărbații de înălțimea 150-155 cm: 0.03% din producția fabricii;
Pentru bărbații de înălțimea 155-160 cm: 0.5% din producția fabricii;
Pentru bărbații de înălțimea 160-165 cm: 3.88% din producția fabricii;
Pentru bărbații de înălțimea 165-170 cm: 15.09% din producția fabricii;
Pentru bărbații de înălțimea 170-175 cm: 29.9% din producția fabricii;
Pentru bărbații de înălțimea 175-180 cm: 30.27% din producția fabricii;
Pentru bărbații de înălțimea 180-185 cm: 15.61% din producția fabricii;
Pentru bărbații de înălțimea 185-190 cm: 4.09% din producția fabricii;
Pentru bărbații de înălțimea 190-195 cm: 0.55% din producția fabricii;
Pentru bărbații de înălțimea 195-200 cm: 0.04% din producția fabricii.

8. Presupunem că o convorbire telefonică durează în medie 5 minute și este o v.a. ξ de repartiție exponențială. 1) Să se introducă în Sistemul Mathematica d.r. a v.a.c. ξ . 2) Să se determine funcția de repartiție și să se construiască graficul ei. 3) Dacă vă apropiați de o cabină telefonică imediat după ce o persoană a intrat în ea atunci care este probabilitatea că o să așteptați nu mai mult de 6 ($2+n/3$) minute, unde n este numărul variantei .


Rezolvare: 1) $m_\xi=5 \Rightarrow \lambda=1/5 \Rightarrow f(x) = \begin{cases} 0.2 * e^{-0.2x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$

In[81]: $F[x_]:=0;/ x < 0;$ $F[x_]:=0.2 * e^{-0.2*x} /; x \geq 0;$

Input interpretation:

plot $0.2 e^{-0.2x}$ $x = -3$ to 30

Plot:




2) Funcția de repartiție: $f(x) = \begin{cases} 1 - e^{-0.2x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$

In[82]: F[x_]:=0;/; x ≤ 0; F[x_]:=1 - e^{-0.2*x} /; x > 0;

Input interpretation:

plot 1 - e^{-0.2x} x = -3 to 30

Plot:



3) Pentru a calcula probabilitatea evenimentului 3 vom folosi următoarea formulă:


$$P(a \leq \xi \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

In[83]: N [$\int_0^6 f[x] dx$] **Out[83]=0.698806**

9. Un autobuz circulă regulat cu intervalul 30 minute. 1) Să se scrie în Sistemul Mathematica d.r. a v.a.c. ξ care reprezintă durata așteptării autobuzului de către un pasager care sosește în stație într-un moment aleator de timp. 2) Să se construiască linia de repartiție. 3) Să se determine f.r.e și să se construiască graficul ei. 4) Care este probabilitatea că, sosind în stație, pasagerul va aștepta autobuzul nu mai mult de 16 (10+n/2) minute, unde numărul n coincide cu numărul variantei.

Rezolvare: 1) Densitatea de repartiție a variabilei aleatoare ξ , care reprezintă durata așteptării autobuzului, este: $f(x) = \begin{cases} 1/30, & x \in [0; 30], \\ 0, & x \notin [0; 30]. \end{cases}$

2) Construim linia de repartiție:



```
In[92]:=F[x_]:=1/30 /; 0 ≤ x ≤ 30;
F[x_]:=0 /; x < 30;
F[x_]:=0 /; x > 30;
Plot [ F[x] , { x , -3 , 33 } ]
```


3) Funcția de repartiție:
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ x/30, & 0 \leq x \leq 30, \\ 1, & x > 30. \end{cases}$$

```
In[92]:=F[x_]:=x/30 /; 0 ≤ x ≤ 30;
F[x_]:=0 /; x < 30;
F[x_]:=0 /; x > 30;
Plot [ F[x] , { x , -3 , 33 } ]
```

Input interpretation:

plot	$\frac{x}{30}$	$x = -3 \text{ to } 33$
------	----------------	-------------------------

Plot:



4) Probabilitatea că pasagerul nu va aștepta mai mult de 16 minute o putem calcula conform formulei:
$$P(a \leq \xi \leq b) = \int_a^b f(x) dx$$

```
In[94]:= N [ ∫016 1/30 dx ] Out[94]=0.533333
```

10. Cantitatea anuală de precipitații atmosferice are repartiție normală. Presupunem că anual, cantitatea de precipitații într-o anumită regiune este o v.a. aleatoare de repartiție normală de parametri $m = 500$ (mm) și $\sigma = 150$. Care este probabilitatea că în anul viitor cantitatea de precipitații va fi cuprinsă între $400+5n$ și $500+5n$, unde n este numărul variantei. Dacă considerăm că un an este secetos când cantitatea de precipitații nu depășește 300 mm, atunci care este probabilitatea că doi din viitorii zece ani vor fi secetoși?

Rezolvare: Mai întâi se determină v.a.c. ξ . Pentru o v.a.c. cu repartiție normală, densitatea

de repartiție este: $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-m)^2}{2\sigma^2}}$

$$\text{In[101]} := N \left[\int_{460}^{560} \frac{1}{150\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-500)^2}{2 \cdot 150^2}} dx \right] \quad \text{Out[101]} = 0.260559$$

Probabilitatea ca un an poate fi secetos o putem calcula astfel:

$$\text{In[102]} := N \left[\int_0^{300} \frac{1}{150\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-500)^2}{2 \cdot 150^2}} dx \right] \quad \text{Out[102]} = 0.0907822$$

Acum folosim schema Bernoulli pentru a calcula care este probabilitatea că din 10 ani, 2 vor fi secetoși: $P_{10}(2) = C_{10}^2 p^2 q^8$. Dacă $p = 0.0907822$ atunci $q = 1 - p = 0.909218$.

$$\text{In[103]} := N \left[\frac{10!}{2!(10-2)!} * p^2 * q^8 \right] \quad \text{Out[103]} = 0.173204$$

Concluzia :

În urma acestui laborator am însușit proprietățile variabilei aleatoare, variabilelor aleatoare de tip discret, variabile aleatoare centrate, variabile aleatoare de tip continuu, funcția de repartiție a acestora, abaterea medie pătratică, momentele inițiale și cele centrate, asimetria, excesul, densitatea de repartiție, modele de repartiții (repartiția uniformă, exponențială, normală, gamma, hi-pătrat). Am aplicat în afară de funcțiile definite anterior și funcțiile Condition (notată și cu /;) care atribuie funcției o valoare cu o condiție, Clear care eliberează funcțiile sau parametri de valorile atribuite lor anterior. Deasemenea am folosit pachetul Statistics'NormalDistribution'.