w2lvar · exact members of the muscle bundles

Ia: 19 source channels

Ia_add_brev_l
Ia_add_long_l
Ia_add_mag1_l
Ia_add_mag2_l
Ia_bifemlh_l
Ia_bifemsh_l
Ia_ext_dig_l
Ia_ext_hal_l
Ia_extobl_l
Ia_grac_l
Ia_iliacus_l
Ia_intobl_l
Ia_pect_l
Ia_psoas_l
Ia_sar_l
Ia_semimem_l
Ia_semiten_l
Ia_tfl_l
Ia_tib_ant_l

II: 19 source channels

II_add_brev_l
II_add_long_l
II_add_mag1_l
II_add_mag2_l
II_bifemlh_l
II_bifemsh_l
II_ext_dig_l
II_ext_hal_l
II_extobl_l
II_grac_l
II_iliacus_l
II_intobl_l
II_pect_l
II_psoas_l
II_sar_l
II_semimem_l
II_semiten_l
II_tfl_l
II_tib_ant_l

Ib: 27 source channels

Ib_add_mag3_l
Ib_ercspn_l
Ib_flex_dig_l
Ib_flex_hal_l
Ib_gem_l
Ib_glut_max1_l
Ib_glut_max2_l
Ib_glut_max3_l
Ib_glut_med1_l
Ib_glut_med2_l
Ib_glut_med3_l
Ib_glut_min1_l
Ib_glut_min2_l
Ib_glut_min3_l
Ib_lat_gas_l
Ib_med_gas_l
Ib_per_brev_l
Ib_per_long_l
Ib_per_tert_l
Ib_peri_l
Ib_quad_fem_l
Ib_rect_fem_l
Ib_soleus_l
Ib_tib_post_l
Ib_vas_int_l
Ib_vas_lat_l
Ib_vas_med_l

Each bundle expands into these separate muscle-channel connections, not one summed synapse.
Endpoints, individual conductances, and edge IDs remain in the companion connection keys.