


(utili x esercizi, non approfondite o dimostrate)

FORMULE ALGEBRA



GENERALI

anello $(A, +, \cdot, 0_A, 1_A)$

$$a+b = b+a \quad \text{comm. +}$$

$$(a+b)+c = a+(b+c) \quad \text{ass. +}$$

$$a+0_A = 0_A+a = a \quad \text{el. neutro +}$$

$$a+(-a) = 0_A \quad \text{opposto}$$

$$a \cdot b = b \cdot a \quad \text{comm.} \quad \text{anello commutativo}$$

$$(a \cdot b) \cdot c = a \cdot (b \cdot c) \quad \text{ass.}$$

$$a \cdot 1_A = 1_A \cdot a = a \quad \text{el. neutro} \quad \text{anello unitario}$$

$$a(b+c) = a \cdot b + a \cdot c \quad \text{distr.}$$

Cancellazione in un anello A

$$\text{Se } a \text{ non divisore di } 0_A, \quad ab=ac \Rightarrow b=c$$

(in \mathbb{Z} , se $a \neq 0$)

$$\text{INVERTIBILI} \quad ab=ba=1_A$$

prop. inversi: $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$
il prodotto di due invertibili è invertibile

EL. IRREDUCIBILI

$$a \in A \setminus A^\times \quad \forall b, c \in A,$$

$$a=bc \Rightarrow b \cdot c \in A^\times$$

primo \Leftrightarrow irriducibile

N. PRIMO

$$a \in A \setminus A^\times, \quad a \neq 0$$

$$\forall b, c \in A, \quad a|bc \Rightarrow a|b \text{ o } a|c$$

CAMPO

A anello comm. un.

$$\text{t.c. } \forall a \in A \setminus \{0\}$$

$$a \in A^\times$$

Nota: $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$ campo

$$(e, \text{ in } \mathbb{F}_p, ([a]+[b])^p = [a]^p + [b]^p)$$

GRUPPO $(G, *, e)$

$$(a*b)*c = a*(b*c) \quad \text{assoc.}$$

$$a*e = e*a = a \quad \text{el. neutro}$$

$$a*a' = a'*a = e \quad \text{inverso}$$

$$\text{abeliano: } a*b = b*a \quad \text{commut.}$$

not. additive $(G, +, 0)$ moltiplicativa $(G, \cdot, 1)$

MONDO DELLA DIVISIBILITÀ

(div. euclidea) $a, n \in \mathbb{Z}, n \neq 0 \quad \exists! q \in \mathbb{Z}, r \in \{0, \dots, |n|-1\}$
t.c. $a = qn + r$ \hookrightarrow utile! $r < n$

è una rel. di \subset : $a|b \Leftrightarrow b \in a\mathbb{Z} \subset \mathbb{Z}$

DIVISIBILITÀ E CONGRUENZA MOD N

$$a|b \Leftrightarrow b = a \cdot c$$

b resto a/b

$$a \equiv_n b \Leftrightarrow n | a-b$$

è una rel. di equivalenza \rightarrow utile! $a \equiv_n b \Leftrightarrow b \equiv_n a$
simmetria
($n | a-b \Leftrightarrow n | b-a$)

nota:

$$a \equiv_n a', \quad b \equiv_n b' \Rightarrow a+b \equiv_n a'+b'$$

utili!!

1. Gauss: se $\text{MCD}(a, b) = 1$

$$\text{allora } a|bc \Rightarrow a|c$$

$$(a, b \in \mathbb{Z}^*, c \in \mathbb{Z})$$

lemma: se $\text{MCD}(a, b, c) = 1$

$$\text{e } a, b | c \text{ allora } abc | c$$

TEOREMA FONDAMENTALE ARITMETICA

$\forall a \in \mathbb{Z}^*$, ① l'insieme $I_a = \{p \text{ primo} : p|a\}$ è finito

$$\text{② } a = \pm 1 \cdot \prod_p p^{v_p(a)} \quad \text{(ogni numero è una combinazione di primi elevati a qualcosa)}$$

$$a \cdot b = \prod_p p^{v_p(a) + v_p(b)}$$

$$= p^{v_p(a)} \cdot p^{v_p(b)} = p^{v_p(a) + v_p(b)}$$

FERMAT

$$n^p \equiv_p n \quad (p \text{ primo})$$

$$\text{quindi } n^{p-1} \equiv 1$$

conseguenza: $[n]_p^{-1} = [n]_p^{p-2}$

$$\text{in } \mathbb{Z}/p\mathbb{Z}: ([a]+[b])^p = [a]^p + [b]^p$$

MCD

$$\delta = \text{MCD}(a, b) \quad \text{se}$$

$$\text{① } \delta | a, \quad \delta | b$$

② dato $d' \in \mathbb{N}$ t.c. $d'|a$ e $d'|b$

$$\text{allora } d' | \delta$$

$$\bullet \delta \mathbb{Z} = a\mathbb{Z} + b\mathbb{Z}$$

id. Bézout $\delta = u \cdot a + v \cdot b \quad \exists u, v \in \mathbb{Z}$

Fibo e MCD: $\text{MCD}(F_n, F_{n+1}) = 1$

conseguenze

$$a|b \Leftrightarrow \forall p, \quad v_p(a) \leq v_p(b)$$

$$\text{MCD}(a, b) = \prod_p p^{\min(v_p(a), v_p(b))}$$

POLINOMI (sono domini)

def polinomio

$$P = \sum_{i \geq 0} a_i X^i$$

operazioni

$$P+Q := \sum_{i \geq 0} (a_i + b_i) X^i$$

$$P \cdot Q := \sum_{k \geq 0} c_k X^k \quad \text{Cauchy}$$

$$c_k = \sum_{i+j=k} a_i b_j$$

grado di un polinomio

$$\deg(0) = -\infty \quad (\deg(a) = -\infty \iff a = 0)$$

$$\deg(P) = \max \{i \in \mathbb{N}, a_i \neq 0\}$$

$$\deg: K[X] \longrightarrow \mathbb{N} \cup \{-\infty\}$$

$$\deg(a+b) \leq \max(\deg(a), \deg(b))$$

$$(\deg(a+b) = \max(\deg(a), \deg(b)) \text{ se } \deg(a) \neq \deg(b))$$

$$\deg(ab) = \deg(a) + \deg(b)$$

POLINOMI MONICI

$$P = a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n$$

$$\text{con } a_n = 1 \quad (\text{coeff. deg massima})$$

$$\text{prodotto di monici \u00e8 monico}$$

FATTORIZZAZIONE

i polinomi irriducibili sono:

$$\bullet \text{ in } \mathbb{C}[X]: \deg(P) = 1 \quad (\text{forma } X - \alpha \quad \alpha \in \mathbb{C})$$

$$\bullet \text{ in } \mathbb{R}[X] \quad \textcircled{1} \deg(P) = 1$$

$$\textcircled{2} \deg(P) = 2 \quad \text{e} \quad \Delta = a^2 - 4b < 0$$

polinomi noti:

$$n \geq 1 \quad X^n - 1 = \prod_{i=0}^{n-1} (X - x^i) \quad \text{con } x = e^{\frac{2\pi i}{n}}$$

$P \in \mathbb{R}[X]$ di grado dispari ammette almeno una radice reale

(es. $\mathbb{Q}[X]$)

in $K[X]$: $\deg(Q) = 1$ irriducibile

$$\bullet \deg(Q) = 2 \quad \text{irriducibile} \quad Q = P_1 P_2 \quad \text{irr. deg 1}$$

$$\bullet \deg(Q) = 3 \quad \text{irriducibile} \quad Q = P_1 P_2 \quad \deg(P_1) = 1, P_2 \text{ irr. deg 2}$$

$$\bullet \deg(Q) = 4 \quad \text{irriducibile} \quad Q = P_1 P_2 \quad \deg(P_1) = 1 \deg(P_2) = 3$$

C- VALORE ASSOLUTO

$$|P|_c := c^{\deg(P)} \quad c > 1$$

$$|0| := 0 = c^{-\infty}$$

$$\bullet |a|_c = 0 \iff a = 0$$

$$\bullet |ab|_c = |a|_c \cdot |b|_c$$

$$\bullet |a+b|_c \leq \max(|a|_c, |b|_c) \leq |a|_c + |b|_c$$

(div. euclidea) $a, b \in A = K[X] \quad (a, b) \neq (0, 0)$

$$\exists! (q, r) \in A \text{ t.c. } a = qb + r \quad \text{con } \deg(r) < \deg(b) \quad \text{ovvero } |r|_c < |b|_c$$

inversi

$$A^\times = K^\times$$

(sono le "costanti" inverse del campo)

(anche qui vale $a|b, b|a \iff \exists \lambda \in A^\times \text{ t.c. } b = \lambda a$)

($A/A = \{a + Ha : a \in A \text{ t.c. } \deg(a) < \deg(H)\}$ \u00e8 anello c.u.)

(anche qui MCD)

VALUTAZIONE

$$F \in K[X] = F_0 + F_1 X + \dots + F_n X^n$$

$$\text{ev}_x(F) = F_0 + F_1 x + \dots + F_n x^n$$

$$\text{ev}: K[X] \longrightarrow K$$

polinomio convergente

$$\text{data } F = F_0 + F_1 X + \dots + F_n X^n,$$

$$\bar{F} = \bar{F}_0 + \bar{F}_1 X + \dots + \bar{F}_n X^n$$

insieme radici

$$\mathcal{R} = \mathcal{R}_{\mathbb{R}} \sqcup \mathcal{R}_{\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}}^+ \sqcup \mathcal{R}_{\mathbb{C} \setminus \mathbb{R}}^-$$

FATTORIZZAZIONE UNICA

$$\forall H \in A \setminus \{0\}$$

$$H = \lambda \cdot \prod_{P \text{ irr.}} P^{v_P(H)}$$

con $(v_P(H) \in \mathbb{N} \text{ e } \{P: v_P(H) \neq 0\} \text{ finito})$

campo

ALGEBRICAMENTE CHIUSO

K campo, se: $\forall F \in K[X] \setminus K$

$\exists x \in K \text{ t.c. } x \text{ radice di } F$

(se ho almeno una radice in K)

\u00b0 \u00e8 alg. chiuso se e solo se i soli

polinomi irr. monici sono di 1o grado

MOLTEPLICIT\u00c0

K algebricamente chiuso $\implies \forall F \in K[X] \setminus \{0\}$

si scrive in modo unico come:

$$F = \lambda \prod_{x \in K} (X - x)^{v_x(F)}$$

$v_x(F)$ \u00e8 la molteplicit\u00e0 di F in x

$$\text{fatt in } \mathbb{R}[X] \quad \forall F \in \mathbb{R}[X], F = \lambda \prod_{\substack{x \in \mathbb{R} \\ x \in \mathbb{R}}} (X - x)^{v_x(F)} \prod_{\substack{z \in \mathbb{C} \\ z \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}}} [(X - z)(X - \bar{z})]^{v_z(F)}$$


NUMERI COMPLESSI

$\mathbb{R} \subset \mathbb{C}$ \mathbb{C} è un Campo


$$\mathbb{C} = \{x+iy : x, y \in \mathbb{R}\} \quad i: \sqrt{-1} \text{ caratterizzata come } i^2 = -1$$

$= \mathbb{R} + i\mathbb{R}$

numero complesso: $z = \overbrace{x}^{\text{parte reale}} + i \overbrace{y}^{\text{parte immaginaria}}$



RAPPRESENTAZIONE POLARE



$z = \rho e^{i\theta} \quad \rho = \sqrt{x^2 + y^2} = |z|$

Oss: cerchio delle unità

$z \in \mathbb{C}$ è della forma $z = e^{i\theta}$

$\iff |z| = 1$ quindi giro ad angolo delle unità

e $\exists \theta$ t.c. $z = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$

operazioni: $-z = -x + i(-y)$ opposto

$$z + z' = (x+x') + i(y+y')$$

$$zz' = xx' - yy' + i(x'y + xy')$$

CONIUGAZIONE COMPLESSA

$$\bar{z} = x - iy$$

$$\overline{z+z'} = \bar{z} + \bar{z}'$$

$$\overline{zz'} = \bar{z} \bar{z}'$$

$$\overline{-z} = -\bar{z}$$

$\bar{\bar{z}} = z$ biettiva $h^{-1} = h$
ed è un isomorf. di anelli

formule fondamentali

$$z\bar{z} = x^2 + y^2$$

realtà: $z \in \mathbb{R} \iff z = \bar{z}$

VAL. ASS. COMPLESSO

$$|z| = \sqrt{z\bar{z}} = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$|z| = 0 \iff z = 0$$

$$|zz'| = |z| \cdot |z'|$$

$$|z+z'| \leq |z| + |z'|$$

esponenziale di Eulero

$$e^{i\theta} = \cos(\theta) + i \sin(\theta)$$

$$(e^{i\theta})^n = e^{i\theta n} \quad [\cos(\theta) + i \sin(\theta)]^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$$

proprietà: $\forall \theta \in \mathbb{R}$

$$|e^{i\theta}| = 1$$

$$(e^{i\theta})^{-1} = \overline{e^{i\theta}} = e^{-i\theta}$$

inverso

$$z \cdot \bar{z} (x^2 + y^2)^{-1} = 1$$

\mathbb{C} è algebricamente chiuso
(teorema fond. algebra)

GRUPPI

GRUPPO $(G, *, e)$

- $(a * b) * c = a * (b * c)$ *associ.*
- $a * e = e * a = a$ *el. neutro*
- $a * a' = a' * a = e$ *inverso*
- abeliano*: $a * b = b * a$ *commut.*

not. additivo $(G, +, 0)$ *moltiplicativo* $(G, \cdot, 1)$

OMOMORFISMO DI GRUPPI

$f: G_1 \rightarrow G_2$ t.c.

$$f(a \cdot b) = f(a) \cdot f(b)$$

(quindi, ① $f(1_{G_1}) = 1_{G_2}$
② $f(a^{-1}) = f(a)^{-1}$)

isomorfismo: omom. biiettivo

SOTTOGRUPPO

$H \subseteq G$ t.c. $\forall a, b \in H$

$$\begin{cases} a * b^{-1} \in H \\ 1_G = 1_H \in H, \forall a \in H \end{cases}$$

KERNEL

$f: G_1 \rightarrow G_2$ omom.

$$\begin{aligned} H &= \{g \in G_1 : f(g) = 1_{G_2}\} \\ &= f^{-1}(\{1_{G_2}\}) \end{aligned}$$

el. G_1 che portano a 1_{G_2}

$$\text{Ker}(f) = \{1_{G_1}\} \iff f \text{ iniettivo}$$

IMMAGINE

$f: G_1 \rightarrow G_2$ omom.

$$\begin{aligned} f(G_1) &\subseteq G_2 \\ &= \{y \in G_2 : \exists x \in G_1 \text{ con } f(x) = y\} \end{aligned}$$

SOTTOGRUPPI CONIUGATI

dati $H \subseteq G, g \in G$

$$H^g := \{g' \in G : \exists h \in H \text{ t.c. } g' = g^{-1} h g\}$$

• se G abeliano, $H^g = H$ ($g^{-1} \cdot g = 1_G$)

PERMUTAZIONI

E finito, $S(E) = \{f: E \rightarrow E : f \text{ bi}\}$

$(S(E), \circ, Id_E)$ è un gruppo (di perm.)

$$\bullet f, g \in S(E) \rightarrow g \circ f \in S(E)$$

$$\text{permutazione } f = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ f(1) & f(2) & \dots & f(n) \end{pmatrix}$$

$$n\text{-ciclo: } \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_{s-1} & a_s & a_{s+1} \\ a_1 & a_2 & a_3 & \dots & a_s & a_{s+1} \end{pmatrix}$$

fisso gli el. $\notin \{a_1, \dots, a_s\}$, manda gli altri:

$$a_i \mapsto a_{i+1}, \text{ tranne } a_s \mapsto a_1$$

notazione $(a_1 \overbrace{a_2 a_3 \dots a_s})$

$$\begin{aligned} \text{nota: } (a_1 a_2 a_3) &= \overset{\text{shift cic}}{(a_3 a_1 a_2)} \\ &\underset{\text{inversione cic}}{\neq} (a_2 a_1 a_3) \end{aligned}$$

trasposizione: 2-ciclo

INVERSIONE

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \downarrow & \downarrow & \downarrow & \downarrow \\ 4 & 6 & 7 & 5 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ \uparrow & \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ 4 & 6 & 7 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{ciclo } (123)^{-1} = (321)$$

COMPOSIZIONE (PRODOTTO)

$\sigma \circ \tau$: si applica τ , poi σ

$$\sigma = (1342), \tau = (15324)$$

$$\sigma \circ \tau = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ \tau & & & & \\ 5 & 4 & 2 & 1 & 3 \\ \sigma & & & & \\ 5 & 2 & 1 & 3 & 4 \end{pmatrix}$$

cicli a supporti disgiunti

$$(a_1 \dots a_s), (b_1 \dots b_t),$$

$$\text{se } \{a_1, \dots, a_s\} \cap \{b_1, \dots, b_t\} = \emptyset$$