

1. 선형연립방정식  $AX=b$ 의  $b$ 를 다음의 세 가지 경우에 대하여 풀다고 하자.

$$Av_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad Av_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad Av_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

만약 세 개의 해  $v_1, v_2, v_3$ 가 행렬  $X$ 의 열벡터들이면  $AX$ 는 무엇인가?

$$X = \begin{bmatrix} | & | & | \\ v_1 & v_2 & v_3 \\ | & | & | \end{bmatrix}, \quad AX = \begin{bmatrix} | & | & | \\ Av_1 & Av_2 & Av_3 \\ | & | & | \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

2. '문제1'의 세 개의 연립방정식의 해가 각각  $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ,  $v_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ,  $v_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$  라고 한다. 이 때,

선형연립방정식  $Av = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix}$ 을 풀어라. (문제1의 결과 등을 이용하여 계산을 가능한 줄이고 구할 것)

$$\begin{aligned} \text{방법 1} \quad AX &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ X &= A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ v &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix} \\ \text{방법 2} \quad A(c_1 v_1 + c_2 v_2 + c_3 v_3) &= c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix}, \quad c_1=3, c_2=5, c_3=8 \\ v &= 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 5 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + 8 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 5 \\ 8 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

3.

(1) 두 행렬  $A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 4 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 0 \end{bmatrix}$ 와  $B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 의 rank(계수)를 구하시오.

(2) 세 벡터

$$v_1 = [3, 0, 2, 2], v_2 = [-6, 42, 24, 54], v_3 = [21, -21, 0, -15]$$

의 집합은 선형종속이다. 집합  $S = \{v_1, v_2, v_3\}$ 과 같은 공간을 생성하는  $S$ 의 부분집합을 구하시오.

$$(1) A = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 4 & 3 & 4 \\ 0 & 4 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{21}(-4)} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & -13 & 4 \\ 0 & 4 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{32}(\frac{4}{13})} \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 \\ 0 & -13 & 4 \\ 0 & 0 & \frac{16}{13} \end{bmatrix}$$

$$\therefore \text{rank}(A) = 3$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow[E_{31}(-1)]{E_{21}(-2)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{P_{23}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore \text{rank}(B) = 2$$

$$(2) \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ -6 & 42 & 24 & 54 \\ 21 & -21 & 0 & -15 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{21}(2)} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 42 & 28 & 58 \\ 21 & -21 & 0 & -15 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{31}(-7)} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 42 & 28 & 58 \\ 0 & -21 & -14 & -29 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{E_{32}(\frac{1}{2})} \begin{bmatrix} 3 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 42 & 28 & 58 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$\therefore v_3$  은  $v_1$  과  $v_2$  의 선형 결합이다.

$\therefore S_1 = \{v_1, v_2\}$  은  $S = \{v_1, v_2, v_3\}$  과 같은 공간을 생성한다.

4. 다음 행렬은 선형연립방정식에 대응되는 덧셈인 행렬이다. 해집합의 원소를 열벡터로 표현하시오.

$$(1) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \xrightarrow{P_{23}} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{D_2(\frac{1}{3})} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{13}(-\frac{2}{3})} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{23}(-\frac{2}{3})} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{5}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \mid \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} \right\}$$

$$(2) \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 5 & 3 \\ 0 & -6 & 0 & -4 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{12}(\frac{1}{6})} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{D_2(-\frac{1}{6})} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{13}(-\frac{1}{3})} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{7}{3} & \frac{14}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{2}{3} & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^4 \mid \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} -2 \\ -\frac{5}{3} \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}, s \in \mathbb{R} \right\}$$

$$(3) \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 4 \end{bmatrix}$$

$$S = \left\{ \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^5 \mid \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{bmatrix} = s \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 4 \\ 0 \end{bmatrix}, s, t \in \mathbb{R} \right\}$$