

Nome: Ediane Canga

Sexo: Feminino

Peso: 65Kg

Altura:1,48 cm

Temperatura: 36.6

P.A-110/70mmhg

Fr:91%

POCO2-97

Avaliação Postural

Pedi ao paciente para ficar em pé, em seguida sentar na bola de Bobath. Estou usando a bola de Bobath, para o equilíbrio dinâmico e estático, também para alinhar a coluna durante o movimento executado. Posicionar as mãos nos quadríceps, já sentado na bola de Bobath alinhando, os ombros, a cintura, o tronco para melhor equilíbrio, assimetria dos ombros, com elevação do ombro esquerdo em relação ao direito, desalinhamento na cintura pélvica .Na avaliação postural, vou reajustar ombro, cintura, a coluna deve estar reta para melhor movimento, 20 segundos 2vezes.

Teste de Adams

Pedi ao paciente para ficar em pé, juntando os membros inferiores, e para fazer flexão anterior do tronco onde teve elevação da escapula, fazendo a inclinação do tronco, e observei tem uma parte mais elevada que a outra, a escoliose dela é em S que começou na região lombar, e está com gibosidade do lado direito.

Avaliação de Força:

Pedi ao paciente para ficar em decúbito ventral com os braços para frente, posicionando a cabeça por cima dos braços, fazendo elevação da cabeça juntamente com os braços, fiz também o teste de força muscular abdominal onde pedi na paciente ficar de barriga para cima, colocando o punho na posição do joelho, com os pés no chão, de barriga para cima com os braços atrás da cabeça fazendo a elevação dos braços juntamente com a cabeça.

Avaliação da dor

Pedi ao paciente me dizer o nível da dor, e ela relatou a dor 5 que é moderada então usei a escala da EVA, para avaliar a evolução da paciente ao longo do tratamento, A dor está presente na lombar, a intensidade de 0-5, ela relatou que a dor pontada e pressão, começou 4 anos atrás e relatou também que a dor não é constante, e que quando ela faz alguns movimentos ou algumas atividades ela piora ,como caminhadas longas.

Avaliação de Equilíbrio

Pedi ao paciente ficar em pé, para sentado, pedi para levantar da cadeira e ficar em pé por 2 minutos sem apoio. Sentado sem apoio nas costas com os pés apoiados no chão, pedi também para cruzar os braços e sem apoiar as costas na cadeira, e para fazer agachamento posicionando a cabeça ombros, cintura, coluna, mantendo o equilíbrio fazendo flexão dos membros inferiores.

Avaliação da Marcha

Pedi ao paciente caminhar e notei simetria nos pés, um mais elevado que o outro, e para fazer a marcha pé entre pé, e caminhar com as pontas dos dedos sem olhar para o chão manter o equilíbrio, as mãos soltas e o tronco, cabeça numa posição que a paciente se sinta confortável, levantar os pés e dobrar para melhor movimento.

Avaliação de Sensibilidade

Pedi ao paciente ficar em pé e fechar os olhos na posição frontal, usei o estesiômetro para saber se ela tinha sensibilidade, e ela tem, perguntei o que ela estava a sentir e ela disse formigamento, usei o estesiômetro nas seguintes cores, verde, vermelha, e a lilás, e a resposta da paciente era o mesmo formigamento, então a sensibilidade dela é preservada, não tem alteração.

Avaliação de amplitude de movimento:

Pedi ao paciente ficar em pé, fazendo a flexão da coluna lombar, fazendo o movimento de flexão da coluna onde no lado direito tem 79 graus, sabendo que os graus vão de 0-95 graus, e no lado esquerdo tem 81 graus.

Pedi para fazer a extensão da coluna, lado direito 30°, lado esquerdo 30 graus, os graus da extensão vão de 0-35°, a posição da paciente é ortostática com os pés juntos e alinhados, o goniômetro deve sempre estar na direção côndilo lateral do fêmur.

Flexão lateral da coluna Lombar, lado direito 35° lado esquerdo 39°, os graus da flexão vão de 0-40°, a paciente deve ficar na posição ortostática com os pés juntos e alinhados.

Rotação da coluna lombar, lado direito 33°, lado esquerdo 31°, os graus da rotação vão de 0-35°, pedi ao paciente ficar sentado no plano transversal, de forma correta possível, rodando apenas a coluna para o lado avaliado, o goniômetro fica no centro da cabeça.