

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MÉXICO

Facultad de Ciencias

Autor: Adrián Aguilera Moreno



Lógica Computacional

Semanal 3

Para cada uno de los siguientes ejercicios, **justifica ampliamente** tu respuesta.

1. **Realiza** las siguientes sustituciones **eliminando** los paréntesis superfluos en el resultado y **mostrando paso a paso** el procedimiento.

$$a) ((q \vee r)[q, p := \neg p, s] \rightarrow (r \wedge \neg(r \leftrightarrow p)))[p, r, q := r \vee q, q \wedge p, s].$$

$$b) (u \vee t) \rightarrow (\neg r \leftrightarrow (u \leftrightarrow s))[r, u, t := u, t, r].$$

▽ **Solución:** Analizando los incisos tenemos que

a) Sea $\alpha = [q, p := \neg p, s]$ y $\beta = [p, r, q := r \vee q, q \wedge p, s]$, entonces

$$\begin{aligned} ((q \vee r)\alpha \rightarrow (r \wedge \neg(r \leftrightarrow p)))\beta &= ((q\alpha \vee r\alpha) \rightarrow (r \wedge \neg(r \leftrightarrow p)))\beta \\ &= ((\neg p \vee r) \rightarrow (r \wedge \neg(r \leftrightarrow p)))\beta \\ &= ((\neg p \vee r)\beta \rightarrow (r \wedge \neg(r \leftrightarrow p))\beta) \\ &= \neg p\beta \vee r\beta \rightarrow r\beta \wedge \neg(r \leftrightarrow p)\beta \\ &= \neg(r \vee q) \vee (q \wedge p) \rightarrow (q \wedge p) \wedge \neg(r\beta \leftrightarrow p\beta) \\ &= \neg(r \vee q) \vee (q \wedge p) \rightarrow (q \wedge p) \wedge \neg(q \wedge p \leftrightarrow r \vee q) \end{aligned}$$

b) Sea $\alpha = [r, u, t := u, t, r]$, entonces

$$\begin{aligned} (u \vee t) \rightarrow (\neg r \leftrightarrow (u \leftrightarrow s))\alpha &= (u \vee t) \rightarrow (\neg r\alpha \leftrightarrow (u \leftrightarrow s)\alpha) \\ &= (u \vee t) \rightarrow (\neg u \leftrightarrow (u\alpha \leftrightarrow s\alpha)) \\ &= (u \vee t) \rightarrow (\neg u \leftrightarrow (t \leftrightarrow s)) \\ &= u \vee t \rightarrow (\neg u \leftrightarrow (t \leftrightarrow s)) \end{aligned}$$

◁

2. a) **Define recursivamente** la función pa que dada una fórmula φ , devuelve el número de paréntesis abiertos “(” que tiene φ .
b) **Define recursivamente** la función pc que dada una fórmula φ , devuelve el número de paréntesis cerrados “)” que tiene φ .
c) Sea $\varphi = (((\neg p \wedge q) \vee \neg r) \rightarrow r)$. Demuestra que

$$pa(\varphi) - pc(\varphi) = 0$$

▽ **Solución:**

a) Definimos $pa : PROP \cup \{\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow, (,)\} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$. Así, para

$$\varphi \in ATOM \cup \{\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow,)\}$$

se tiene que $pa(\varphi) = 0$. También, $pa(() = 1$. Para $\alpha, \mu \in PROP$ se tiene que

$$\begin{aligned} pa((\alpha)) &= pa(() + pa(\alpha) + pa()) \\ pa(\neg\alpha) &= pa(\neg) + pa(\alpha) \\ pa(\alpha * \mu) &= pa(\alpha) + pa(*) + pa(\mu) \end{aligned}$$

donde $*$ $\in \{\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow\}$.

b) Definimos $pc : PROP \cup \{\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow, (,)\} \rightarrow \mathbb{N} \cup \{0\}$. Así, para

$$\varphi \in ATOM \cup \{\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow, (,)\}$$

se tiene que $pc(\varphi) = 0$. También, $pc(() = 1$. Para $\alpha, \mu \in PROP$ se tiene que

$$\begin{aligned} pc((\alpha)) &= pc(() + pc(\alpha) + pc()) \\ pc(\neg\alpha) &= pc(\neg) + pc(\alpha) \\ pc(\alpha * \mu) &= pc(\alpha) + pc(*) + pc(\mu) \end{aligned}$$

donde $*$ $\in \{\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow\}$.

c) Veamos que

$$\begin{aligned} pa((((\neg p \wedge q) \vee \neg r) \rightarrow r)) &= pa(() + pa(((\neg p \wedge q) \vee \neg r) \rightarrow r) + pa()) \\ &= 1 + pa(((\neg p \wedge q) \vee \neg r)) + pa(\rightarrow) + pa(r) \\ &= 1 + pa(() + pa((\neg p \wedge q)) + pa(\vee) + pa(\neg r) + pa()) \\ &= 2 + pa(() + pa(\neg p \wedge q) + pa()) + pa(\neg) + pa(r) \\ &= 3 + pa(\neg p) + pa(\wedge) + pa(q) \\ &= 3 + pa(\neg) + pa(p) \\ &= 3 \end{aligned}$$

además, se tiene que

$$\begin{aligned} pc((((\neg p \wedge q) \vee \neg r) \rightarrow r)) &= pc(() + pc(((\neg p \wedge q) \vee \neg r) \rightarrow r) + pc()) \\ &= pc(((\neg p \wedge q) \vee \neg r)) + pc(\rightarrow) + pc(r) + 1 \\ &= pc(() + pc((\neg p \wedge q)) + pc(\vee) + pc(\neg r) + pc()) + 1 \\ &= pc(() + pc(\neg p \wedge q) + pc()) + pc(\neg) + pc(r) + 2 \\ &= pc(\neg p) + pc(\wedge) + pc(q) + 3 \\ &= pc(\neg) + pc(p) + 3 \\ &= 3 \end{aligned}$$

Luego, es claro que

$$\begin{aligned} pa((((\neg p \wedge q) \vee \neg r) \rightarrow r)) - pc((((\neg p \wedge q) \vee \neg r) \rightarrow r)) &= 3 - 3 \\ &= 0 \end{aligned}$$

◁

Desafío extra...

- **Define recursivamente** una función `compress` que elimina los elementos consecutivos repetidos de una lista.

Ejemplo:

$$\text{compress}([a, a, a, a, i, i, i, u, d, d, d, d, d, a, a, a, a, a, a]) = [a, i, u, d, a]$$

- **Demuestra**, usando tu definición, que:

$$\text{compress}([1, 2, 2, 3, 3, 3]) = [1, 2, 3]$$