

UNIVERSIDAD AUTNOMA DE MXICO

Facultad de Ciencias

Autores: Fernanda Villafn Flores

Fernando Alvarado Palacios

Adrin Aguilera Moreno



Grficas y Juegos

Tarea 1

1. Sea n un entero, $n \geq 3$. Demuestre que existe un único n -ciclo, salvo isomorfismo.

Demostración: Sean G y H ciclos de orden n .

Tomamos $V_G = (v_1, \dots, v_n, v_1)$ y $V_H = (v_1, \dots, v_n, v_1)$.

Como G y H son ciclos, sabemos que son 2-regular.

Es decir, podemos suponer que un vértice v_i de G con $i \in \{1, \dots, n\}$ es adyacente a dos vértices (digamos v_{i-1} y v_{i+1}). Notemos que $v_1 = v_n$.

Análogamente para H .

Ahora, como G y H son de orden n , definimos una función $\phi : V_G \rightarrow V_H$ dada por $\phi(v_i) = u_i$ para cada $i \in \{1, \dots, n\}$.

Claramente ϕ es una biyección.

Demostremos que ϕ es un isomorfismo:

\Rightarrow) Si $v_i v_j \in E_G$, entonces podemos suponer, sin pérdida de generalidad, que $j = i + 1$ o $j = i - 1$.

Por definición de ϕ , tenemos que $\phi(v_i) = u_i$ y $\phi(v_j) = u_j = u_{i+1}$ (análogamente cuando $j = i - 1$).

Como $u_i u_{i+1} \in E_H$, concluimos que $\phi(v_i) \phi(v_j) \in E_H$.

\Leftarrow) Recíprocamente, si $v_i v_j \notin E_G$, entonces $j \neq i + 1$ y $j \neq i - 1$.


Se sigue que $\phi(v_i) \phi(v_j) = u_i u_j \notin E_H$.

Por lo tanto, demostramos que existe un único n -ciclo (salvo isomorfismo).

QED

2. De un ejemplo de tres gráficas del mismo orden, mismo tamaño y misma sucesión de grados tales que cualesquiera dos de dichas gráficas no sean isomorfas, al menos una de ellas sea conexa, y al menos una sea inconexa.

A continuación se muestran las gráficas: G_1, G_2 y G_3 :



con sucesiones orden 9, tamaño 8 y sucesión de grados $(1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3)$.

□

3. Sea D una digráfica. Demuestre que

$$\sum_{v \in V_D} d^+(v) = \sum_{v \in V_D} d^-(v) = |A_D|.$$

Demostración: La demostración se divide en dos incisos:

$$\cdot) \sum_{v \in V_D} d^+(v) = |A_D|$$

Sea M_1 una matriz de incidencia de D , tal que:

$$M_1 = M_{ij}^+ = \begin{cases} 1 & \text{si } v_i \text{ es la cola de } e_j \\ 0 & \text{si } v_i \text{ no es la cola de } e_j \end{cases}$$

Ahora, supongamos que $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ donde v_i corresponde al i -simo renglón de M_1 . Sabemos que las entradas de cada columna de M_1 son igual a 1, que son las flechas e_j con un vértice llamado *cola de la flecha*. Por otro lado, las entradas del i -simo renglón de M_1 suman $d^+(v_i)$, ya que las entradas corresponden a todas las flechas de las cuales v_i es cola de dicha flecha.

Entonces, tenemos que:

$$\begin{aligned} |A_D| &= \sum_{j=1}^{|A|} \sum_{i=1}^{|V|} M_{ij}^+ \\ &= \sum_{i=1}^{|V|} \sum_{j=1}^{|A|} M_{ij}^+ \\ &= \sum_{i=1}^{|V|} d^+(v_i) \\ &= \sum_{v \in V} d^+(v) \end{aligned}$$

De forma análoga se realiza el otro inciso.

$$\cdot) \sum_{v \in V_D} d^-(v) = |A_D|$$

Sea M_2 una matriz de incidencia de D , tal que:

$$M_2 = M_{ij}^- = \begin{cases} 1 & \text{si } v_i \text{ es la cabeza de } e_j \\ 0 & \text{si } v_i \text{ no es la cabeza de } e_j \end{cases}$$

Ahora, supongamos que $V = \{v_1, \dots, v_n\}$ donde v_i corresponde al i -simo renglón de M_1 . Sabemos que las entradas de cada columna de M_1 son igual a 1, que son las flechas e_j con un vértice llamado *cabeza de la flecha*. Por otro lado, las entradas del i -simo renglón de M_1 suman $d^-(v_i)$, ya que las entradas corresponden a todas las flechas de las cuales v_i es cabeza de dicha flecha.

Entonces, tenemos que:

$$\begin{aligned} |A_D| &= \sum_{j=1}^{|A|} \sum_{i=1}^{|V|} M_{ij}^- \\ &= \sum_{i=1}^{|V|} \sum_{j=1}^{|A|} M_{ij}^- \\ &= \sum_{i=1}^{|V|} d^-(v_i) \\ &= \sum_{v \in V} d^-(v) \end{aligned}$$

Por lo tanto, queda demostrado que:


$$\sum_{v \in V_D} d^+(v) = \sum_{v \in V_D} d^-(v) = |A_D|$$

QED


4. Sea n un entero positivo. Definimos a la *Retícula Booleana*, BL_n , como la gráfica cuyo conjunto de vrtices es el conjunto de todos los posibles subconjuntos de $\{1, \dots, n\}$, donde dos subconjuntos X y Y son adyacentes si y sólo si su diferencia simétrica tiene exactamente un elemento.

- (a) Dibuje BL_1, BL_2, BL_3 y BL_4 .


Grfica representativa de BL_1 :




Grfica representativa de BL_2 :



Grfica representativa de BL_3 :



Grfica representativa de BL_4 :



□

- (b) Determine $|V_{BL_n}|$ y $|E_{BL_n}|$. (Justifique su respuesta).

Veamos que la cantidad de vrtices es igual a la cantidad de subconjuntos que se pueden formar de la retcula BL_n , esto es el conjunto potencia de $\{1, \dots, n\}$. Por lo que:

$$|V_{BL_n}| = |P(\{1, \dots, n\})| = 2^n$$

Mientras que es un tanto ms empírica la forma en la que se obtiene la cardinalidad de E_{BL_n} , veamos la siguiente tabla con las primeras retculas:

Valor de n	# de aristas
$n = 1 \Rightarrow$	1 arista
$n = 2 \Rightarrow$	4 arista
$n = 3 \Rightarrow$	12 arista
$n = 4 \Rightarrow$	32 arista

Ntese que:

$$\begin{aligned} 1 \cdot 1 &= 1 \cdot 2^{1-1} = 1 \\ 2 \cdot 2 &= 2 \cdot 2^{2-1} = 4 \\ 3 \cdot 4 &= 3 \cdot 2^{3-1} = 12 \\ 4 \cdot 8 &= 4 \cdot 2^{4-1} = 32 \end{aligned}$$

Podemos deducir $|E_{BL_n}| = n \cdot 2^{n-1}$.

En general las retculas booleanas son n -regulares, pues para un $x \in V_{BL_{n-1}}$ con BL_{n-1} siendo n -regular, el BL_n tendr a x relacionado con al menos $n-1$ elementos (son con los que ya se relacionaba en BL_{n-1}) y x se relacionar con el conjunto de tamao $|x|+1$ (el cul slo es uno, pues este es $x \cup \{n\}$) y concluimos que BL_n es n -regular, pues cada x se relaciona con $(n-1)+1$ elemento.

Luego hay n aristas por cada vrtice (los culos son 2^n , como ya vimos) y por el inciso (c) tenemos que BL_n es bipartita, esto aunado al hecho de que es n -regular, nos da partes en BL_n de igual cardinalidad. De lo anterior hay una cantidad de aristas igual a n por cada una de las partes, *i.e.*,

$$\begin{aligned} |E_{BL_n}| &= n \cdot \frac{2^n}{2} \\ &= n \cdot 2^{n-1} \end{aligned}$$

$$\therefore |V_{BL_n}| = 2^n \text{ y } |E_{BL_n}| = n \cdot 2^{n-1} \quad \square$$

(c) Demuestre que BL_n es bipartita para cualquier $n \in \mathbb{Z}^+$.

Demostración: Sea $A = \{1, \dots, n\}$ conjunto con $n \in \mathbb{Z}^+$. Veamos que podemos particionar nuestra BL_n en los conjuntos X y Y de tal forma que X contenga los subconjuntos de BL_n tales que su cardinalidad es $2k$, donde $2k \in A$ y Y tal que contenga los subconjuntos de BL_n de cardinalidad $2k-1$, donde $2k-1 \in A$.

Veamos que pasa cuando dos subconjuntos en BL_n se relacionan, es decir, son adyacentes en BL_n .

- Su diferencia simtrica es 1.

Dados dos subconjuntos en BL_n , uno de ellos debe tener cardinalidad $n+1$ o $n-1$ y el otro de cardinalidad n tal que se cumple que uno de ellos es subconjunto del otro.

Notemos que en X estn todos los subconjuntos de cardinalidad par. Por tanto, la diferencia simtrica entre cualesquiera 2 subconjuntos distintos en X es:

- A lo menos un conjunto de cardinalidad 2.

De lo anterior, tenemos que ningn subconjunto en X cumple ser adyacente mediante la definicin de BL_n .

Ahora notemos que, en Y estn todos los subconjuntos de BL_n que tienen cardinalidad impar. Por lo tanto, la diferencia simtrica en cualesquiera dos subconjuntos distintos en Y es:

- Al menos un conjunto de cardinalidad 2.

Entonces tenemos que: $2k+1-(2k-1)=2$ y como Y es un conjunto, no se tiene dos conjuntos iguales a los cuales relacionar. Por lo anterior y por la definicin de diferencia simtrica, no existen dos conjuntos adyacentes en Y .

$$\therefore BL_n \text{ es bipartita en } X \text{ y } Y, \text{ i.e. } BL_n[X, Y] \quad \text{QED}$$

5. Sea $G[X, Y]$ una gráfica bipartita.

(a) Demuestre que $\sum_{v \in X} d(v) = \sum_{v \in Y} d(v)$.

Demostración: (Induccin sobre $|Y|$)

Sea G una gráfica tal que $G[X, Y]$ y sea r cualquier Entero tal que $|X| = r$

Paso base ($n=1$): Sea $G[X, Y_1]$ donde $|X| = r$ y $|Y| = 1 \implies$ como G es bipartita, todo vrtice de X se relaciona con el nico elemento de Y , por lo que $\sum_{v \in X} d(v) = r$ y el grado del nico vertice en Y , ser igual a r , por lo tanto $\sum_{v \in X} d(v) = r = \sum_{v \in Y_1} d(v)$

Hiptesis de Induccin ($n=k$): Supongamos que $G[X, Y_k]$ es una gráfica bipartita y que $\sum_{v \in X} d(v) = \sum_{v \in Y_k} d(v)$

Paso inductivo ($n = k+1$) : Sea $G[X, Y_{k+1}]$ función bipartita Pd) $\sum_{v \in X} d(v) = \sum_{v \in Y_{k+1}} d(v)$

Demostracin: Por hipotesis de induccin si $G[X, Y_k] \implies \sum_{v \in X} d(v) = \sum_{v \in Y_k} d(v) \implies$ si agregamos un vrtice a Y_k , donde $|Y_{k+1}| = |Y_k| + 1 \implies$ por definicin de gráfica bipartita existirn vrtices de X que sern adyacentes con el nuevo vrtice en $Y \implies$ sea q el nmero de nuevas relaciones entre X y el nuevo vrtice en Y , vemos que el grado del nuevo vrtice en Y ser igual a $q \implies \sum_{v \in X} d(v) = \sum_{v \in Y_k} d(v) + q = \sum_{v \in Y_{k+1}} d(v)$

Por lo tanto para toda g tenemos que $\sum_{v \in X} d(v) = \sum_{v \in Y} d(v)$ QED

(b) Demuestre que si G es k -regular, con $k \geq 1$, entonces $|X| = |Y|$.

Demostración: Dada G una gráfica k -regular $G[X, Y]$ bipartita. Sabemos que por ser bipartita y k -regular, se cumple que:

- Al menos $|V_G| = 2$, pues una gráfica tiene como mnimo un elemento y por ser bipartita est debe relacionarse con al menos un elemento en la particin ajena a ella misma.
- Todos los vrtices tienen grado k .

Tenemos que en el caso mnimo, $|V_G| = 2$ hay una relacin entre dos vrtices (cada uno de ellos pertenecientes a su respectiva parte). Por lo tanto, al ser k -regular, tenemos que el grado de estos vrtices es al menos 1. Entonces, $k \geq 1$.

Ahora usemos el resultado de 5 (a). Sabemos que:

$$\sum_{v \in X} d(v) = \sum_{v \in Y} d(v)$$

Como cada vrtice tiene grado k . podemos decir que:

$$|X| = \frac{\sum_{v \in X} d(v)}{k} \quad \text{y} \quad |Y| = \frac{\sum_{v \in Y} d(v)}{k}$$

De lo anterior, se deduce que:

$$\therefore |X| = |Y| \quad \text{QED}$$

Puntos Extra

1. Sea $G = [X, Y]$ una gráfica bipartita con $|X| = r$ y $|Y| = s$.

(a) Demuestre que $|E| \leq rs$.

Demostración: (Inducción sobre $|Y|$)

Sea r cualquier Entero tal que $|X| = r$

Paso base ($n = 1$): Sea $G(V_1, E_1)$: $G[X, Y]$ donde $|Y| = 1 \implies$ se sigue por vacuidad que $\text{MAX}\{|E_1|\} = r$ (ya que todo elemento de X solo se puede relacionar al unico vrtice en Y).

Hiptesis de induccion ($n = k$): Supongamos que existe $G(V_k, E_k)$: $G[X, Y]$ tal que $|X| = r$ y $|Y| = k \implies \text{MAX}\{|E_k|\} = rk$

Pd) (para $n=k+1$): $G(V_{(k+1)}, E_{(k+1)})$: $G[X, Y]$ tal que $|X| = r$ y $|Y| = k + 1 \implies \text{MAX}\{|E_{(k+1)}|\} = r(k + 1)$

Dem

Por Hiptesis de induccion si $G(V_k, E_k)$: $G(X, Y)$ tal que $|X| = r$ y $|Y| = k$ por lo que el $\text{MAX}\{|E_k|\} = rk$ agregando un vertice a $Y \implies$ definimos $|V(k + 1)| = 1 + |V_k|$ por lo que el $\text{MAX}\{|E(k + 1)|\} = \text{MAX}\{|E_k|\} + k$ (donde k son las nuevas relaciones entre el vertice que se agrego y todos los vertices de X) $\implies \text{MAX}\{|E_k|\} + k = rk + r = r(k + 1)$ por lo tanto el $\text{MAX}\{|E(k + 1)|\} = r(k + 1)$.

Por lo tanto, para toda $G(V, E)$ si $G[X, Y]$: $|X| = r$ y $|Y| = s \implies \text{MAX}\{|E|\} = rs \quad \square$

- (b) Deduzca que $|E| \leq \frac{|V|^2}{4}$.

Demostración: PD. $rs \leq (|V|^2)/4$

Sabemos que para toda grafica $G = [X, Y]$: $|X| = r$ y $|Y| = s \implies$ (por teo. clculo $x^2 > 0$) sean cualesquiera r, s que pertenecen a los Enteros $\implies 0 \leq (r - s)^2 \implies 0 \leq r^2 + s^2 - 2rs \implies 2rs \leq r^2 + s^2 \implies 4rs \leq r^2 + s^2 + 2rs \implies 4rs \leq (r + s)^2 \implies rs \leq ((r + s)^2)/4$ y $r + s = |X| + |Y|$ por lo que por definicin de particion $|X| + |Y| = |V| \implies (|V|^2)/4$ por inciso (a) tenemos que: $|E| \leq rs \leq (|V|^2)/4$ por lo tanto $|E| \leq (|V|^2)/4$

\square


- (c) Describa a las gráficas bipartitas que cumplen la igualdad en el inciso anterior. Justifique su respuesta. SOLUCION

Debemos ver donde se cumple la igualdad $|E| = (|V|^2)/4$

Sea $|V| = |X| + |Y| = r + s \implies$ por la demostracin del inciso del inciso (b) y (a) tenemos que si $0 \leq (r - s)^2 \implies |E| \leq rs \leq (|V|^2)/4 \implies$ si $0 = (r - s)^2 \implies 0 = r - s \implies s = r \implies rs = (|V|^2)/4$ y si G es una grafica bipartita completa $\implies |E| = rs = (|V|^2)/4$ por lo tanto, si las particiones de la grafica tienen el mismo nmero de elementos y tambien la grafica es bipartita completa se cumple la desigualdad $|E| = (|V|^2)/4$

Ejemplo: $rs = 9$

G_1



$$|E| = 9$$

$$|V| = 9 \implies |V|^2/4 = 36/4 = 9$$