GABAY SA NUTRISYON

Kumain nang tama, mula gatas hanggang hapag

Isang gabay. Pindutin ang card para mag-explore, saka mag-quiz.

Simulan

Mag-quiz



Pumili ng paksang tuklasin

Mag-quiz ›



Pagpapasuso
Haba at benepisyo



Pagsisimula ng solido
Prinsipyo at tekstura



Iron
Sino at gaano karami



Vitamin A at zinc
Dosis at dahilan



Pagpupurga
Gamot, oras, babala



Anemya sa iron
Sino at kailan susuriin

Pagpapasuso: gaano katagal, bakit

Menu

6 buwan

Eksklusibong pagpapasuso

2 taon+

Ituloy ang pagpapasuso kasabay ng pagkain

- Madaling tunawin at masipsip
- May antibodies
- Ang DHA ay tumutulong sa pag-unlad ng utak at talino
- Nagpapatibay ng ugnayan ng mag-ina
- Pinoprotektahan ang ina laban sa kanser sa suso, matris at obaryo, labis na timbang at pagdurugo
- Mas mabilis bumalik sa timbang bago magbuntis, at malaking tipid ng pamilya

Solidong pagkain sa 6 buwan

Menu



Nasa oras

Simulan ang complementary foods sa 6 buwan.

Sapat

Magplano gamit ang PSRGN Dietary Prescription Food Guide Pyramid.

Ligtas

Huwag maglagay ng asin bago mag-isang taon.

Wasto

Magsanay ng responsive feeding (tumutugong pagpapakain).

Tekstura at dalas

Menu

6 — 8 — 10 — 12

Minasang pagkain
sa 6 buwan

Finger food
sa 8 buwan

Magaspang o tinadtad
sa 10 buwan

Pagkain ng pamilya
sa 12 buwan

Dahan-dahan

Isang bagong pagkain bawat 3 araw. Simulan sa 1–2 kutsarita ng lugaw, cereal, prutas o gulay.

Gaano kadalas

2–3 beses isang araw sa 6–8 buwan. 3–4 beses isang araw mula 9 hanggang 24 buwan.



Pagbibigay ng iron

Menu

Sino	Anyo	Dosis at tagal
Maliit na timbang sa pagsilang	Patak: 15 mg iron sa bawat 0.6 mL	0.3 mL isang beses isang araw, mula 2 hanggang 6 buwang gulang
Sanggol 6–11 buwan	Patak: 15 mg iron sa bawat 0.6 mL	0.6 mL isang beses isang araw sa loob ng 3 buwan
Batang 1–5 taon	Syrup: 30 mg iron sa bawat 5 mL	1 kutsarita araw-araw sa loob ng 3 buwan, o 30 mg lingguhan sa loob ng 6 buwan
Dalagita 10–19 taon	Tableta (may coating): 60 mg iron at 400 mcg folic acid	Isang tableta araw-araw



Bakit mahalaga

Ang kulang sa iron ay may kaugnayan sa problema sa pag-iisip at paggalaw.

Vitamin A at zinc

Menu

100,000 IU

Sanggol 6 hanggang 11 buwan. Isang dosis lang, karaniwang sa 9 buwan.

200,000 IU

Batang 12 hanggang 59 buwan. Isang kapsula kada 6 buwan.

Zinc

Nakatutulong ang zinc supplement na maiwasan ang pulmonya at pagtatae.

Pagpupurga kada 6 buwan

Menu

Albendazole

200 mg para sa 12–23 buwang gulang. 400 mg para sa 24 buwan pataas.

Mebendazole

500 mg para sa 12 buwang gulang pataas.

Sino at kailan

Lahat ng batang 1 hanggang 12 taong gulang (DOH). Isang dosis kada 6 buwan, iniinom nang busog ang tiyan.

Huwag magpurga kung

May mataas na lagnat, matinding pagtatae o pananakit ng tiyan ang bata.

Anemya sa iron

Menu

Iniuugnay ito sa problema sa pag-iisip (cognitive) at paggalaw (psychomotor) ng mga bata.

Ang mga batang nasa panganib ay dapat magpa-complete blood count (CBC) kahit isang beses sa edad na:

6–24 buwan

2–6 taon

10–19 taon

Nasa panganib din: mga dalagitang may regla at mga nagda-diet nang hindi wasto. Inirerekomenda ang CBC sa bawat yugto ng pagdadalaga/pagbibinata.

MABILIS NA QUIZ

Subukan ang natutunan mo

4 na tanong. Pindutin ang sagot para malaman kung tama ka. Mali? Puwede kang sumubok muli.

Simulan ang quiz

Menu



Tanong 1 ng 4

Menu

PAGPAPASUSO

Gaano katagal inirerekomenda ang eksklusibong pagpapasuso?

A Hanggang 6 buwan

B Hanggang 3 buwan

C Hanggang 12 buwan

Tama!



Hanggang 6 buwan

Eksklusibong pagpapasuso hanggang 6 buwan, saka ituloy hanggang 2 taon pataas kasabay ng pagkain.

Menu

Susunod na tanong ›

Hindi pa tama

Hint

Isipin kung kailan nagsisimula ang solidong pagkain.

Menu

Subukan muli

Tanong 2 ng 4

Menu

PAGSISIMULA NG SOLIDO

Paano dapat ipakilala ang mga bagong pagkain sa 6 na buwang sanggol?

A Ilang bagong pagkain nang sabay-sabay

B Bagong pagkain sa bawat kain, araw-araw

C Isang bagong pagkain lang, sa loob ng 3 araw

Tama!



Isang bagong pagkain lang, sa loob ng 3 araw

Magpakilala ng isang bagong pagkain bawat 3 araw, simula sa 1 hanggang 2 kutsarita kada araw.

Menu

Susunod na tanong ›

Hindi pa tama



Hint

Dahan-dahan para malaman kung bagay sa sanggol ang bawat pagkain.

Menu

Subukan muli

Tanong 3 ng 4

Menu

TEKSTURA

Sa anong edad ipinapakilala ang pagkain ng pamilya?

A 6 buwan

B 12 buwan

C 8 buwan

Tama!



12 buwan

Minasa sa 6 buwan, finger food mga 8 buwan, magaspang o tinadtad sa 10 buwan, pagkain ng pamilya sa 12 buwan.

Menu

Susunod na tanong ›

Hindi pa tama



Hint

Ito ang huling hakbang sa timeline ng tekstura.

Menu

Subukan muli

Tanong 4 ng 4

Menu

PAGPUPURGA

Kailan dapat laktawan ang pagpupurga?

A Kapag kakakain pa lang ng bata

B Kapag 5 taong gulang ang bata

C Kapag may mataas na lagnat, matinding pagtatae o pananakit ng tiyan

Tama!



Kapag may mataas na lagnat, matinding pagtatae o pananakit ng tiyan

Huwag magpurga kapag may mataas na lagnat, matinding pagtatae o pananakit ng tiyan. Kung hindi, isang dosis kada 6 buwan nang busog ang tiyan.

Menu

Tapusin ›

Hindi pa tama

Hint

Isipin ang mga senyales na may sakit na ang bata.

Menu

Subukan muli

MAHUSAY!

Masustansyang pagkain, magandang simula

- Gatas ng ina lang hanggang 6 buwan, ituloy pagkatapos
- Isang bagong pagkain lang, sa loob ng 3 araw
- Walang asin bago mag-1 taon
- Ituloy sa iskedyul ang iron, vitamin A at pagpupurga

Bumalik sa menu

Ulitin ang quiz

