

# Logique Formelle

## Chapitre 02: Logique proportionnelle

### Partie 01

**Ikram Troudi**

Niveau : LGS1 1  
Faculté des Sciences de Gabès (FSG)

# Introduction

- Une proposition est une expression soit vraie soit fausse
- Des propositions peuvent être combinées entre elles par des connecteurs logiques
- La signification d'une telle combinaison est déterminée par la signification des propositions impliquées
- Le but de toute activité scientifique est de distinguer parmi les propositions celles qui sont vraies et celles qui sont fausses

## Exemple

- Une tomate est un fruit
- Une orange est un fruit
- Les oranges ne sont pas le seul fruit

# Introduction

- **Raisonner** c'est déterminer la valeur de vérité de proposition construites en combinant entre des propositions dont les valeurs de vérité sont déjà connues.
- **Le calcul proportionnel** s'intéresse uniquement à la façon dont les propositions sont liées entre elles, et aux conséquences qu'on peut en tirer quant à leur valeur de vérité.
  - Il ne s'intéresse pas du tout à leur signification

- Le vocabulaire du langage de la logique propositionnelle est composé de :
  - un ensemble, fini ou dénombrable, de propositions notées: P, Q, R,...
  - deux constantes : vrai (V) et faux (F)
  - un ensemble de connecteurs logiques: Non, Et, Ou, Implication et Equivalence
  - des parenthèses : (, )

## Connecteurs logiques

- Négation: Non (noté:  $\neg$  )
- Conjonction : Et (noté:  $\wedge$  )
- Disjonction : Ou (noté:  $\vee$  )
- Conditionnel : Si... Alors (noté:  $\rightarrow$  )
- Equivalence : Si et Seulement Si (noté:  $\leftrightarrow$  )

# Les connecteurs logiques

Négation, conjonction, disjonction, implication & équivalence.

## Négation

❖ Noté:

❖ Table de vérité:

La négation du P est noté  $\neg(P)$  qui:

- est vrai lorsque P est faux,
- est faux lorsque P est vrais

P	$\neg(P)$
V	
F	

### Exemple:

- $P = \text{« 24 est un multiple de 2 »}$  est **vraie (V)**. Le  $\neg(P)$  est défini par :  
 $\neg(P) = \text{« 24 n'est pas un multiple de 2 »}$ .

C'est une **fausse (F)**

# Les connecteurs logiques

Négation, conjonction, disjonction, implication & équivalence.

## Conjonction

❖ Noté:

❖ Table de vérité

« P et Q », appelé

- est vrai lorsque P et Q sont vrais simultanément
- est faux dans tous les autres cas.

:

P	Q	P et Q
V	V	
F	V	
V	F	
F	F	

# Les connecteurs logiques

Négation, conjonction, disjonction, implication & équivalence.

## Disjonction

❖ Noté:

❖ Table de vérité

« P ou Q », appelé :

- est vrai lorsque l'un au moins des deux P et Q est vrais
- est faux lorsque les deux sont faux.

P	Q	P ou Q
V	V	
F	V	
V	F	
F	F	



# Les connecteurs logiques

Négation, conjonction, disjonction, implication & équivalence.

## Exemple:

Considérons P et Q suivantes :

- $P = \ll 10 \text{ est divisible par } 2 \gg,$
- $Q = \ll 10 \text{ est divisible par } 3 \gg.$

P est vraie tandis que Q est fausse.

- $P \text{ et } Q = \ll 10 \text{ est divisible par } 2 \text{ et } 10 \text{ est divisible par } 3 \gg,$
- $P \text{ ou } Q = \ll 10 \text{ est divisible par } 2 \text{ ou } 10 \text{ est divisible par } 3 \gg.$

$\ll P \text{ et } Q \gg$  est fausse.

$\ll P \text{ ou } Q \gg$  est vraie.

# Les connecteurs logiques

Négation, conjonction, disjonction, implication & équivalence.

## Implication

❖ Noté :

❖ Table de vérité :

«  $P \rightarrow Q$  » appelé  
est définie:

- est faux lorsque P est vrai et Q faux,
- est vrai dans tous les autres cas.

P	Q	$P \rightarrow Q$
V	V	
F	V	
V	F	
F	F	

# Les connecteurs logiques

Négation, conjonction, disjonction, implication & équivalence.

## Implication

### Exemple 1: Cas où p est vraie

❖ « s'il pleut, le sol est mouillé »

- p: «il pleut »
- q: «le sol est mouillé »
- On suppose que p est vraie et on essaye de prouver que q est vraie
- Si la conséquence q est vraie, donc  $p \rightarrow q$  est
- Si la conséquence q est fausse, donc  $p \rightarrow q$  est

# Les connecteurs logiques

Négation, conjonction, disjonction, implication & équivalence.

## Exemple 2: Cas où p est Faux

- ❖ Si je mange des légumes, alors je mange sainement
  - P : " je mange des légumes."
  - Q : "Je mange sainement. "
- On suppose que P est faux : Je n'ai pas mangé de légumes. Alors Q est vrai : Je mange sainement (peut-être parce que j'ai mangé d'autres aliments sains).
- Si la conséquence p est faux, donc  $p \rightarrow q$  est

# Les connecteurs logiques

Négation, conjonction, disjonction, implication & équivalence.

## Implication

❖ Théorème:  $P \rightarrow Q = (\neg P) \vee Q$

❖ Démonstration:

P	Q	$P \rightarrow Q$	$\neg P$	$(\neg P) \vee Q$
V	V			
F	V			
V	F			
F	F			

# Les connecteurs logiques

Négation, conjonction, disjonction, implication & équivalence.

## Implication

### Exercice:

- ❖ Quelles sont les valeurs de vérité de propositions suivantes
1. « la somme des angles d'un triangle vaut  $180^\circ$  implique que la somme des angles d'un rectangle vaut  $360^\circ$  »
  2. «  $\pi$  vaut 3,14 implique que la somme des angles d'un triangle vaut  $182^\circ$  »
  3. « si 7 est plus grand que 8 alors l'eau bout à  $100^\circ \text{ C}$  »
  4. « si 3 est plus petit que 4 alors 4 est plus petit que 3 »
  5. « si 4 est plus petit que 3 alors 3 est plus petit que 4 »
  6. « 82 est divisible par 7 implique que  $\pi$  vaut 3,14 »

# Les connecteurs logiques

Négation, conjonction , disjonction , implication & équivalence.

## Equivalence

❖ Noté :

❖ Table de vérité :

«  $P \leftrightarrow Q$  » appelé équivalence de P et de Q est un prédicat qui:

❖ est vrai lorsque P et Q sont simultanément vrai ou faux,

❖ est faux dans tous les autres cas.

On résume ceci dans la table de vérité :

❖  $(P \rightarrow Q)$  et  $(Q \rightarrow R)$  se note:  $P \rightarrow Q \rightarrow R$ .

❖  $(P \leftrightarrow Q)$  et  $(Q \leftrightarrow R)$  se note:  $P \leftrightarrow Q \leftrightarrow R$ .

P	Q	$P \leftrightarrow Q$
V	V	
F	V	
V	F	
F	F	

# Les connecteurs logiques

Négation, conjonction , disjonction , implication & équivalence.

## Equivalence

❖ Théorème :  $P \leftrightarrow Q = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$

Démonstration

P	Q	$P \leftrightarrow Q$	$P \rightarrow Q$	$P \rightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$
V	V				
F	V				
V	F				
F	F				



# Forme propositionnelle

## Définition

Une forme propositionnelle (ou formule propositionnelle) est construite selon des règles, ou l'on retrouve , et des symboles de variables propositionnelles.

## Remarques:

- Une proposition est une forme propositionnelle
- Si  $p$  est \_\_\_\_\_ alors  $p$  écrit tout seul est \_\_\_\_\_ .
- Si  $p$  et  $q$  sont deux formes propositionnelles il en est de même de  $(p \wedge q)$  et de  $(p \vee q)$
- Si  $p$  est une forme propositionnelle, il en est de même de  $(\neg p)$

# Forme propositionnelle

## Table de vérité

Dans une forme propositionnelle, quand on remplace les variables par des propositions, on obtient une proposition. La valeur de vérité de cette proposition ne dépend que des valeurs de vérité de cette proposition ne dépend que des valeurs de vérité des propositions qui ont été substituées

### Exercice:

Evaluer les valeurs de vérité de l'expression :

$$(\neg(P \rightarrow Q) \wedge R)$$

**Note :** si on a  $n$  variables il faut prévoir une table contenant  $2^n$  lignes

P	Q	R	$(P \rightarrow Q)$	$\neg(P \rightarrow Q)$	$(\neg(P \rightarrow Q) \wedge R)$
V	V	V			
V	V	F			
V	F	V			
V	F	F			
F	V	V			
F	V	F			
F	F	V			
F	F	F			

# Forme propositionnelle

## Table de vérité

Les formes propositionnelles peuvent être combinées entre elles au moyen des connecteurs et on obtient des formes propositionnelles de plus en plus compliquées.

Exemple 1: Soient  $f(P,Q)=P \wedge Q$  et  $g(P,R)=P \wedge (\neg R)$

Déterminer la table

de vérité de  $f \vee g$

P	Q	R	$\neg R$	$f=P \wedge Q$	$g=P \wedge (\neg R)$	$f \vee g$
V	V	V				
V	V	F				
V	F	V				
V	F	F				
F	V	V				
F	V	F				
F	F	V				
F	F	F				

# Forme propositionnelle

## Table de vérité

### Exercice1:

1/ Combien de lignes contient la table de vérité d'une forme propositionnelle qui dépend de  $n$  variables ?

2/ A l'aide de deux propositions  $p$  et  $q$  on peut construire une autre, notée  $p \downarrow q$ , bâtie sur le modèle : « ni  $p$  , ni  $q$  ». Cette opération est-elle une connexion ? Si oui quelle est sa table de vérité ?

# Forme propositionnelle

## Table de vérité

### Exercice1:

Représenter la table de vérité de chaque forme propositionnelle

1/  $(\neg P) \vee Q$

2/  $(P \vee Q) \rightarrow (P \wedge Q)$

3/  $(P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q)$  4/  $(P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P)$

5/  $(P \rightarrow (\neg Q)) \wedge (Q \rightarrow (\neg P))$

6/  $P \rightarrow (\neg P) \vee P$

7/  $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow ((P \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow Q))$

# Forme propositionnelle

## Modèle

### Définition

Un choix des valeurs de vérité des variables qui donne une proposition s'appelle de la forme propositionnelle.

- Dans l'exemple précédent, le choix de V pour p, F pour q et V pour r est un modèle pour la forme propositionnelle.
- On dit que des formes propositionnelles sont si elles ont au moins .
- On dit que des formes propositionnelles sont quand elles n'ont .

# Forme propositionnelle

## Tautologie

### Définition

- ❖ Une  $\text{tautologie}$  est une formule qui est vraie dans toutes les interprétations possibles
  - Sa colonne de la formule complexe dans sa table ne contient que de  $\text{V}$ .
  - En tant que forme propositionnelle, une proposition vraie est une tautologie.
- ❖ Une  $\text{antilogie}$  est une formule qui n'est vraie dans aucune interprétation possible.
  - Sa colonne de la formule complexe dans sa table ne comporte que des  $\text{F}$ .
  - En tant que forme propositionnelle, une proposition fausse est une antilogie.
  - On dit aussi une  $\text{contradiction}$ .

# Forme propositionnelle

Tautologie

Exemples

$$(\neg P) \vee P$$

P	$\neg P$	$(\neg P) \vee P$
V	F	
F	V	

$$(\neg P) \wedge P$$

P	$\neg P$	$(\neg P) \vee P$
V	F	
F	V	



## Tautologie

**Exercice:** Montrer que les formules suivantes sont ou non des tautologies ?

1/  $(P \vee Q) \rightarrow (P \wedge Q)$

2/  $(P \wedge Q) \rightarrow (P \vee Q)$

3/  $P \rightarrow (\neg P \vee P)$

4/  $P \rightarrow (\neg P \wedge P)$

5/  $P \rightarrow (\neg P \rightarrow P)$

6/  $(P \wedge (\neg Q)) \vee (P \wedge Q)$

7/  $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow ((P \rightarrow R) \wedge (R \rightarrow Q))$

# Forme propositionnelle

## Tautologie

### Définition:

Si  $f$  et  $g$  deux formes propositionnelles, on dit que  $g$  est conséquence de  $f$ , ou encore  $g$  se déduit de  $f$  si

- On écrit alors:  $f \vdash g$
- Le symbole  $\vdash$  n'est pas un connecteur
- $\vdash$  est un symbole d'une relation ( $g$  est une conséquence de  $f$ )

# Forme propositionnelle

## Tautologie

### Théorème :

- La forme propositionnelle  $g$  est une conséquence de la forme propositionnelle de  $f$  si tout modèle de  $f$  est aussi un modèle de  $g$
- En effet : si  $f$  prend toujours la valeur V cela signifie que  $f$  ne prend pas la valeur F quand  $g$  prend la valeur F

# Forme propositionnelle

## Conséquence logique

### Exemple 1:

Si P implique Q et si Q implique R, alors P implique ,

Soient:  $f(P,Q,R) = (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R)$  et

$$g(P,R) = P \rightarrow R$$

Montrer que  $f \models g$

# Forme propositionnelle

## Conséquence logique

P	Q	R	$(P \rightarrow Q)$	$(Q \rightarrow R)$	f	$g = P \rightarrow R$	$f \models g$
V	V	V					
V	V	F					
V	F	V					
V	F	F					
F	V	V					
F	V	F					
F	F	V					
F	F	F					

# Forme propositionnelle

## Conséquence logique

### Exemple 2:

Montrer que  $(P \wedge (P \rightarrow Q))$  à pour conséquence  $Q$

P	Q	$(P \rightarrow Q)$	$(P \wedge (P \rightarrow Q))$	$(P \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow Q$
V	V			
V	F			
F	V			
F	F			

**Conclusion:**

# Forme propositionnelle

## Conséquence logique

### Exemple 3:

Montrer que  $(\neg P)$  est une conséquence  $(\neg Q) \wedge (P \rightarrow Q)$

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \rightarrow Q$	$(\neg Q) \wedge (P \rightarrow Q)$	$((\neg Q) \wedge (P \rightarrow Q)) \rightarrow (\neg P)$
V	V					
V	F					
F	V					
F	F					

**Conclusion:**

# Forme propositionnelle

## Synonymes logique

**Définition:** On dit que deux formes propositionnelles sont synonymes quand elles ont la même table de vérité.

**Exemple :**  $(P \rightarrow Q)$  et  $((\neg Q) \rightarrow (\neg P))$  sont synonymes

P	Q	$\neg P$	$\neg Q$	$P \rightarrow Q$	$(\neg Q) \rightarrow (\neg P)$
V	V				
V	F				
F	V				
F	F				

**Remarque:** La proposition  $(\neg Q) \rightarrow (\neg P)$  s'appelle la contraposée de  $P \rightarrow Q$

de



# Forme propositionnelle

## Classe propositionnelle

Soient C et D deux classes dont on présente que la dernière colonne.

C	D	$\neg C$	$C \wedge D$	$C \vee D$
V	V	F	V	V
F	F	V	F	F
F	V	V	F	V
V	F	F	F	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	F
F	V	V	F	V

## Propriétés propositionnelles

### Idempotence

- $C1 \vee V = V$
- $C1 \wedge V = C1$
- $C1 \vee F = C1$
- $C1 \wedge F = F$
- $C1 \vee C1 = C1$
- $C1 \wedge C1 = C1$

### Distributivité

- $C1 \vee (C2 \wedge C3) = (C1 \vee C2) \wedge (C1 \vee C3)$
- $C1 \wedge (C2 \vee C3) = (C1 \wedge C2) \vee (C1 \wedge C3)$
- $C1 \wedge (C5 \vee C8 \vee C1 \vee C2) = C1$
- $C1 \vee (C5 \wedge C8 \wedge C1 \wedge C2) = C1$

## Propriétés propositionnelles

### Loi de la double négation

- $C1 \vee (\neg C1) = V$
- $C1 \wedge (\neg C1) = F$
- $\neg (\neg (C1)) = C1$
- $\neg F = V$

### Lois de Morgan

- $\neg(C1 \vee C2) = (\neg C1) \wedge (\neg C2)$
- $\neg(C1 \wedge C2) = (\neg C1) \vee (\neg C2)$