


Метод распознавания текстовых блоков



3 text text OCR conf 1.000

В своей статье Системы кривых, связанные с главной коинцидентностью коннекса (x, p, u) (Матем. Сборник XXVII Зс. 346—359), доложенной на 12-ом Съезде Р. Ест. и Врачей 5. 1 1910, я дал уравнение в полных дифференциалах 2-го порядка, связанное с главной коинцидентностью такого коннекса, как в точечных координатах, так и в тангенциальных-плоскостных. Как я там и указывал (§ 2, прим. на стр. 352), можно построить уравнение, которое выражало бы те же одномерные интегральные многообразия в координатах прямых.

Это нетрудно выполнить, если воспользоваться теми формулами, которые с этой целью были выведены мною в статье «Координаты точки пересечения двух прямых в пространстве и плоскости, определяемой этими прямыми». Сообщ. Харьк. Мат. Общ. (2) т. XI с. 286—290, 1910.

Возьмем две бесконечно-близкие прямые p и $p+dp$. Координаты точки их пересечения, если взять систему формул A) указанной статьи, выразятся:

ORDER 3	BBOX [48, 491, 1127, 962]	CONFIDENCE 1.000
CONTENT В своей статье Системы кривых, связанные с главной коинцидентностью коннекса (x, p, u) (Матем. Сборник XXVII Зс. 346—359), доложенной на 12-ом Съезде Р. Ест. и Врачей 5. 1 1910, я дал уравнение в полных дифференциалах 2-го порядка, связанное с главной коинцидентностью такого коннекса, как в точечных координатах, так и в тангенциальных-плоскостных.	RAW OCR В своей статье Системы кривых, связанные с главной коинцидентностью коннекса (x, p, u) (Матем. Сборник XXVII Зс. 346—359), доложенной на 12-ом Съезде Р. Ест. и Врачей 5. 1 1910, я дал уравнение в полных дифференциалах 2-го порядка, связанное с главной коинцидентностью такого коннекса, как в то—	CROP

Метрики модуля:

- обработано текстовых блоков: 60
- средний confidence: 0.921
- блоков с needs_review: 6%