

1. $\int_{-\pi}^{\pi} (x \cos^4 x + 1) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 $\int_{-\pi}^{\pi} (x \cos^4 x + 1) dx = \int_{-\pi}^{\pi} x \cos^4 x dx + \int_{-\pi}^{\pi} 1 dx = 0 + 2\pi = 2\pi.$

2. 对正常数 a , $\int_0^{+\infty} e^{-ax} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 原式 $= \frac{1}{-a} \int_0^{+\infty} e^{-ax} d(-ax) = \frac{1}{-a} e^{-ax} \Big|_0^{+\infty} = \frac{1}{-a} (\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{ax}} - e^0) = \frac{1}{a}.$

3. $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x^3} dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 $\int_0^{+\infty} x^2 e^{-x^3} dx = -\frac{1}{3} \int_0^{+\infty} e^{-x^3} d(-x^3) = -\frac{1}{3} e^{-x^3} \Big|_0^{+\infty} = -\frac{1}{3} (\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{e^{x^3}} - e^0) = \frac{1}{3}.$

4. $\int_0^{2\pi} |\cos x| dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 $\int_0^{2\pi} |\cos x| dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx + \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (-\cos x) dx + \int_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} \cos x dx$
 $= \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \sin x \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} + \sin x \Big|_{\frac{3\pi}{2}}^{2\pi} = (1-0) - (-1-1) + [0-(-1)] = 4.$

5. 设函数 $f(x) = \frac{1}{1+x} + x^2 \int_0^1 f(x) dx$, 则 $\int_0^1 f(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 因为 $\int_0^1 f(x) dx$ 为常数, 故在 $f(x) = \frac{1}{1+x} + x^2 \int_0^1 f(x) dx$ 两边对 x 从 0 到 1 积分得,

$\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 \frac{1}{1+x} dx + \int_0^1 [x^2 \int_0^1 f(x) dx] dx = \ln|1+x| \Big|_0^1 + \int_0^1 f(x) dx \int_0^1 x^2 dx,$
 $= \ln 2 + \frac{1}{3} \int_0^1 f(x) dx, \text{ 故 } \int_0^1 f(x) dx = \frac{3}{2} \ln 2.$

6. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{x^2} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解 因为 $x \rightarrow 0$ 时, $\cos x \rightarrow 1$, 从而 $\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt \rightarrow 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{x^2}$ 是 $\frac{0}{0}$ 型极限。注意

到 $\frac{d}{dx} (\int_1^{\cos x} e^{-t^2} dt) = e^{-\cos^2 x} \cdot (\cos x)' = -\sin x e^{-\cos^2 x}$, 于是由洛必达法则得

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_{\cos x}^1 e^{-t^2} dt}{x^2} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_1^{\cos x} e^{-t^2} dt}{x^2} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x e^{-\cos^2 x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{-\cos^2 x} \cdot \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} = e^{-1} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2e}.$

7. 设 $f(x) = \begin{cases} x, & -\pi < x < 0, \\ xe^{-x^2}, & x \geq 0, \end{cases}$, 求 $\int_1^4 f(x-2)dx$

解 令 $t = x - 2$, 则 $dx = dt$,

$$\begin{aligned} \int_1^4 f(x-2)dx &= \int_{-1}^2 f(t)dt = \int_{-1}^0 tdt + \int_0^2 te^{-t^2} dt = \frac{1}{2}t^2 \Big|_{-1}^0 - \frac{1}{2} \int_0^2 e^{-t^2} d(-t^2) \\ &= \frac{1}{2}(0-1) - \frac{1}{2}e^{-t^2} \Big|_0^2 = -\frac{1}{2} - \frac{1}{2}(e^{-4} - e^0) = -\frac{1}{2e^4} \end{aligned}$$

8. 计算 $\int_1^{e^2} \frac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}}$.

解 $\int_1^{e^2} \frac{dx}{x\sqrt{1+\ln x}} = \int_1^{e^2} \frac{d\ln|x|}{\sqrt{1+\ln x}} = \int_1^{e^2} \frac{d\ln x}{\sqrt{1+\ln x}} = \int_1^{e^2} \frac{d(1+\ln x)}{\sqrt{1+\ln x}} = 2 \int_1^{e^2} \frac{d(1+\ln x)}{2\sqrt{1+\ln x}}$

$$\underline{\underline{u=1+\ln x}} \quad 2 \int_1^3 \frac{du}{2\sqrt{u}} = 2\sqrt{u} \Big|_1^3 = 2(\sqrt{3}-1) = 2(\sqrt{3}-1)$$

9. 计算 $\int_0^4 \frac{\sqrt{x}dx}{1+x\sqrt{x}}$.

解 $\int_0^4 \frac{\sqrt{x}dx}{1+x\sqrt{x}} \xrightarrow{t=\sqrt{x}} \int_0^2 \frac{t \cdot 2tdt}{1+t^2 \cdot t} = 2 \int_0^2 \frac{t^2 dt}{1+t^3} = \frac{2}{3} \int_0^2 \frac{dt^3}{1+t^3} = \frac{2}{3} \int_0^2 \frac{dt^3}{1+t^3} = \frac{2}{3} \int_0^2 \frac{d(1+t^3)}{1+t^3}$

$$= \frac{2}{3} \ln|1+t^3| \Big|_0^2 = \frac{2}{3} (2\ln 3 - 0) = \frac{4}{3} \ln 3$$

10. 求函数 $f(x) = \int_{-1}^x (1-2t)dt$ 的极值及 $f(x)$ 在 $[-1,2]$ 上的最值.

解 由函数 $f(x) = \int_{-1}^x (1-2t)dt$ 得 $f(x) = (t-t^2) \Big|_{-1}^x = x-x^2 - (-1-1) = 2+x-x^2$, 于是 $f'(x) = 1-2x$, $f''(x) = -2$, 驻点 $x = \frac{1}{2}$; 因为 $f''(\frac{1}{2}) = -2 < 0$, 故根据极值判定的第二充分条件知, $f(x)$ 有极大值 $f(\frac{1}{2}) = 2 + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} = \frac{9}{4}$.

又 $f(-1) = 0$, $f(2) = 2 + 2 - 2^2 = 0$, 故函数最大值为 $\frac{9}{4}$, 最小值为 0 .

11. 设函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x (x-t)f(t)dt = xe^{-x}$ ，求 $f(x)$ 的极值。

解 由于积分变量是 t ，故相对于 t ， x 可看成常数。于是

$\int_0^x (x-t)f(t)dt = \int_0^x [xf(t) - tf(t)]dt = \int_0^x xf(t)dt - \int_0^x tf(t)dt = x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt$ 。在 $x \int_0^x f(t)dt - \int_0^x tf(t)dt = xe^{-x}$ 两边对 x 求导得 $\int_0^x f(t)dt + xf(x) - xf(x) = (1-x)e^{-x}$ ，两边再对 x 求导得 $f(x) = (x-2)e^{-x}$ ，于是 $f'(x) = (3-x)e^{-x}$ ， $f''(x) = (x-4)e^{-x}$ ，驻点 $x=3$ ；因为 $f''(3) = -e^{-3} < 0$ ，故由极值判定的第二充分条件知， $f(x)$ 有极大值 $f(3) = e^{-3}$ 。

12. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，在 (a, b) 内可导，且 $f'(x) \leq 0$ ，

$F(x) = \frac{1}{x-a} \int_a^x f(t)dt$ 。证明在 (a, b) 内有 $F'(x) \leq 0$ 。

证 (1) $F'(x) = \frac{f(x)(x-a) - \int_a^x f(t)dt}{(x-a)^2}$ 。

(2) 由积分中值定理，得 $\int_a^x f(t)dt = f(\xi)(x-a)$ ， $\xi \in [a, x]$ ，再由拉格朗日中值定理得， $F'(x) = \frac{f(x)(x-a) - f(\xi)(x-a)}{(x-a)^2} = \frac{f(x) - f(\xi)}{x-a} = \frac{f'(\eta)(x-\xi)}{x-a} \leq 0$ ，

这里 $\eta \in (\xi, x) \subseteq (a, x) \subseteq (a, b)$ 。

13. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内可导，且 $f(0) = 3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x)dx$ ，证明至少

存在一点 $\xi \in (0, 1)$ ，使得 $f'(\xi) = 0$ 。

证 由积分中值定理知，存在 $\eta \in [\frac{2}{3}, 1]$ ，使得 $f(0) = 3f(\eta)(1 - \frac{2}{3}) = f(\eta)$ ，再由罗尔定理知，至少存在一点 $\xi \in (0, \eta) \subseteq (0, 1)$ ，使得 $f'(\xi) = 0$ 。