【4枚目】社内限定・データ整備リファレンス

（上段＝新商品採用時チェックリスト　／　下段＝剤形・医薬品区分の基礎知識）

新商品採用時チェックリスト　※package_verification.csvへの追加担当者向け

STEP1　OTC添付文書の「成分欄」を確認

「成分（N錠中）」の表記は、成人の1日量とみなしてよい。

＊ただし、毎食後に加えて就寝前も服用可等、頓服的に追加可能で1日上限量が可変な場合は、実際の最大服用回数で計算し直す。

STEP2　OTC添付文書の「用法用量欄」を確認

指定濫用防止医薬品の判定は、用法用量が年齢で異なる場合「1日当たりの用量が最も多い年齢」の数量で判断する（医薬発0213第2号、令和8年2月13日）。

多くの製品では実質的に15歳以上の用量が最大になる。小児用量・「適宜増減」は使わない。

STEP3　消費日数を計算し、小容量/大容量を判定

包装数量 ÷ 1日量 ＝ 消費日数。消費日数が基準日数（×7または×5）以下なら小容量、超過なら大容量（1枚目のドリルと同じ計算式）。

STEP4　管理表の作成

（例）package_verification.csv

列の意味：product=商品名／kubun=区分記号(〇:対象品)／package=包装規格／days=消費日数(日)／judgment=容量判定(小容量,大容量)／limit=基準日数(7日 or 5日)／note=備考／ingredients=対象成分／daily_dose=1日量(錠・包等)

入力例（改源 26包）：product=改源, kubun=〇, package=26包, days=8.7, judgment=大容量,
limit=7, ingredients=メチルエフェドリン, daily_dose=3

剤形・医薬品区分の基礎知識

剤形の基本ルール：トローチ（外用）と医薬品ドロップ（内服）は扱いが異なります

■ トローチ・舌下錠などの口腔用錠剤／含嗽剤／口腔用スプレー＝「外用剤」（対象外）

令和8年2月13日の局長通知で、外用剤に「口腔内に適用する製剤（口腔用錠剤（トローチ剤、バッカル錠等）等）」が含まれると明記。

指定8成分はいずれも外用剤を除くため、指定成分を含んでいても対象外。

■ 医薬品のドロップ（のど飴形状）＝「内服」扱い（成分で判定）

トローチとは別に扱い、内服薬と同じく成分欄を確認する。指定成分が入っていれば販売制限の対象。

例：ルルメディカルドロップ（dl-メチルエフェドリン配合、指定第2類医薬品）。古い通知ではドロップもトローチと同じ扱いだったため、旧資料の記載に注意。

「市販ののど飴」の3つのグラデーション

医薬品のドロップ（内服）	浅田飴、ルルメディカルドロップ等⇒指定成分があれば規制対象
指定医薬部外品（のど飴）	ヴィックスメディケイテッドドロップ、ルルのど飴等⇒医薬品ではない（指定成分を配合できない）ため対象外
食品（普通の飴）	龍角散ののど飴、カンロのど飴等⇒お菓子のため対象外

＊店頭で「ドロップ・のど飴」を見るときは、パッケージに「第〇類医薬品」の表示があるかをまず確認し、
医薬品なら成分欄をチェックする（トローチ剤・医薬部外品・食品は対象外）。

医薬品の区分（参考）　※新成分は原則3年間の監視期間で区分見直しの可能性あり

要指導医薬品	薬剤師による対面販売必須。ネット通販不可。購入時に書面での説明と確認がある最上位規制。
第1類医薬品	薬剤師による販売必須。ネット通販は可能だが、購入前にメール等での確認ステップがある。
指定第2類医薬品	登録販売者でも販売可能。禁忌の確認が推奨される（妊婦・ぜんそく既往・依存リスク等）。
	＝＝＝ここまでが「指定濫用防止成分を配合できる」区分＝＝＝
第2類医薬品	強い禁忌や深刻な依存性はない成分。多くの漢方薬・胃腸薬・一部の目薬等が該当。
第3類医薬品	購入時の法的制限が最も緩い、副作用リスクが低い日常的なお薬（ビタミン剤等）。
指定医薬部外品／医薬部外品／食品	指定濫用防止成分は配合不可（指定医薬部外品はコンビニ販売可、「殺菌・消毒／声がれ」等の文言が可）。

準拠: 厚生労働省 局長通知「指定濫用防止医薬品の指定について」/JSMI「指定濫用防止医薬品の販売制度について」/兵庫県 薬務課 制度改正資料