

薬剤別 包装区分 早見表

① 18歳未満：	小容量1個のみ販売可（氏名・年齢確認+他店購入状況確認が必須）。大容量・複数個の購入は理由確認が必須（正当な理由がなければ販売不可）
② 18歳以上：	小容量は通常販売可（他店購入状況確認は必須）。大容量・複数個の購入は理由確認が必須（正当な理由がなければ販売不可）
③ 年齢確認：	見た目で18歳以上と判断できない場合、学生証・健康保険証・マイナンバーカード・運転免許証等の身分証で氏名・年齢を確認
④ 商品の確認：	下表で商品名を検索し「小包装/大包装」どちらの区分か確認（ ×7 =かぜ薬・解熱鎮痛薬・鼻炎用内服薬/ ×5 =それ以外） ※×7区分は、風邪の諸症状や長引く頭痛・鼻炎など症状が1週間程度続くことが臨床も多いための設定です 表にない商品は判定アプリ(右下QR)で確認
よくある質問：	対象薬を種類違いで1個ずつ購入→複数個扱いで販売不可/身分証の提示が難しい→年齢・氏名を確認できる方法がないか丁寧に確認

計算手順：	①分類で基準日数(×7=かぜ薬等/×5=それ以外) ②1日最大服用量を確認 ③総量÷1日量=消費日数 ④基準日数以下=小容量/超=大容量
成分判別：	● 対象(指定8成分)=エフェドリン/メチルエフェドリン/ブソイドエフェドリン/コデイン/ジビドロコデイン/デキストロメトルファン/ジフェンヒドラミン/プロモバレルリ尿素 ● 対象外(粉らわしい)=生薬マオウ/無水カフェイン/プロメタジン等の他の抗ヒス/アリルイソプロピルアセチル尿素 ● 対象外(剤形)=トローチ・のど飴は「口腔内用剤」のため、指定成分を含んでいても対象外（軟膏等の外用剤と同様の扱い）
ブランド連断：	外用薬・のどスプレー等は全て対象外。原則対象:ルル・パブロン(50除く)・ベンザブロック 対象外:セデス・ノーション・パファリン・イブ ※正式ルールではなく参考の目安

薬剤名

対象成分

1日量

区分

小包装

境界

大包装

レジ確認フロー

小包装＝単品1個は18歳未満も可/大包装＝18歳未満へ不可

1日量＝成人(15歳以上)の1日最大服用量

※年齢に関わらず、この判別は常に「成人(15歳以上)の1日量」で計算します（18歳未満の購入者でも同じ）

アネトンせき止め錠

コデイン, メチルエフェドリン

12錠

×5

48錠

60錠

18歳未満の疑い
→身分証等で氏名・年齢を確認

ウット

プロモバレルリ尿素, ジフェンヒドラミン

3錠

×5

9錠 12錠

15錠

ドリエル

ジフェンヒドラミン

2錠

×5

6錠

10錠

12錠

ナロン錠

プロモバレルリ尿素

6錠

×7

24錠

42錠

48錠

小容量1個のみ
購入？

パイロンPL錠 ゴールド

デキストロメトルファン

6錠

×7

18錠 30錠

42錠

パブロンゴールドA〈錠〉

ジビドロコデイン, メチルエフェドリン

9錠

×7

63錠

130錠 210錠

ベンザブロックIP※

メチルエフェドリン, ジビドロコデイン

6錠

×7

18錠 30錠

42錠

【いいえ】大容量/複数個
→18歳未満は一律禁止
18歳以上は理由を確認

ベンザブロックIPプレミアム※

メチルエフェドリン, ジビドロコデイン

6錠

×7

12錠 24錠

42錠

ベンザブロックIP錠

メチルエフェドリン, ジビドロコデイン

9錠

×7

30錠 45錠

63錠

ベンザブロックL※

ブソイドエフェドリン, ジビドロコデイン

6錠

×7

18錠 30錠

42錠

【はい】小容量1個
→18歳未満は氏名+周辺状況確認
18歳以上は理由を確認

ベンザブロックLプレミアムDX※

デキストロメトルファン, ブソイドエフェドリン

6錠

×7

12錠 24錠

42錠

ベンザブロックLプレミアムDX錠

デキストロメトルファン, ブソイドエフェドリン

9錠

×7

30錠 45錠

63錠

ベンザブロックS※

ジビドロコデイン, メチルエフェドリン

6錠

×7

18錠 30錠

42錠

条件を満たせば
販売可

ベンザブロックSプレミアムDX※

デキストロメトルファン, ブソイドエフェドリン

6錠

×7

12錠 24錠

42錠

ベンザブロックTプレミアムDX※

ジビドロコデイン, dl-メチルエフェドリン

6錠

×7

12錠 24錠

42錠

メジコンせき止め錠Pro

デキストロメトルファン

6錠

×5

20錠

30錠

40錠

80錠 120錠

レスタミンコーワ糖衣錠

ジフェンヒドラミン

9錠

×5

45錠

ロキソニン総合かぜ薬

ジビドロコデイン, メチルエフェドリン

6錠

×7

12錠 24錠

42錠

新ブロン液エース

ジビドロコデイン

60mL

×5

120mL

300mL

新ルルAゴールドDXα

デキストロメトルファン, メチルエフェドリン

9錠

×7

30錠 60錠

63錠

90錠

※＝カプレット表記（ベンザブロック○○/末尾「錠」なし）。1日成分量は「○○錠」と同一ですが服用粒数が異なります。

判定注意・参考	指定濫用判定	同ブランド内比較・注釈（「対比:」＝取り違い注意ポイント）
アレグラFX (2錠中)フェキソフェナジン120mg	【対象外】	対比: FX(通常版)は対象外/プレミアムのみ血管収縮剤(ブソイドエフェドリン)追加で該当。
コリホグス (2錠中)クロルゾキサソソ300mg/エテンザミド300mg/カフェイ...	【対象外】	中枢抑制作用による呼吸抑制リスク。アルコール・ベンゾ系併用/ODに要注意。
トラベルミンR (1錠中)ジフェニドール16, 6mg/スコボラミン0, 16mg/無水...	【対象外】	対比: R・ジュニア・ファミリー・「1」は対象外/無印(大人用)のみジフェンヒドラミン含有で該当。
ナロン錠 (2錠中)アセトアミノフェン265mg/エテンザミド300mg/プロ...	この商品名は【該当】	対比: エースT・m等は対象外/ナロン錠・顆粒のみプロモバレルリ尿素含有で該当。
新コンタック鼻炎Z (1錠中)セチリジン10mg	【対象外】	対比: 鼻炎Zのみ対象外(唯一制限成分なし)/600プラス・かぜ総合等は該当。※セチリジンは妊婦禁忌。
新ルルAゴールドDXα (9錠中)クレマスチン/ペラドンナ錠アルカロイド/プロムヘキシソ/ト...	この商品名は【該当】	対比: のど飴・トローチ(部外品)は対象外/内服かぜ薬・メディカルドロップは該当。
葛根湯エキス錠S「コタロー」 (12錠中)葛根湯エキス2, 2g(カッコン/マオウ/タイソウ/ケイヒ...	【対象外】	対比: 葛根湯・小青竜湯等の漢方製剤は対象外(マオウは化学成分外で規制対象外)。

レジでの必須確認事項 ※該当する場合は裏面「状況別対応のポイント」を参照

- 【年齢・氏名】18歳未満ですか？（※18歳未満への大容量・複数個は理由問わず一律販売不可。小容量1個のみ可。氏名・年齢の記録が必須）
 - 【重複】本日、他店や他のレジで同じお薬（風邪薬、咳止め等）のご購入はありませんか？（譲り受けも含みます）
- 以下は、お薬の安全な選択に関わります。
- 【体質】アレルギー歴（アスピリン喘息等）や、喘息、不整脈、緑内障、前立腺肥大の持病はありますか？
 - 【併用】現在、病院で処方されたお薬や、他のお薬を飲まれていますか？（SSRI等との重複防止）
 - 【妊婦】妊娠中、または授乳中ではありませんか？（妊娠後期のNSAIDs禁忌、授乳中のコデイン避止）
- ＋【使用者】今回のお薬は、どなた（ご本人様/12歳未満の小児等）が使われますか？
- ＋ いつから、どの程度の症状ですか？（適正な使用期間の確認、長引く場合は受診勧奨を判断します）
- ＋【大容量・複数個（成人）】ご事情をお伺いできますか？（※正当な使用理由が確認できない場合は販売不可）

免責：過去に用法用量超過の自己判断服用で重篤な健康被害が生じた事例を踏まえた確認です。意図的な過量服薬は保証・救済制度の対象外です。

参照：厚生労働省 通知長通知「指定濫用防止医薬品の指定について」・厚生労働大臣が定める数量（告示）/JSMI「指定濫用防止医薬品の販売制度について」/兵庫県 薬務課 制度改定資料



判定アプリ
(表にない商品はこちら)
aimoor.nghaiku.github.io/shana-gatekeeper/



ご意見・改善案

【裏面】指定濫用防止医薬品 参考資料集

(厚労省・薬局配布資料の要点を再構成 / 下段＝状況別対応のポイント)

参考① 購入者への提示例

元資料：指定濫用防止医薬品をご購入時フリップ

指定濫用防止医薬品の濫用をした場合、
保健衛生上の危害が発生するおそれがあります。

販売にあたり、OTC医薬品の各区分で確認する事項に加え、
以下を確認させていただきます。

<確認事項>

- ☐ 年齢
- ☐ 18歳未満の場合は当該者の氏名
- ☐ 他の薬剤・医薬品の使用状況
- ☐ 当該製品/他の指定濫用防止医薬品の購入・譲り受け状況
- ☐ 大容量・複数個購入の場合、その理由
- ☐ 適正な使用であることを確認するために必要な事項
- ☐ その他、情報提供に必要な事項

<情報提供内容>

①名称②有効成分と分量③用法用量④効果効果⑤その他薬剤師が適正使用に必要と
判断する事項

※適正な使用を確保できないと判断した場合は販売を行いません。

参考② 制度改正のお知らせ

元資料：薬物濫用ポスター「大切なお知らせ」販売方法の変更

2026.5/1から、
法律で「指定濫用防止医薬品」と定められた製品は販売方法が変わり
ます。

※市販薬の不適正使用による健康被害が報告されています。

購入時に確認・説明があります（原則、使用者本人への販売）

確認の流れ：①購入数→②年齢確認→③使用状況→④販売可否

（詳細は表面「レジでの必須確認事項」を参照）

対象商品には「要確認」等の表示がある場合があります（不明な点は薬剤師・登録
販売者へ）。

<対象8成分>
エフェドリン/コデイン/ジヒドロコデイン/ジフェンヒドラミン/デキストロメトル
ファン/ブソイドエフェドリン/プロムワレルリ尿酸/メチルエフェドリン

参考③ 来店～販売可否フロー

元資料：「販売可否判断フローチャート」OTCマニュアル(第2版)



④ 状況別対応のポイント

※現場で遭遇しやすい主要な注意点の抜粋です。全てを網羅するものではありません。

①②年齢・重複

18歳未満/複数個(他店合算)を希望

▶一律禁止：18歳未満への大容量・複数個(種類違い含む)は理由問わず販売
不可。

家族用でも例外なし。

▶絶対禁忌：12歳未満はコデイン系(ジヒドロコデイン含む)。

処方・市販とも不可、他成分の咳止めへ。

▶身分証拒否：年齢確認不能のため販売不可。

③体質(アレルギー)

解熱鎮痛薬でアレルギー歴

▶ピリン疹：NSAIDs（ロキソプロフェン等）へ代替可。

▶アスピリン喘息：NSAIDs全般に100%交差耐性で全てNG⇒AAP単剤のみ提案。

③体質(喘息・不整脈等)

喘息/不整脈/緑内障/前立腺肥大/高血圧

・糖尿病等

▶抗コリン薬・第一世代抗ヒスタミン：喘息=痰粘稠化・排痰困難、
不整脈=頻脈・QT延長。

▶緑内障=眼圧上昇、前立腺肥大=尿閉リスク。単一成分薬を推奨。

▶禁忌・要注意：ブソイドエフェドリンは交感神経刺激作用が強く、

前立腺肥大・緑内障に加え高血圧症・心疾患(不整脈/虚血性心疾患)・糖尿病・
甲状腺機能亢進症も対象(抗コリン作用とは別ルート)。

④併用

SSRI服用中/他剤併用

▶最重要：DXM×SSRIはセロトニン症候群リスク（濫用防止領域で最も急性致
死率が高い相互作用）。

▶GFJはDXM血中濃度上昇。

マクロライド系/アゾール系薬はQT延長・心室頻拍に注意。

※運転

運転前後の服用を心配されたら

▶最も排泄が遅い成分を基準に判断（半減期の長い成分ほど翌日に持ち越しやすい）

成分（世代/分岐）	半減期	⇒ 回避目安
クロルフェニラミン(第1)	12～24h	24h(翌日まで)
プロメタジン(第1)	10～14h	12～24h
プロモバレルリ尿酸	約15h	24h(翌日まで)
ジフェンヒドラミン(第1)	約9h	12h(当日NG)
セチリジン(第2)	7～10h	当日NG
ペタスチン(第2)	約2.4h	当日中禁止
アゼラスチン(第2)	約24h	当日中禁止
ブチルスコバミン(抗コリン)	約1.5h	5～6h(当日中禁)
d-メチルエフェドリン	約5～6h	8～12h
デキストロメトルファン	約3.5h	6～8h

⑤妊婦・授乳

妊娠中/授乳中と判明

▶禁忌：妊娠後期のコデイン系（パブロン/ルル等）
は新生児呼吸抑制⇒メジコン等単剤(DXM)を提案。

▶一律禁忌：抗コリン薬（ブスコパン等）

はOTCで一律不可（処方箋なら有益性投与可）。

授乳中は母乳分泌低下・乳児頻脈で中断。

▶禁忌：コンタック鼻炎Z(セチリジン/第2世代)は動物実験で胎児毒性報告あり
添付文書上「妊婦投与禁忌」。

第1世代クロルフェニラミンは比較的安全。

※成分の落とし穴・過量服薬

長期連用・依存・過量服薬の疑い

▶ウレイド系（プロモバレルリ尿酸等）

：長期乱用で臭素蓄積⇒歩行困難・幻覚。高齢者はせん妄・認知低下も。

▶MOH：月15日以上頭痛の環境で複合鎮痛薬を月10日超・3ヶ月超服用⇒薬剤
乱用頭痛に進展。

▶過量服薬：初日=急性心毒性(無水カフェイン等)、
3日目以降=劇症肝不全(AAP)が急速進行。

NSAIDsは自覚症状ありだがAAPは無症状のまま進行。

※外用薬・アンナカ

外用薬/無水カフェインの質問

▶対象外：軟膏・クリーム・目薬等の外用剤は成分含有でも規制対象外。

▶対象外：トロロチ・のど飴も「口腔内用剤」のため、

指定成分を含んでいても対象外。

▶対象外：アンナカ(無水カフェイン)はお茶・コーヒー等にも含まれ一律規
制が非現実的（危険性は認識）。

授乳婦指導（成分別の目安）：

● AAP/イブプロフェン/無水カフェイン(通常量) ⇒ 通常授乳可

● DXM/ジフェンヒドラミン(短期) ⇒ 服薬後2-4h授乳回避

● クロルフェニラミン(長期)/プロメタジン/プロモバレルリ尿酸 ⇒ 搾乳破
薬(半減期×3-4h)

■ コデイン/ジヒドロコデイン(乳児モルヒネ代謝リスク) ⇒ 代替薬へ変更提
案