

薬剤別 包装区分 早見表

① 18歳未満:	小容量1個のみ販売可（氏名・年齢確認+他店購入状況確認が必須）。大容量・複数個(種類違いの対象薬も合算)は家族用でも理由問わず一律禁止（販売不可）
② 18歳以上:	小容量は通常販売可（他店購入状況確認は必須）。大容量・複数個の購入は理由確認が必須（正当な理由がなければ販売不可）
③ 年齢確認:	見た目で18歳以上と判断できない場合、学生証・健康保険証・マイナンバーカード・運転免許証等の身分証で氏名・年齢を確認
④ 商品の確認:	下表で商品名を検索し「小包装/大包装」どちらの区分か確認（ ×7 =かぜ薬・解熱鎮痛薬・鼻炎用内服薬/ ×5 =それ以外） ※×7区分は、風邪の諸症状や長引く頭痛・鼻炎など症状が1週間程度続くことが臨床上で多いための設定です 表にない商品は判定アプリ(右下QR)で確認
よくある質問:	対象薬を種類違いで1個ずつ購入→複数個扱いで販売不可/身分証の提示が難しい→年齢・氏名を確認できる方法がないか丁寧に確認

計算手順:	①分類で基準日数(×7=かぜ薬等/×5=それ以外) ②1日最大服用量を確認 ③総量÷1日量=消費日数 ④基準日数以下=小容量/超=大容量
成分判別:	● 対象(指定8成分)=エフェドリン/メチルエフェドリン/プソイドエフェドリン/コデイン/ジヒドロコデイン/デキストロメトルファン/ジフェンヒドラミン/プロモバレリル尿素 ● 対象外(紛らわしい)=生薬マオウ/無水カフェイン/プロメタジン等の他の抗ヒス/アリルイソプロピルアセチル尿素
ブランド速断:	外用薬・のどスプレー等は全て対象外。原則対象:ルル・パブロン(50除く)・ベンザブロック 対象外:セデス・ノーション・パファリン・イブ ※正式ルールではなく参考の目安

薬剤名	対象成分	1日量	区分	小包装	境界	大包装	レジ確認フロー
小包装＝単品1個は18歳未満も可/大包装＝18歳未満へ不可 1日量＝成人(15歳以上)の1日最大服用量							
※年齢に関わらず、この判別は常に「成人(15歳以上)の1日量」で計算します（18歳未満の購入者でも同じ）							

アネトンせき止め錠	コデイン, メチルエフェドリン	12錠	×5	48錠	60錠	
ウット	プロモバレリル尿素, ジフェンヒドラミン	3錠	×5	9錠 12錠	15錠	
ドリエル	ジフェンヒドラミン	2錠	×5	6錠	10錠	12錠
ナロン錠	プロモバレリル尿素	6錠	×7	24錠	42錠	48錠
パイロンPL錠 ゴールド	デキストロメトルファン	6錠	×7	18錠 30錠	42錠	
パブロンゴールドA〈錠〉	ジヒドロコデイン, メチルエフェドリン	9錠	×7		63錠	130錠 210錠
ベンザブロックIP※	メチルエフェドリン, ジヒドロコデイン	6錠	×7	18錠 30錠	42錠	
ベンザブロックIPプレミアム※	メチルエフェドリン, ジヒドロコデイン	6錠	×7	12錠 24錠	42錠	
ベンザブロックIP錠	メチルエフェドリン, ジヒドロコデイン	9錠	×7	30錠 45錠	63錠	
ベンザブロックL※	プソイドエフェドリン, ジヒドロコデイン	6錠	×7	18錠 30錠	42錠	
ベンザブロックLプレミアムDX※	デキストロメトルファン, プソイドエフェドリン	6錠	×7	12錠 24錠	42錠	
ベンザブロックLプレミアムDX錠	デキストロメトルファン, プソイドエフェドリン	9錠	×7	30錠 45錠	63錠	
ベンザブロックS※	ジヒドロコデイン, メチルエフェドリン	6錠	×7	18錠 30錠	42錠	
ベンザブロックSプレミアムDX※	デキストロメトルファン, プソイドエフェドリン	6錠	×7	12錠 24錠	42錠	
ベンザブロックTプレミアムDX※	ジヒドロコデイン, dl-メチルエフェドリン	6錠	×7	12錠 24錠	42錠	
メジコンせき止め錠Pro	デキストロメトルファン	6錠	×5	20錠	30錠	40錠
レスタミンコーワ糖衣錠	ジフェンヒドラミン	9錠	×5		45錠	80錠 120錠
ロキソニン総合かぜ薬	ジヒドロコデイン, メチルエフェドリン	6錠	×7	12錠 24錠	42錠	
新ブロン液エース	ジヒドロコデイン	60mL	×5	120mL	300mL	
新ルルAゴールドDXα	デキストロメトルファン, メチルエフェドリン	9錠	×7	30錠 60錠	63錠	90錠

※＝カプレット表記（ベンザブロック○○/末尾「錠」なし）。1日成分量は「○○錠」と同一ですが服用粒数が異なります。

判定注意・参考	指定濫用判定	同ブランド内比較・注釈（「対比:」＝取り違え注意ポイント）
---------	--------	-------------------------------

アレグラFX (2錠中) フェキシソフェナジン120mg	【対象外】	対比: FX(通常版)は対象外/プレミアムのみ血管収縮剤(プソイドエフェドリン)追加で該当。
コリホグス (2錠中) クロルソキサソノ300mg/エテンザミド300mg/カフェイ…	【対象外】	中枢抑制作用による呼吸抑制リスク。アルコール・ベンゾ系併用/ODに要注意。
トラベルミンR (1錠中) ジフェニドール16.6mg/スコボラミン0.16mg/無水…	【対象外】	対比: R・ジュニア・ファミリー・「1」は対象外/無印(大人用)のみジフェンヒドラミン含有で該当。
ナロン錠 (2錠中) アセトアミノフェン265mg/エテンザミド300mg/プロ…	この商品名は【該当】	対比: エースT・m等は対象外/ナロン錠・顆粒のみプロモバレリル尿素含有で該当。
新コンタック鼻炎Z (1錠中) セチリジン10mg	【対象外】	対比: 鼻炎Zのみ対象外(唯一制限成分なし)/600プラス・かぜ総合等は該当。※セチリジンは妊婦禁忌。
新ルルAゴールドDXα (9錠中) クレマスチン/ペラドンナ総アルカロイド/プロムヘキシノ/ト…	この商品名は【該当】	対比: のど飴・トローチ(部外品)は対象外/内服かぜ薬・メディカルドロップは該当。
葛根湯エキス錠S「コタロー」 (12錠中) 葛根湯エキス2.2g(カッコン/マオウ/タイソウ/ケイヒ…	【対象外】	対比: 葛根湯・小青竜湯等の漢方製剤は対象外(マオウは化学成分外で規制対象外)。

レジでの必須確認事項 ※該当する場合は裏面「状況別対応のポイント」を参照

- ①【年齢・氏名】18歳未満ですか？（※18歳未満への大容量・複数個は理由問わず一律販売不可。小容量1個のみ可。氏名・年齢の記録が必須）
- ②【重複】本日、他店や他のレジで同じお薬（風邪薬、咳止め等）のご購入はありませんか？（譲り受けも含みます）
- 以下は、お薬の安全な選択に関わります。
- ③【体質】アレルギー歴（アスピリン喘息等）や、喘息、不整脈、緑内障、前立腺肥大の持病はありますか？
- ④【併用】現在、病院で処方されたお薬や、他のお薬を飲まれていますか？（SSRI等との重複防止）
- ⑤【妊婦】妊娠中、または授乳中ではありませんか？（妊娠後期のNSAIDs禁忌、授乳中のコデイン避止）
- +【使用者】今回のお薬は、どなた（ご本人様／12歳未満の小児等）が使われますか？
- + いつから、どの程度の症状ですか？（適正な使用期間の確認、長引く場合は受診勧奨を判断します）
- + 【大容量・複数個（成人）】ご事情をお伺いできますか？（※正当な使用理由が確認できない場合は販売不可）



判定アプリ
(表にない商品はこちら)
aimsoaringhaiku.github.io/pharma-gatekeeper/



ご意見・改善案

【裏面】指定濫用防止医薬品 参考資料集

(厚労省・薬局配布資料の要点を再構成 / 下段＝状況別対応のポイント)

参考① 購入者への揭示例

元資料：指定濫用防止医薬品をご購入時フリップ

指定濫用防止医薬品の濫用をした場合、
保健衛生上の危害が発生するおそれがあります。

販売にあたり、OTC医薬品の各区分で確認する事項に加え、
以下を確認させていただきます。

<確認事項>

- ☐ 年齢
- ☐ 18歳未満の場合は当該者の氏名
- ☐ 他の薬剤・医薬品の使用状況
- ☐ 当該製品/他の指定濫用防止医薬品の購入・譲り受け状況
- ☐ 大容量・複数個購入の場合、その理由
- ☐ 適正な使用であることを確認するために必要な事項
- ☐ その他、情報提供に必要な事項

<情報提供内容>

①名称②有効成分と分量③用法用量④効能効果⑤その他薬剤師が適正使用に必要と
判断する事項

※適正な使用を確保できないと判断した場合は販売を行いません。

参考② 制度改正のお知らせ

元資料：薬物濫用ガスター「大切なお知らせ」販売方法の変更

2026.5/1から、
法律で「指定濫用防止医薬品」と定められた製品は販売方法が変わり
ます。
※市販薬の不適正使用による健康被害が報告されています。

購入時に確認・説明があります（原則、使用者本人への販売）

確認の流れ：①購入数→②年齢確認→③使用状況→④販売可否
（詳細は表面「レジでの必須確認事項」を参照）

対象商品には「要確認」等の表示がある場合があります（不明な点は薬剤師・登録
販売者へ）。

<対象8成分>

エフェドリン/コデイン/ジヒドロコデイン/ジフェンヒドラミン/デキストロメトル
ファン/ブソイドエフェドリン/プロムワレリル尿素/メチルエフェドリン

参考③ 来店～販売可否フロー

元資料：「販売可否判断フローチャート」OTCマニュアル(第2版)

来店：購入の意思表示
（陳列品を持参／声かけ）

購入者の様子を確認
（年齢確認が必要そうか等）

年齢確認（身分証等）
18歳未満／18歳以上で分岐

確認・情報提供
（詳細は表面フローを参照）

販売の可否判断
（説明の理解度・懸念の有無等）

販売せず／販売実施
懸念があれば理由等を記録・申し送り

④ 状況別対応のポイント

※現場で遭遇しやすい主要な注意点の抜粋です。全てを網羅するものではありません。

①②年齢・重複

18歳未満/複数個(他店合算)を希望

- ▶一律禁止：18歳未満への大容量・複数個(種類違い含む)は理由問わず販売不可。
家族用でも例外なし。
- ▶絶対禁忌：12歳未満はコデイン系(ジヒドロコデイン含む)。
処方・市販とも不可、他成分の咳止めへ。
- ▶身分証拒否：年齢確認不能のため販売不可。

③体質(アレルギー)

解熱鎮痛薬でアレルギー歴

- ▶ピリン疹：NSAIDs（ロキソプロフェン等）へ代替可。
- ▶アスピリン喘息：NSAIDs全般に100%交差耐性で全てNG⇒AAP単剤のみ提案。

③体質(喘息・不整脈等)

喘息/不整脈/緑内障/前立腺肥大/高血圧

- ・糖尿病等
- ▶抗コリン薬・第一世代抗ヒスタミン：喘息=痰粘稠化・排痰困難、
不整脈=頻脈・QT延長。
- ▶緑内障=眼圧上昇、前立腺肥大=尿閉リスク。単一成分薬を推奨。
- ▶禁忌・要注意：ブソイドエフェドリンは交感神経刺激作用が強く、
前立腺肥大・緑内障に加え高血圧症・心疾患(不整脈/虚血性心疾患)・糖尿病・甲状腺機能亢進症も対象（抗コリン作用とは別ルート）。

④併用

SSRI服用中/他剤併用

- ▶最重要：DXM×SSRIはセロトニン症候群リスク（濫用防止領域で最も急性致死率が高い相互作用）。
- ▶GFIはDXM血中濃度上昇。
マクロライド系/アゾール系薬はQT延長・心室頻拍に注意。

※運転

運転前後の服用を心配されたら

- ▶最も排泄が遅い成分を基準に判断（半減期の長い成分ほど翌日に持ち越しやすい）

成分（世代/分類）	半減期	⇒ 回避目安
クロルフェニラミン(第1)	12～24h	24h(翌日まで)
プロメタジン(第1)	10～14h	12～24h
プロモバレリル尿素	約15h	24h(翌日まで)
ジフェンヒドラミン(第1)	約9h	12h(当日NG)
セチリジン(第2)	7～10h	当日NG
ペタスチン(第2)	約2.4h	当日中禁止
アゼラスチン(第2)	約24h	当日中禁止
ブチルスコポラミン(抗コリン)	約1.5h	5～6h(当日内控)
dl-メチルエフェドリン	約5～6h	8～12h
デキストロメトルファン	約3.5h	6～8h

⑤妊婦・授乳

妊娠中/授乳中と判明

- ▶禁忌：妊娠後期のコデイン系（パブロン/ルル等）
は新生児呼吸抑制⇒メジコン等単剤(DXM)を提案。
- ▶一律禁忌：抗コリン薬（ブスコパン等）
はOTCで一律不可（処方箋なら有益性投与可）。
授乳中は母乳分泌低下・乳児頻脈で中断。
- ▶禁忌：コンタック鼻炎Z(セチリジン/第2世代)は動物実験で胎児毒性報告あり添付文書上「妊婦投与禁忌」。
第1世代クロルフェニラミンは比較的安全。

※成分の落とし穴・過量服薬

長期連用・依存・過量服薬の疑い

- ▶ウレイド系（プロモバレリル尿素等）
：長期乱用で臭素蓄積⇒歩行困難・幻覚。高齢者はせん妄・認知低下も。
- ▶MOH：月15日以上頭痛の環境で複合鎮痛薬を月10日超・3ヶ月超服用⇒薬剤乱用頭痛に進展。
- ▶過量服薬：初日=急性心毒性(無水カフェイン等)、
3日目以降=劇症肝不全(AAP)が急速進行。
NSAIDsは自覚症状ありだがAAPは無症状のまま進行。

※外用薬・アンナカ

外用薬/無水カフェインの質問

- ▶対象外：軟膏・クリーム・目薬等の外用剤は成分含有でも規制対象外。
- ▶対象外：アンナカ(無水カフェイン)はお茶・コーヒー等にも含まれ一律規制が非現実的（危険性は認識）。

授乳婦指導（成分別の目安）：

- AAP/イブプロフェン/無水カフェイン(通常量) ⇒ 通常授乳可
- DXM/ジフェンヒドラミン(短期) ⇒ 服薬後2-4h授乳回避
- クロルフェニラミン(長期)/プロメタジン/プロモバレリル尿素 ⇒ 搾乳破棄(半減期×3-4h)
- コデイン/ジヒドロコデイン(乳児モルヒネ代謝リスク) ⇒ 代替薬へ変更提案