

Работу выполнил:

Назмиев Айрат, группа ***

Задача 1

Пусть задан вектор $u \in \mathbb{C}^n$: $\|u\|_2 = 1$. Найдите все $\alpha \in \mathbb{C}$, для которых $A = I - \alpha uu^*$ является: 1) эрмитовой 2) косоэрмитовой 3) унитарной 4) нормальной. Для пункта 3) также нарисуйте найденные α на комплексной плоскости.

□ Найдем все $\alpha \in \mathbb{C}$ в каждом пункте. Обозначим $\alpha = a + ib$, $a, b \in \mathbb{R}$.

1. A — эрмитова: $A^* = A$.

$$A^* = I - \bar{\alpha} uu^* = I - \alpha uu^* = A, \text{ из условия } \|u\|_2 = 1, \text{ значит } uu^* \neq 0.$$

$$\alpha = \bar{\alpha} \iff \alpha \in \mathbb{R}.$$

2. A — косоэрмитова: $A^* = -A$.

$$A^* = I - \bar{\alpha} uu^* = -I + \alpha uu^* = -A.$$

$$2I = (\alpha + \bar{\alpha})uu^*.$$

I имеет ранг n , тогда как $\text{rank } uu^* = 1$ ($u \neq 0$), в этом случае $uu^* = u^*u = 1$. Значит, равенство может выполняться только при $n = 1$, в скалярном случае. Тогда также должно быть выполнено $2 = \alpha + \bar{\alpha} = 2a$. Получаем, что для $n \geq 1$ таких α не существует (A не может быть косоэрмитовой), для $n = 1$: $\alpha = 1 + ib$, $\forall b \in \mathbb{R}$.


3. A — унитарная: $AA^* = I$.

$$AA^* = (I - \alpha uu^*)(I - \bar{\alpha} uu^*) = I - (\alpha + \bar{\alpha})uu^* + |\alpha|^2 uu^* uu^* = [u^*u = \|u\|_2^2 = 1] = I - (\alpha + \bar{\alpha})uu^* + |\alpha|^2 uu^* = I.$$

$$|\alpha|^2 uu^* = (\alpha + \bar{\alpha})uu^*.$$

$$a^2 + b^2 = 2a, (a - 1)^2 + b^2 = 1.$$

Таким образом, $\alpha \in \{z \in \mathbb{C} : |z - 1| = 1\}$. Изобразим множество на комплексной плоскости: окружность радиуса 1 с центром в $z = 1$.



4. A — нормальная, $AA^* = A^*A$.

$$AA^* = I - (\alpha + \bar{\alpha})uu^* + |\alpha|^2 uu^*; A^*A = I - (\alpha + \bar{\alpha})uu^* + |\alpha|^2 uu^*.$$

Можно видеть, что $AA^* = A^*A$, $\forall \alpha \in \mathbb{C}$. ■

Задача 2

1. Докажите, что для любой косоэрмитовой $K \in \mathbb{C}^{n \times n}$ матрица:

$$Q = (I - K)^{-1}(I + K) \quad (1)$$

будет унитарной.

2. Найдите множество всех унитарных матриц, которые представимы в виде (??).

□ Для начала покажем, что матрица $I - K$ является обратимой. Известно, что собственные значения косоэрмитовых матриц имеет вид $\lambda(K) \in i\mathbb{R}$, то есть являются чисто мнимыми, в том числе могут равняться нулю. Пусть $K = U\Lambda U^{-1} = U\Lambda U^*$ — ее собственное разложение в ОНБ комплексного векторного пространства (косоэрмитовы матрицы нормальные). Тогда матрицу можно расписать в следующем виде: $I - K = UU^* - U\Lambda U^* = U(I - \Lambda)U^*$, то есть $I - K$ имеет собственные значения вида $\lambda(I - K) = 1 - \lambda(K) \neq 0$. Таким образом, все собственные значения данной матрицы ненулевые, а значит, $I - K$ обратима.

Покажем, что матрица вида (??) является унитарной, для этого требуется доказать $QQ^* = I$. Для этого воспользуемся известными свойствами: $(AB)^* = B^*A^*$, $(A^{-1})^* = (A^*)^{-1}$, свойством $K^* = -K$. Получим:

$$\begin{aligned} Q^* &= (I - K)(I + K)^{-1}, \\ QQ^* &= (I - K)^{-1}(I + K)(I - K)(I + K)^{-1}. \end{aligned}$$

Докажем простой факт: матрицы вида $I - A$ и $I + A$ коммутируют $\forall A \in \mathbb{C}$. Действительно:

$$(I + A)(I - A) = I - A^2 = (I - A)(I + A).$$

Поэтому можно переставить в QQ^* второй и третий множитель местами:

$$QQ^* = (I - K)^{-1}(I - K)(I + K)(I + K)^{-1} = I,$$

что и требовалось.

Было доказано, что для любой косоэрмитовой $K \in \mathbb{C}^{n \times n}$ формула (??) задает унитарную Q .

Теперь найдем множество унитарных матриц, представимых в виде (??).

Известно, что в общем случае собственные числа косоэрмитовых матриц чисто мнимые, а ортогональных — являются комплексными и равны единице по модулю.

Пусть v — собственный вектор K : $Kv = \lambda v$, $\lambda \in i\mathbb{R}$. Тогда:

$$Qv = (I - K)^{-1}(I + K)v. \quad (2)$$

Известно, что собственные векторы матрицы и обратной матрицы совпадают, при этом соответствующим данному вектору собственным значением обратной матрицы будет обратное собственное число исходной матрицы:

$$Ax = \lambda x, \quad x = \lambda A^{-1}x, \quad \lambda^{-1}x = A^{-1}x.$$

Значит, если v — собственный для K , то он собственный как для $(I - K)$:

$$(I - K)v = (1 - \lambda)v,$$

так и для $(I - K)^{-1}$:

$$(I - K)^{-1}v = \frac{1}{1 - \lambda}v.$$

Таким образом, (??) можно записать в виде:

$$Qv = \frac{1 + \lambda}{1 - \lambda}v = \mu v, \quad (3)$$

что означает, Q имеет те же собственные векторы v , что и K , которым соответствует собственное число $\mu = (1 + \lambda)(1 - \lambda)^{-1}$.


Введем обозначение $\lambda = ib$, $b \in \mathbb{R}$. Определим, какие значения может принимать μ :

$$\mu = \frac{1 + ib}{1 - ib} = \frac{(1 - b^2) + 2ib}{1 + b^2}. \quad (4)$$


Можно легко убедиться, что $|\mu| = 1$, то есть собственные значения лежат на единичной окружности:

$$|\mu| = \left| \frac{(1 - b^2) + 2ib}{1 + b^2} \right| = \sqrt{\frac{(1 - b^2)^2 + (2b)^2}{(1 + b^2)^2}} = \sqrt{\frac{1 - 2b^2 + b^4 + 4b^2}{(1 + b^2)^2}} = 1.$$

Введем обозначение $\mu = e^{i\theta} = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$. Из (??) получаем, что $\cos(\theta) = (1 - b^2)(1 + b^2)^{-1}$, $\sin(\theta) = 2b(1 + b^2)^{-1}$. Зададимся вопросом, какие значения может принимать μ на единичной окружности.



(a) Графики $\frac{1-b^2}{1+b^2}$ и $\frac{2b}{1+b^2}$



(b) μ на комплексной плоскости

Можно легко показать тот факт, что в параметризации (??) невозможно задать точку $\mu = -1$. Доказывается это средствами матанализа, исследуя нули, экстремумы, участки монотонности и асимптоты функций $x(b) = (1 - b^2)(1 + b^2)^{-1}$ и $y(b) = 2b(1 + b^2)^{-1}$, но выкладки оказываются крайне громоздкими, поэтому здесь не приводятся. Вместо этого приведены графики функций и полученное множество допустимых значений μ на \mathbb{C} . Можно видеть, что при изменении $b \in \mathbb{R}$ достигаются все точки на единичной окружности, $x^2(b) + y^2(b) = 1$, кроме $(-1, 0)$: она не достигается и является пределом при $b \rightarrow \pm\infty$. То есть $\mu \in \{z \in \mathbb{C} : |z| = 1, z \neq -1\}$.

Вместо описанного выше наброска доказательства ГМТ μ можно заметить, что (??) является преобразованием Кэли в скалярном случае, которое отображает мнимую ось на комплексной плоскости в единичную окружность, при этом $\pm i\infty$ отображается в -1 . Кстати, в задаче изначально рассматривается более общее отображение Кэли: для комплексных матриц, в приложении к параметризации унитарных матриц через косозермитовы.

Таким образом, вид (??) описывает множество всех унитарных матриц $Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$, которые не имеют собственного значения -1 . ■

Задача 3

Докажите, что

$$\|A\|_{1 \rightarrow 2} \leq \|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_{1 \rightarrow 2}, \quad \forall A \in \mathbb{C}^{m \times n}.$$

Указание: В случае использования констант эквивалентности векторных норм необходимо обосновывать это значение констант.

□ Докажем, что $\|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$, для этого воспользуемся полуаддитивностью квадратного корня и неравенством КБШ:

$$\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} \leq \sum_{i=1}^n \sqrt{|x_i|^2} = \sum_{i=1}^n |x_i| = \|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i| \cdot 1 \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n 1^2} = \sqrt{n} \|x\|_2.$$

Выпишем определения операторных норм:

$$\|A\|_{1 \rightarrow 2} = \sup_{\|x\|_1=1} \|Ax\|_2, \quad \|A\|_2 = \sup_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2$$

Далее докажем первое неравенство в условии задачи: $\|A\|_{1 \rightarrow 2} \leq \|A\|_2$. Из определения операторной нормы ($\forall x \in \mathbb{C}^n$, $\|x\|_1 = 1$ выполнено $\|x\|_2 \leq \|x\|_1 = 1$) и доказанных неравенств на векторные нормы следует, что:

$$\|Ax\|_2 \leq \|A\|_2 \|x\|_2 \leq \|A\|_2 \|x\|_1 = \|A\|_2 \cdot 1 \leq \|A\|_2.$$

Взяв супремум по $\|x\|_1$ на единичной сфере, можно получить:

$$\|A\|_{1 \rightarrow 2} = \sup_{\|x\|_1=1} \|Ax\|_2 \leq \|A\|_2,$$

что и требовалось. Перейдем к доказательству второго неравенства, $\|A\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_{1 \rightarrow 2}$. Вновь сошлемся на доказанные неравенства на векторные нормы ($\forall x \in \mathbb{C}^n$, $\|x\|_2 = 1$ выполнено $\|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2 = \sqrt{n}$) и определения операторных норм и запишем:

$$\|Ax\|_2 \leq \|A\|_{1 \rightarrow 2} \|x\|_1 \leq \|A\|_{1 \rightarrow 2} \sqrt{n} \|x\|_2 = \sqrt{n} \|A\|_{1 \rightarrow 2}$$

Взяв супремум по $\|x\|_2$ на единичной сфере, можно получить:

$$\|A\|_2 = \sup_{\|x\|_2=1} \|Ax\|_2 \leq \sqrt{n} \|A\|_{1 \rightarrow 2},$$

оба неравенства доказаны. ■

Задача 4

Обозначим $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$ и $A_n = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1/n & 0 \end{bmatrix}$, $n \in \mathbb{N}$.

1. Обоснуйте сходимость $A_n \rightarrow A$, $n \rightarrow \infty$ исходя из определения сходимости с помощью норм.
2. Найдите собственные разложения $A_n = S_n \Lambda_n S_n^{-1}$ и проверьте существование пределов для каждой из S_n, Λ_n и S_n^{-1} . Почему не у всех из этих матриц существует предел?
3. Найдите разложения Шура $A_n = U_n T_n U_n^{-1}$ и проверьте существование пределов для каждой из U_n, T_n и U_n^{-1} .

□ Докажем сходимость $A_n \rightarrow A$, $n \rightarrow \infty$. Так как все матричные нормы в конечномерных пространствах эквивалентны, поэтому для удобства будем показывать сходимости по норме Фробениуса:

$$\|A - A_n\|_F = \frac{1}{n} \rightarrow 0, \quad n \rightarrow \infty,$$

то есть A_n сходится к A .

Найдем собственные разложение A и A_n .

$$\det(A - \lambda I) = \lambda^2 = 0, \quad \lambda_1 = \lambda_2 = 0, \quad (A - 0 \cdot I)v = 0, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} v = 0, \quad v = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix},$$

можно видеть, что у матрицы A только один линейно независимый собственный вектор (а не 2), то есть у A не имеет собственного разложения. При этом ЖНФ A имеет вид:

$$A = PJP^{-1}, \quad J = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad P = P^{-1} = I$$

Собственное разложение A_n :

$$\det(A_n - \lambda I) = \lambda^2 - \frac{1}{n} = 0, \quad \lambda_{n1} = \frac{1}{\sqrt{n}}, \quad \lambda_{n2} = -\frac{1}{\sqrt{n}}, \quad (A_n - 0 \cdot I)v = 0, \quad v_{n1} = \begin{bmatrix} \sqrt{n} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_{n2} = \begin{bmatrix} -\sqrt{n} \\ 1 \end{bmatrix};$$

$$\Lambda_n = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{n}} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{n}} \end{bmatrix}, \quad S_n = \begin{bmatrix} \sqrt{n} & -\sqrt{n} \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad S_n^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2\sqrt{n}} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2\sqrt{n}} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

Можно легко видеть (например, рассмотрев разницу матриц в норме Фробениуса), что последовательности Λ_n и S_n^{-1} имеют предел, а S_n — нет (так как некоторые элементы матрицы стремятся к бесконечности):

$$\Lambda_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0, \quad S_n^{-1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{bmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}.$$

При этом $A_n = S_n \Lambda_n S_n^{-1}$ для любого *конечного* n . Расходимость некоторых матриц (для выбранных собственных векторов — расходимость S_n) связана с тем, что предел последовательности A_n является вырожденной матрицей A , для которой не существует собственного разложения. При этом важно заметить, что сходимость собственных значений имеет место, λ_{n1} и λ_{n2} сходятся к 0.

Теперь найдем разложения Шура матриц A и A_n .

Для A легко проверить, что можно записать разложение Шура, совпадающее с найденной выше ЖНФ:

$$A = UTU^*, \quad T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad U = U^* = I.$$

Найдем разложение Шура для A_n . Нормируем найденный собственный вектор v_1 , найдем для него ортогональный вектор и также его нормируем (вектора сформируют унитарную матрицу), далее найдем верхнетреугольную матрицу T_n :

$$v_{n1} = \begin{bmatrix} \sqrt{n} \\ 1 \end{bmatrix}, \quad v_{n2} = \begin{bmatrix} -1 \\ \sqrt{n} \end{bmatrix}, \quad u_{ni} = \frac{v_{ni}}{\|v_{ni}\|_2}, \quad i = 1, 2,$$

$$U_n = \begin{bmatrix} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} & -\frac{1}{\sqrt{n+1}} \\ \frac{1}{\sqrt{n+1}} & \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}} \end{bmatrix}, \quad U_n^{-1} = U_n^*, \quad T_n = U_n^* A_n U_n = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{n}} & \frac{n-1}{n} \\ 0 & -\frac{1}{\sqrt{n}} \end{bmatrix}$$

$$U_n, U_n^* \xrightarrow{n \rightarrow \infty} I = U, \quad T_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = T.$$

Легко видеть, что полученные матрицы имеют пределы (например, это можно показать через фробениусовскую норму), при этом они совпадают с разложением Шура матрицы A , к которой стремится A_n . Таким образом можно заключить, что все матрицы в разложении Шура A_n сходятся к соответствующим матрицам в разложении предельной матрицы A . ■

Начиная со следующей задачи решения задач будут приведены в письменном виде.

(N5)

Докажем, что $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ нормальная является унитарной \Leftrightarrow все её с.з. $\lambda_i, i = \overline{1, n} : |\lambda_i| = 1$

□ • $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ — нормальная, если $A^*A = AA^*$, нормальная матрица унитарно диагонализуема
• $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ — унитарная, если $A^*A = AA^* = I$ (является нормальной)

\Rightarrow $\exists \lambda$ — с.з. A , v — с.в., соот. λ , т.е. $Av = \lambda v$

Рассмотрим также $v^*A^* = \bar{\lambda}v^*$. Умножим $Av = \lambda v$ слева на данное сопряжение:

$$v^*A^*Av = |\lambda|^2 v^*v.$$

Т.к. A — унитарная, $A^*A = I$, то есть:

$$v^*v = |\lambda|^2 v^*v.$$

Т.к. по определению $v \neq 0 \Rightarrow v^*v = \|v\|_2^2 \neq 0$ получаем:

$$|\lambda|^2 = 1 \Rightarrow |\lambda| = 1$$

Таким образом, \forall с.з. унитарной матрицы A по модулю = 1

\Leftarrow $\exists A$ — нормальная матрица и \forall её с.з. $\lambda_i, i = \overline{1, n} : |\lambda_i| = 1$.

Т.к. A — нормальная \Rightarrow унитарно диагонализуема, т.е.:

$$A = U\Lambda U^*; U U^* = I, \Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$$

$$A^* = U\Lambda^*U^*; \Lambda^* = \text{diag}(\bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_n)$$

Рассчитаем AA^* :

$$AA^* = U\Lambda U^*U\Lambda^*U^* = U\Lambda\Lambda^*U^* = [\Lambda\Lambda^* = \text{diag}(|\lambda_1|^2, \dots, |\lambda_n|^2) = I] \ominus$$

$$\ominus U I U^* = I$$

Значит, A — унитарна \square

№6

а) Докажите, что для $\forall A \in \mathbb{C}^{m \times n}$, $m \geq n$, справедливо:

$$\|A\|_2 \leq \|A\|_F \leq \sqrt{n} \|A\|_2$$

б) Найдите все матрицы $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$: $\|A\|_F = \sqrt{n} \|A\|_2$

□ Пусть A имеет SVD-разложение $A = U \Sigma V^*$ по метрическим нормам $\|\cdot\|_F$ и $\|\cdot\|_2$

$A = U \Sigma V^*$ — SVD; r — ранг A ; $\Sigma \in \mathbb{C}^{n \times n}$; $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \dots \geq \sigma_r \geq 0$

$$\|A\|_F = \|U \Sigma V^*\|_F = [\|\cdot\|_F \text{ — унитарно-инв.}] = \|\Sigma\|_F = \sqrt{\sum_{i=1}^r \sigma_i^2}$$

$$\|A\|_2 = \|U \Sigma V^*\|_F = [\|\cdot\|_2 \text{ — унитарно-инв.}] = \|\Sigma\|_2$$

$$\|\Sigma\|_2 = \sup_{x \neq 0} \frac{\|\Sigma x\|_2}{\|x\|_2} = \sup_{x \neq 0} \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^r \sigma_i^2 |x_i|^2}}{\sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}} \leq \sup_{x \neq 0} \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^r \sigma_i^2 |x_i|^2}}{\sqrt{\sum_{i=1}^r |x_i|^2}} = \sup_{x \neq 0} \frac{\sigma_1 \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^r |x_i|^2}}{\sqrt{\sum_{i=1}^r |x_i|^2}} = \sigma_1$$

$\Rightarrow \sigma_1$; значение достигается при $x = e_1$.

$$а) \|A\|_2 = \sigma_1 \leq \sqrt{\sum_{i=1}^r \sigma_i^2} = \|A\|_F \quad \left(\sigma_1^2 \leq \sum_{i=1}^r \sigma_i^2 \right) \text{ — первое нр-во Коши}$$

$$\|A\|_F^2 = \sum_{i=1}^r \sigma_i^2 \leq n \cdot \sigma_1^2 = n \cdot \|A\|_2^2 \Rightarrow \|A\|_F \leq \sqrt{n} \cdot \|A\|_2,$$

что и требовалось

б) $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$; $\|A\|_F = \sqrt{n} \|A\|_2 \Rightarrow \|A\|_F^2 = n \|A\|_2^2$

$$\sum_{i=1}^r \sigma_i^2 = n \sigma_1^2. \text{ Т.к. } \sigma_i \leq \sigma_1 \Rightarrow \underline{\sigma_i = \sigma_1 \quad \forall i} \quad u, v \in \mathbb{C}^{n \times n}$$

$$\text{Тогда } A = U \Sigma V^* = [\Sigma = \sigma I \in \mathbb{C}^{n \times n}] = \sigma U V^* = \sigma Q, \text{ где } Q \in \mathbb{C}^{n \times n}$$

Таким образом, $\|A\|_F = \sqrt{n} \|A\|_2$ эквивалентно

для матриц $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ вида:

$$A = \sigma Q, \quad Q \in \mathbb{C}^{n \times n} \text{ — унитарна, } \sigma \in \mathbb{R}_+ \quad (\sigma \geq 0)$$

— унитарна или
прообраз унитарных
($Q Q^* = I$)



$$\sqrt{7}$$

Дана нормальная матрица $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ и её разложение Шура: $A = U T U^*$

- Требуется записать SVD матрицы A , используя U и T .
- Покажите, что $\sigma_1(A) = \max_i |A_{ii}|$
- Приведите пример $A \in \mathbb{C}^{2 \times 2}$, где формула в 5) неверна.

□ Метрица A — нормальная: $AA^* = A^*A$

$$A = U \Lambda U^*; \quad U \Lambda U^* U^* U^* = U \Lambda^* U^* = U \Lambda^* U^* U^* U^* = \cancel{U \Lambda^* U^*} U^* U^* = U^T U^*$$

Значит, $TT^* = T^*T$, где T - симметрическое с с.з. $\lambda_i, i=1, n$ не нулевых
лемма

- Done т.е. то ~~не является~~ верхнетреугольной матрица B коммутирует

$$C B^* \Leftrightarrow B - \text{множество}$$

$$\mathbb{I} (B B^T)_{ij} = \sum_{k=\max(i,j)}^n b_{ik} \overline{b_{jk}} \quad (b_{ij} = 0 \quad \forall i > j)$$

$$(B^* B)_{ij} = \sum_{k=1}^{m \wedge n(i,j)} \overline{b_{ki}} b_{kj}$$

✗ многократное вл-во между:

$$(BB^T)_{ii} = \sum_{k=1}^n |b_{ik}|^2$$

$$(B^* B)_{ii} = \sum_{k=1}^i |\beta_{ki}|^2$$

$$(B B^*)_{ci} = (B^* B)_{ci} \quad \text{из}. \text{ По симметрии соотнос в } B\text{-матрице}$$

$$\underline{i=1}: \sum_{k=1}^n |e_{1k}|^2 = \sum_{k=1}^1 |e_{k1}|^2 = |e_{11}|^2 \Rightarrow |e_{12}|^2 + \dots + |e_{1n}|^2 = 0 \Rightarrow e_{1j} = 0 \quad j \neq 1$$

$i=m$: пусть где $\forall i \leq m-1$ линейно $b_{ij} = 0, i \neq j$

$$\sum_{k=m}^n |v_{mk}|^2 = \sum_{k=1}^m |v_{km}|^2 = [\text{по предположению индукции}] = |v_{mm}|^2$$

$$|b_{mm}|^2 + \sum_{k=m+1}^n |b_{mk}|^2 = |b_{mm}|^2 \Rightarrow b_{mk} = 0, n \geq k \geq m+1$$

Доказано, что В-глюкопиноза II

Доказательство леммы следует из того, что $T = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = \Lambda$

рождения Ишвара нормальная метризация — фукционализация в фукциональной форме

$$A = U \Lambda U^*$$

$$\delta) \sigma_i(A) = \sqrt{\lambda_i(AA^T)} = \sqrt{\lambda_i(A^T A)}$$

$$A A^* = U \Lambda \Lambda^* U^* = U \cdot \text{diag}(|\lambda_1|^2 \dots |\lambda_n|^2) \cdot U^* \Rightarrow G_i(A) = |\lambda_i(A)|$$

а) Таким образом, SVD A имеет вид:

$$A = U \Sigma U^*; \Sigma = \text{diag}(|\lambda_1| \dots |\lambda_n|)$$

Через $T = \Lambda$ можно записать так:

$$A = U \cdot (T T^*)^{1/2} \cdot U^*, \quad \text{корни диагональной матрицы — } \begin{matrix} \text{диагональная матрица} \\ \text{неотриц. определений} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{с корнями э-тов} \\ \text{исходной матрицы} \\ \text{не являются} \end{matrix}$$

б) $\nexists A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$
 $AA^* \neq A^*A$

Если это подстроено в \mathbb{N}^4 , ~~тогда~~ $\lambda_1(A) = \lambda_2(A) = 0$

$$AA^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}; |A - \lambda E| = \lambda(\lambda - 1), \quad \begin{matrix} \lambda_1(AA^*) = 1 \\ \lambda_2(AA^*) = 0 \end{matrix}$$

$$\sigma_1(A) = \max_i \sqrt{\lambda_i(AA^*)} = 1 \neq \text{max} \quad 0 = \max_i |\lambda_i(A)| \quad \text{— условие на} \\ \text{нормального} \\ \text{в общем случае}$$

□

(78)

Покажем, что для матрицы W из канонического разложения матрицы $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $m \geq n$ ($A = WK$, $W^T W = I$, $W \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $K \geq 0$, $K \in \mathbb{R}^{n \times n}$) выполняется:

$$\frac{\|A^T A - I\|_2}{\|A\|_2 + 1} \leq \|A - W\|_2 \leq \|A^T A - I\|_2$$

Замечание: пер-го идёт соотношение между $\|A\|_2$ и $\|A^T A - I\|_2$ и $\min_{Q: Q^T Q = I} \|A - Q\|_2$ (в смысле $\|\cdot\|_2$) матрицы A и ортогональной: $\|A^T A - I\|_2$ и $\min_{Q: Q^T Q = I} \|A - Q\|_2$

Д $A = WK$ — каноническое разложение

1) Покажем $\|A - W\|_2 \leq \|A^T A - I\|_2$

$$\|A - W\|_2 = \|W(K - I)\|_2 = \|K - I\|_2$$

$$\|A^T A - I\|_2 = \|K^T W^T W K - I\|_2 = \|K^T K - I\|_2$$

$K \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $K \geq 0$, $K = K^T$, заменим собственное разложение K :

$$K = Q D Q^T, D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n), d_1 \geq d_2 \geq \dots \geq d_n \geq 0 \text{ — с.з. } K$$

$$K^T K = Q D^T D Q^T = Q D^2 Q^T$$

$$\bullet \|K - I\|_2 = \|Q(D - I)Q^T\|_2 = \|D - I\|_2$$

$$\bullet \|K^T K - I\|_2 = \|Q(D^2 - I)Q^T\|_2 = \|D^2 - I\|_2$$

$$\text{Покажем, что } \|D - I\|_2 < \|D^2 - I\|_2$$

т.к. $(D - I)$ и $(D^2 - I)$ — диагональные матрицы, и $\|\cdot\|_2$ — это

макс. абсолютного значения (оно же является σ_1), то есть $\max_i |d_i - 1|$ (макс. сингулярное значение)

$$|d_i - 1| \text{ третьего слагаемого } < |d_i^2 - 1|:$$

$$\text{а) } d_i \in [0; 1]: 1 - d_i \vee 1 - d_i^2; d_i(d_i - 1) < 0 \Rightarrow 1 - d_i < 1 - d_i^2$$

$$\text{б) } d_i > 1: d_i - 1 \vee d_i^2 - 1; 0 < d_i(d_i - 1) \Rightarrow d_i - 1 < d_i^2 - 1$$

таким образом, $|d_i - 1| < |d_i^2 - 1|$. То есть $\|D - I\|_2 < \|D^2 - I\|_2$. Это

$$\text{формирует } \|A - W\|_2 \leq \|A^T A - I\|_2$$

2) Покажем $\frac{\|A^T A - I\|_2}{\|A\|_2 + 1} \leq \|A - W\|_2$

[свойство мультипликативности $\|\cdot\|_2$]

$$\|A^T A - I\|_2 = \|K^T K - I\|_2 = \|D^2 - I\|_2 = \|(D - I)(D + I)\|_2 \leq \|D - I\|_2 \cdot \|D + I\|_2 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \|A - W\|_2 \cdot \|D + I\|_2 \leq \|A - W\|_2 \cdot (\|D\|_2 + 1) = \|A - W\|_2 \cdot (\|A\|_2 + 1)$$

$$[\|D + I\|_2 = |d_1 + 1| \leq |d_1| + 1 = \|D\|_2 + 1] \quad \text{Значит, } \frac{\|A^T A - I\|_2}{\|A\|_2 + 1} \leq \|A - W\|_2 \quad \square$$