

$[1, n]$  в  $[1, n]$ , при этом коэффициент  $\mu_\alpha$  определяется суммой

$$\mu_\alpha = \sum_{\epsilon_i \in \{0,1\}} (-1)^{\epsilon_1 + \dots + \epsilon_n} \epsilon_{\alpha(1)} \dots \epsilon_{\alpha(n)}.$$

Если  $\alpha$  — перестановка, коэффициент  $\mu_\alpha$  равен  $(-1)^n$ , поскольку единственный ненулевой член суммы — это тот, для которого все  $\epsilon_i$ , равны 1. В противном случае можно разложить  $\mu_\alpha$  следующим образом:

$$\sum_{\epsilon_i, i \neq k} (-1)^{\epsilon_1 + \dots + \epsilon_n} \sum_{\epsilon_k=0,1} (-1)^{\epsilon_k} \epsilon_{\alpha(1)} \dots \epsilon_{\alpha(n)},$$

где  $k$  — элемент из  $[1, n]$ , который не принадлежит образу  $\alpha$ , и хорошо видно, что внутренний член (сумма по  $\epsilon_k$ ) равен нулю; это доказывает, что  $\mu_\alpha$  в этом случае равно нулю. Второе искомое выражение (суммы которого записываются на множествах) просто выводится из первого, исключением ненулевых  $\epsilon_i$ , появляющихся в сумме.

$$\sum_{E'} = \sum_E + (-1)^{|E'|} \prod_{1 \leq i \leq n} S_i(E'). \quad (7)$$

Вклад наименьшего элемента  $\emptyset$  в эту сумму — нулевой; значит, начнем с его последователя, который может быть  $\{1\}$ ,  $\{n\}$  или какое-нибудь одноэлементное множество в соответствии с порядком, заданным на  $[1, n]$ . Можно заметить, что  $S_i(E') = S_i(E) \pm a_{ij}$ , где  $\{j\} = E \triangle E'$ .

В этой записи, как в алгоритме 12,  $\pm$  должен пониматься как  $+$ , если  $E \subset E'$  и  $-$ , если  $E' \subset E$ .

Чтобы оценить  $\sum_{E'}$ , исходя из  $\sum_E$  с использованием соотношения (7), нужно осуществить  $n$  сложений (для подсчета каждого  $S_i(E')$ ), затем  $n - 1$  перемножений:  $S_1(E') \times \dots \times S_n(E')$ , и, наконец, 1 сложение. Имеем  $2^n - 2$  операций для осуществления (7), при этом первый член  $\sum = -\prod_{1 \leq i \leq n} \alpha_{in}$  требует  $n - 1$  перемножений; это доказывает сформулированный результат о сложности. Сложность  $O(n2^n)$  значительна, но остается того же порядка, что и сложность, индуцированная определением ( $n!(n - 1)$  перемножений и  $n! - 1$  сложений). Формула Стирлинга позволяет сравнить эти два значения сложности:  $n \cdot n! / (n \cdot 2^n) \approx (n/2e)^n \sqrt{2\pi n}$ .

## 22. Перманент матрицы (продолжение)

**а.** Правая часть может рассматриваться как многочлен (от переменных  $a_{ij}$ ), равный  $\sum_{\alpha} \mu_{\alpha} a_{1\alpha(1)} \dots a_{n\alpha(n)}$ , где сумма распространяется на все отображения  $[1, n]$  в  $[1, n]$ . Коэффициент  $\mu_{\alpha}$  задан формулой

$$\mu_{\alpha} = \sum_{\omega} \mu_{\alpha}(\omega) \quad \text{с} \quad \mu_{\alpha}(\omega) = \omega_1 \dots \omega_{n-1} \omega_{\alpha(1)} \dots \omega_{\alpha(n)},$$

в которой полагаем  $\omega_n = 1$ . Если  $\alpha$  — перестановка, то каждое  $\mu_{\alpha}(\omega)$ , присутствующее в сумме  $\mu_{\alpha}$ , равно 1 и, следовательно,  $\mu_{\alpha} = 2^{n-1}$ . Напротив, если  $\alpha$  не является перестановкой, то сумма  $\mu_{\alpha}$  — нулевая. Действительно, образ  $\alpha$  отличен от  $[1, n]$ , и различаем два случая:

- (i)  $\exists k < n$ , не принадлежащий образу  $\alpha$ ,
- (ii)  $\exists k < n$ , дважды полученный из  $\alpha$ .

В обоих случаях члены  $\mu_{\alpha}(\omega)$ , присутствующие в сумме, группируются попарно, один соответствуя  $\omega_k = 1$ , другой —  $\omega_k = -1$ , и взаимно уничтожаются (в случае (ii)  $\mu_{\alpha}(\omega) = \omega_k$ ).

**б.** Формула пункта **а** может быть записана в следующем виде:

$$\frac{\text{per} A}{2} = \sum \omega_1 \dots \omega_{n-1} \prod_{1 \leq i \leq n} (a_{in} + \omega_1 a_{i1} + \dots + \omega_{n-1} a_{in-1}) / 2.$$

Как и в предыдущем упражнении, вычисление перманента получается генерированием перебора при линейной упорядоченности на  $\{-1, 1\}^{n-1}$ , в которой два последовательных элемента отличаются только одной компонентой. Если для  $\omega \in \{-1, 1\}^{n-1}$  и  $i \leq n$  положить

$$S_i(\omega) = (a_{in} + \omega_1 a_{i1} + \dots + \omega_{n-1} a_{in-1}) / 2,$$